



Matthioli
Plantarum

1561





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4152/A/5



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4152/A/5



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4152/A/5

L. 4152⁽⁵⁾
A/5

To
Sister

from
Mr. Fama, (written in
1845)


Received 26th Nov. 1845

Abridged Commentaries
of Mathew

26448.

2a6

Sotheby
1/5/11.



26448

HISTORIA PLANTA.

Ex fidei Jos. Martini
R. V. M.
Earum Imagines, Nomen-
clature, Qualitates, & Na-
tale So. um.


Quibus accessere Simpli-
cium Medicamentorū fa-
cultates, secundum Locos
& genera, ex Dioscoride.

LVG DVNI

Apud Gabrielem Coster. um.

1561.

Balila.



³
S P L E N D I D I S S .

V I R O D . N I C O -

L A O H E N R Y , D .

a Cremieu , Treuoux ,

Feurs, &c. Vienna

Galliarum

Prætoris.

A N T O N . P I N A E V S . S .

Erianti mihi, Prætor or-
natiss. incidit in manus,
anno superiore, **M A T -**
T H I O L V S in Dioscoridē: quē
vbi Gallicè reddidissē, placuit e-
tiam-num manualet ipsum face-
re, in nominis tui gratiam. Ex quo
enim te primū vidi semper ob-
seruavi vnicē , cū ob raras ani-
mi tui dotes, tum maximè ob su-
blimitatem illam ingenij , quæ te
valde spectabilem apud omnes
nostros reddit. Mirum est enim
quantum in hoc tuo ætatis flore
a 2 adole

adoleuit ratio, ita exactè de omni
re iudicas. Quo preiudicio quid
certius habere potest frequentis-
simum hoc Galliarũ Emporium,
ad confirmandam illam quam de
te concepit expectationem? Ta-
lis ergo cum sis, ad te velut ad e-
xactissimum Censorem hoc Tel-
luris Promptuarium mitto, ea de
scriptum arte, vt quicquid de
Plantarum ratione summi in Re
Medica Principes senserunt, in
hoc Enchiridio possis conspicere,
seriòque ludere in hoc vasto Na-
turæ horto cum summis Authori-
bus, siue piscari, venari, aucupari,
siue demum rusticari animi gra-
tia libeat. Quam omnem operam
boni æquique consules. Viue & va-
le, vir ornatiss. Pinæumque tuum
ama. Lugduni x v. Ianuarij,

M. D. L X I.

Iris: Græcis, *iris*: Arabibus, Almeni iuni,
sive Aiersa: Italis, Iride, Giglio azurro, si
ue Giglio celeste: Germanis, Blavv gilgen,
Blavv schvvertel, Veielv vurtz, sive Himmel
schvvertel: Hispanis, Lirio cardeno: Gallis,
Glayeul, sive Flambe.

Locus ex Fuchfio.



*Nascitur in
hortis, & vi
nearum Se-
ptis.*

*Qualitates
ex Matthio
lo.*

*Excalfacit
ordine secun
do completo,
vel tertio in
choante, &
pariter sic-
cat.*

*Ex Fuchfio.
Abstergit et
maturat.*

a 3

Iris

Iris sylvestris: Italis, Giglio saluatico
Gallis, Flambe fauage.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur sponte in Montibus, in saxosis, &
quandoque in campestribus.*

Qualitates.

*Eiusdem est temperatura cuius Iris: habi-
ta proportionem satiuorum & sylvestrium.*

Iris

PLANTARVM.

Iris sylvestris altera.



Locus, & Qualitates.

Vide qua dicta sunt de Iride do-
mestica, & Sylvestri.

2 4

Acō

Acorum: Græcis, ἀνόγον: Arabibus, Vage,
 sue Vgi: Medicis & Seplasiariis, sed falso,
 Calamus odoratus.



Locus ex Apuleio.

Nascitur in cultis, Pratis, & Hortu.

Qualitates.

Gale. li. 6. *Gustu acre, modice amarum, odoréque non
 simp. me. iniucundum: Unde constat id esse facultatis
 calida, & consistentia tenuis.*

Aco

PLANTARVM.

Acorum falsum: Gallis, Flambe de riue
res, ou de marais: Germanis, Geel Lilien, fi
ne Acker vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in palustribus & aquosis.

Qualitates ex Fuchio.

Desiccatur, nec tamen valde exsiccatur.

2 5

Meum

Meum, siue Anethum tortuosum: Græ:
cis, μῆνον: Arabibus, Mu: Italis, Meo: Germa-
nis, Baer vurtz: Hispanis, Pinillo.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in Campesribus, & cul-
tis: maxime in Hispania.*

Qualitates.

*Excalfacit tertio, & desiccans
secundo ordine.*

Gal. li. 7.
simp. me,

Cype

Cyperus: Græcis, *κύπερος*: Arabibus, Sa-
herade: Italis, Cypero: Germanis, Vvilder
Galgan: Hispanis, Ioncia de Olor, siue Ion-
cia Auellanda: Gallis, Soucher.



Locus.

Nascitur in lacunosis, Palustribus, & cultis.

Qualitates.

Cyperi radices excalfaciunt pariter &
exsiccant absque mordacitate. Habent etiam
aliquid incidentis facultatis.

Dio. li. 1.

cap. 4.

Gal. li. 7.

sim. me.

Piper

Piper Indicum, siue Siliquastrum: Ita-
lis, Pepe Indico: Germanis, Indianisch
Pfeffer: Gallis, Poyure d'Inde.



Locus ex Fuchsio.

Exoticum est: & seritur in hortis.

Qualitates ex eodem.

*Excalfacit, & desiccatur Vehementer: quod
indicat Vehemens seminis acrimonia, & fo-
liorum amaritudo.*

Nar

Nardus Indica, siue Spica Nardi: Græ-
cis, Νάρδος, ηνδὶ γάρδος ἄρξος: Arabibus,
Stumbel, siue Seubel: Germanis, Edel-
frembd, Vvolriechent, siue Spicken Nardi:
Hispanis, Hazumbar, siue Espiga sil: Offici-
nis, Spica nardi.



Locus.

Nascitur in montibus, & vliginosis locis, Dio. li. 1.
in Syria. cap. 6.

Qualitates.

Excalfacit excessu primo, & desiccāt se- Gal. li. 8.
cundo iam completo. sim. me.

Nard

Nardus Italica, siue Nardus mas: Ital-
lis, Spigo: Gallis, Aspic.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus, & locis Saxosis.

Qualitates, ex Matthiolo.

*Excalfacit & exiccat ordine secundo com-
pleto, & tertio inchoante, Viribus à Nardis
non longè recedentibus.*

Lauendu

Lauendula, siue Nardus Foemina: Germanis, Lauendel: Italis, Lauendula: Gallis, Lauande.



Locus, & Qualitates.

Vide quae dicta sunt de Nardo Italica: huc enim sunt referenda.

Nar

Nardus Celtica: Græcis, νάρδος & κελτική:
 Italis, Nardo Celtico: Gallis, Nardus
 Gaulois.



Locus.

Diosc. li. 1. *Nascitur in Liguria Alpibus, & apud*
 cap. 7. *Noricos.*

Qualitates.

Gal. li. 8. *Imbecillior est alijs Nardis, ad omnia pra-*
 simp. mc. *terquam ad prouocandam Urinam: siquidem*
calidior illis est sed minus adstringit.

Nardum

Nardum sylvestre, siue, Asarum: Græ-
cis, ἀσάρον, καὶ νάρδος ἁγία: Arabibus, Asa-
ron: Italis, Asaro, siue, Bacchara: Germa-
nis, Hasel Vvurtz: Hispanis, Asara Baccara:
Gallis, Cabaret.



Locus.

Nascitur in Umbrosis montibus.

Qualitates.

Facultatis est calida. & consistentia tenuis:
magis autem quam Acorum.

Diosc. li. 1.
cap. 9.

Gale. li. 6
simp. me.

b

Phu

Phu magnum, Valeriana maior, siue Syl-
uestris Nardus: Græcis, φῶς, καὶ νάρδος ἀγρία:
Arabibus, Fu: Italis, Valeriana: Germanis,
Baldrian: Hispanis, Yerua benedetta: Gal-
lis, Valerienne.



Locus ex Fuchfio.

*Nascitur in vliginosis, secus aquarum de-
cursus, & in frutetis.*

Qualitates.

Cal. li. 8. *Excalfacit excessu primo: & desiccatur se-
cundo iam completo.*

Phu

Phu minus, siue, Valeriana Pratenfis:
Gallis, Valerienne des Prez.



Locus ex Fuchfio.

Nafcitur in Vliginofis, & aquofis.

Qualitates.

Refer huc qua dicta funt de Valeriana
maiore.

b. 2

Caffia

Cassia solutiua, siue, Siliqua Aegyptia:
 Officinis, Cassia: Gallis, Casse laxatiue.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Aegypto, circa Memphin.

Qualitatis ex eodem.

Pulpa eius excalfacit, & humectat ordine primo.

Pfeu

Pseudocostus, siue, Costus adulterinus:
Gallis, Costus bastard.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Gargano Apulia Monte.

Qualitates ex eodem.

Excalfacit Vehementer.

b 3

Iun

Iuncus odoratus: Græcis, *οκσίβος ἀρομαρι-
νός*: Arabibus, Adcher: Officinis, Squinan-
thum: Italis, Ionco odorato, siue, Squinan-
tho: Germanis, Kamelstro: Hevv: Hispanis,
Paya de la Mequa: siue, Paya de Chamel-
los: Gallis, Squinanthum.

Theo. li.
de natu.
plan. ca.
pi. 7.

Gal. li. 5.
úm. mc.



Locus.


Nascitur in
Palustribus
conuallium,
trās Libanū
montem,

Qualitates.

Modicè ex-
calfacit, mo-
dicè astrin-
git, nec planè
à tenuitatis
naturā alie-
nus est.

Cala

Calamus odoratus: Græcis, κάλαμος ἀρωματικός.



Locus.

Nascitur in palustribus, trans Libanum Montem.

Qualitates.

Leuiculam quandam astringentem, ac minimam acrimoniam possidet: magna ex parte essentia eius terrena est, & aërea, in caliditatis frigiditatisque coniugatione temperata.

b 4 Musc

Theo. de
na. plan.
li. 9. ca 7

Gal. li. 8.
sim. me.

Musculus: Græcis, βρύον, καὶ σπλάγχνον: Arabibus, Axnech, siue Vsnee: Officinis, Vsnea: Italis, Mosco: Germanis, Moosz: Gallis, Mouffe.



Locus ex Matthiolo.

Inuenitur in Quercubus, Piceis, & Populis
albis. Qualitates.

Gal. li. 6.
sim. me.

Vim habet adstringentem inuvalidam: nec
enim multum est frigidum, medicamentum sed
propinquum medijs: quia videlicet, & digeren-
di, & emolliendi facultatis est particeps.

Croc

Crocum, siue Crocus: Græcis, κρόκος: Arabibus, Zahafaran: siue, Zafaran: Italis, Zaffarano: Germanis, Saffran: Hispanis, Azafran: Gallis, Saffran.

Locus ex Fuchfio.

Seritur radice in hortis.

Qualitates.

Paululum

adstringens

Gal. li. 7.

quid obtinet,

sim. me.

quod terrenum,

& frigidum

est: sed superat in eo cal.

facies & qua-

litas, & facul-

tas: Et tota

eius essentia

secundum sit or-

dinis exalta-

cientium, &

primum exicca-

tum. Concoquit etiam, adiuuante pauca ad-

frictione.

b 5 Hele



Helenium, siue Enula Campana, Græcis,
ἡλένιον: Arabibus, Iasim, siue, Rasen: Italis,
 l'Ella, Enoa, siue Enola: Germanis, Alant:
 Hispanis, Raiz de alla: Gallis, Aulnee, siue,
 Herbe de l'Aune.



Locus.

Diosc. li. 1. *Nascitur in montanis, umbrosis, et siccis locis.*
 cap. 27.

Qualitates.

Gal. li. 6. *Non excalfacit primo occurssu: calida enim*
 sim. me. *& sicca est, sed cum recrementitio humore.*

Gelsi

Gelsiminum: Arabibus, Zambach, siue,
Sambach, aut Iesemin: Gallis, Iessemin: Ita-
lis, Gelsimino.



Locus ex Matthiolo.

Scritur in hortis: exoticum enim censetur.

Qualitates ex Serapione.

Excalfacit ordine secundo.

Styrax:

Syrax: Arabibus, Miha, Meha, Mehaha
feu Astarach: Officinis, Storax calamita: Ita
lis, Stirace: Hispanis, Estoraque.



Locus.

Pli. li. 12.
cap. 25.

*Nascitur in Syria Indae, circa Gabala, &
Marathunta, & Cassium Seleucia montem.*


Gale. li. 8
fim. mc.

Qualitates.

Excalfact, emollit, concoquit.

Pinus

Pinus: Græcis, πέννη: Arabibus, Sonobar:
 Italis, & Hispanis, Pino: Germanis, Hartz-
 baum siue Kinholtz: Gallis, Pin.



Lo cus.

Nascitur in montibus & Syluosis.

Plin. libr.
 16. ca. 18

Qualitates.

*Nux Pineæ boni accressi est succi, multum
 que nutrit: non tamen facile coquitur.*

Gal. li. 2.
 de alim.
 facul.

Picea

Picea : Græcis, *πίτυς*, Arabibus, Arz: Ita-
lis, Pezzo: Germanis, Rot Dannebaum: Hi-
spanis, Pino negro: Gallis, Pefse, Pignet, fi-
ue, Garipot.




Locus.

Plin. lib.
16. ca. 18

Nascitur in montium ingis.

PIRUS

Pinus Sylvestris: Gallis, Pin sauvage.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montium iugis.

Pinus

Pinus sylvestris, Ananienfibus
dicta, Mughi.




Locus ex Matthiolo.

Nascitur in praaltis Montium iugis.

Pinus

Pinus Syluestris Italica dicta Cembro,
& Cirmolo.



Locus ex Matthiolo.
Nascitur in praetis Montium ingis.

c Pinus

Pinus maritima, primi generis.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Pinus

Pinus maritima altera.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

c 2 Larix

Larix, Græcis, & Latinis: Italis autem dicta Larice, siue, Larege: Germanis Lerchembaum: Gallis, Melze, siue Meleze.

Plin. lib.
16. cap. 18

Galen. libro 3. de
compo.
medica.
per gen.



Locus.

*Nascitur in
montium In-
gis.*

Qualitates
Resinæ Lari-
gnæ.

*Resina La-
rigna ceteris
humidior est:
substantia ve-
rò similis li-
quida Piceæ:
acrior autem
odore, gustu,
& facultate,
Terebynthina.*

Abies

Abies : Græcis, ἰλᾱτῆν: Italis, Abete: Germanis, Thannen, siue Thannebaum: Gallis, Sapin.

Locus.

Nascitur in Plin. lib.
montibus: & 16. ca. 18.
in Valles etiā
descendit.

Qualitates.

Inter Resi-
nas, cateris odo-
ratiores habent
tur Terebinthy-
na, & Abie-
gna : calidior
autem est poste-
rior, priore.

Gale. li. 3.
de comp.
medi. per
gene.



c 3

Lentif

Lentiscus: Græcis, Σχῖνος: Arabibus, Daru:
 Italis, Létisco: Hispanis, Mata, siue Arueira:
 Gallis, Lentisque: Germanis, Mastix baum.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 8.
 simpl. me-
 dica.



Nascitur in
 planitierum
 & collium syl-
 uis, & in ma-
 ritimis, colla-
 psisque adificijs
 & ruderibus.

Qualitates.


Lentiscus fa-
 cultate ex a-
 quea essentia
 leniter calida,
 & terrena fri-
 gida non pau-
 ca compositus
 est: ob quā mo-

deratè adstringit. Desiccatur igitur secūdo ordi-
 ne completo, aut tertio incipiente: in calidita-
 tis & frigiditatis differentia quodammodo
 est medius & symmetrus.

Tere

Terebynthus: Græcis, *τέρινθος*: Arabibus,
Baton, Boton, Botin, Albotin: Gallis, Ter-
bentin.

Locus ex Matthiolo.



*Amat mon- Theopla.
tes, Rudera, de natu.
& collapsa plan. li. 3.
adificia. cap. 15.*

Qualitates.

*Terebinthi Gal. li. 8.
tum folia, tū simpl. me-
cortex, tum dica.
fructus adstri-
ctorium quid-
dam obtinēt:
sed & secun-
do excalfa-
ciunt ordine.
Desiccāt qui-
dem recentes*

modicè: sicci verò, ordine secundo.

Qualitates Resinarum
in genere.

Resinae omnes desiccant, & excalfaciunt.

C 4

Cup Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Cupressus: Græcis, κυπάρισσος & Arabibus,
Saro, siue Seru: Italis, Cipresso: Gallis, Cy-
prés.



Locus.

Pli. li. 16.
cap. 18.

*Odit aquosos tractus: & Montibus dele-
tatur: Cæta est illi proprium natale solum.*

Qualitates.

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.

*Cupressi folia, germina pilula recentes, de-
siccant, absque insigni acrimonia.*

Iuni

Iuniperus: Græcis, ἀρνὸς δ' ἰς: Arabibus,
Arconas, siue Archencas: Italis, Ginepro:
Germanis, Vveckholter, siue krametbaum:
Hispanis, Enebro: Gallis, Geneure.



Locus.

Montosis, collibus, & locis aridis delecta-
tur. Pli. li. 16.
cap. 18.

Qualitates.

Iuniperus calida & sicca & trinque, tertij
ordinis. Gale. li. 6.
simpl. me
dica.

c s

Sabi

Sabina: Græcis, *βράβυς*: Arabibus, Abel, Abhel, siue Alharar: Italis, Sabina: Germanis, Seben baum: Hispanis, Sabina: Gallis, Sauinier.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur in montibus: & seritur in hortis.


Qualitates.

Vehementer desiccatur: particeps itē est acrimonia consistentis in temperamento calido: & amaritudinis & adstrictionis obscurioris quam


in Cupresso. Ita ut sit tertij ordinis exalfacientium, & desiccantium; & maxime tenuium partium.

Ced

Gale. li. 6.
simp. medica.



Cedrus Phœnicia: Grecis, *Ἰξουέδρος* Ara-
bibus, Serbin: Italis, Cedro: Gallis, Cedre.



Locus.

Montibus delectatur.

Qualitates.

Cedrus est calida siccaque temperatura, ter
tij quodammodo ordinis, secundum Vtrū-
que.

Pli. li. 16.
cap. 18.

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.

Cedrus

HISTORIA
Cedrus Lycia: Gallis,
petit Cedre.



Locus & Qualitates.

*Huc referenda sunt omnia quæ de Oxyce-
dro dicta sunt.*

Laurus:

Laurus: Græcis, *Δάφνη*: Arabibus, Gaur,
sive Gar: Italis, Lauro: Germanis, Lorbeer-
baum: Hispanis, Laurel, sive, Loureiro:
Gallis, Laurier.

Locus.



Nascitur in Plin. l. 6.
montibus syl. cap. 18.
uosi: & ubi Gal. li. 9.
que feritur. simpl. n. c.
dica.

Qualitates.

Folia & fru-
ctus desiccant,
& calfaciunt
vehementer:
piusque etiam
fructus quam
folia. Radicis
cortex minus
quidem acris
est, & cali-
dus, plus ta-

men amarus: habetque etiam adstrictionis
nonnihil.

Plata

Platanus, Latinis, & Græcis: Arabibus
autem, Dulb: Italis, Platano: Gallis, Plan,
sive Plane: Germanis, Mafz holder.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur iuxta flumina, & in aquosis.


Qualitates.

Gale. li. 8.
simpl. me
dica.

*Humidioris, frigidiorisque essentia est, non
ita multò quàm symmetra.*

Fraxinus

Fraxinus: Græcis, μελία: Italis, Frassino: Germanis, Eschern, Eschebaum, siue Steyneschern: Hispanis, Fresno, siue Frexo, Gallis, Frefne.



Locus.

Nascitur in montibus aquosis.

Qualitates.

Adstringit, abstergit & potu pernicio-
sa est.

Plin. libr.

16. ca. 18.

Dioscor.

lib. 1. cap.

92.

Dicta

Dictamus albus: Gallis, Dictam
blanc.



Locus.

Montibus syluosis delectatur.

Qualitates ex Matthiolo.

Excalfcit: & suapte vi pollet aduersus omnia venenosa, sed & ad pestilentiam.

Populus

Populus alba: Græcis, λεύκη: Arabibus,
Haur: Italis, Popolo bianco: Germanis,
Bellen Popel baum, siue Sarbaum: Hispanis,
Alamo blanco: Gallis, Peuplier.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in-
xtra flumina, Plin. libr.
Et in aquis 16. ca. 18.
Montibus ite Gal. lib. 7.
gaudet. simpl. me
dica.

Qualitates.

Mista quo-
dammodo tē-
peratura est ex
aqua tepida,
Et terrena ex
tenuata essen-
tia: quam ob-
rem Et abster-
gentis faculta-
tis est parti-
ceps.

d

Popu

Populus nigra: Græcis, αἰγυρὸς. Arabibus,
Haur romi: Italis, Popolo nero: Germanis,
Aspen, sine Poppel vueden: Hispanis, Ala-
mo nigrillo: Gallis, Tremble.

Locus ex Matthiolo.

Plin. libr.
16. ca. 18.
Gal. li. 6.
simpl. me-
dica.



Nascitur in
exta flumina,
Et in aquosis,
montes etiam
amat.

Qualitates.

Flores sunt
calidi in primo
recessu à tem-
peratis. Sed in
differētia qua
habetur in sis-
cando Et hu-
meclando, pau-
lūm à tempe-
ratis Et me-
diis ad siccus
deflexerunt: Verūm Et subtiliorum potius
quā crassiorum sunt partium. Folia floribus
sunt imbeciliora. Resina floribus calidior est.

Populus

Populus Alpina, siue Lybica: Græcis,
νεπυς: Gallis, Espece de Tremble.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in nemorosis, & montibus.

Qualitates.

Huc refer quæ de Populo nigra dicta sunt.

d 2

Betula:

Betula: Italis, Bedollo, siue Betula: Germanis, Birck, Gallis, Boule, Byole, siue Bouleau.



Locus.

*Nascitur in aquosis, & iuxta aquarum
Plin. libr. decursus, & amat tractus frigidos & ni-
16. ca. 1. uos.*

Qualitates, ex Matthiolo.

*Liquor, qui ex eius incisione prodit, inci-
dit, & abstergit.*

Ulmus:

Vlmus: Græcis, *ω/ελέα*: Arabibus, Didar,
Dirdar, siue Luzach: Italis, Olmo: Germa-
nis, Ylmen, Ristenholtz, Lindhast, siue
Yffenholtz: Hispanis, Vlme: Gallis, Orme.



Locus.
Planicie &
montibus gau- Plin. libr.
det Vlmus. 16. ca. 18.
Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Qualitates.

Adstringen-
tem pariter et
abstergentem
habent facul-
tatem folia.
Cortex am-
pius etiam
subamarus
est, & adstri-
ctorius: et vim
spissandi ha-
bet. Radices

eandem vim obtinent.

Qualitates ex Plinio.

Folia, cortex, & rami, vim habent spissandi. Plin. libr.
d 3 Arundo: 24. cap. 3.

Arundo: Græcis, κάλαμος: Arabibus,
Casab: Italis, Canna: Germanis, Cor: Hi-
spanis, Cānas: Gallis, Cannes, siue Roseaux.

Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in
palustribus, &
aquosis.

Qualitates.

Abstergen-
tem faculta-
tem possidet nō
paucam, mini-
mēque acrem.
Folia abster-
gunt. Cortex
combustus te-
nuium admo-
dum est par-
tium, & di-
gerentis facul-
tatis. Abster

sorium etiam quiddam obtinet: ut exiccet &
excalfaciat tertio quodammodo ordine: plus
tamen desiccet, quam excalfaciat.

Myrica

Gal. li. 7.
simpl. me-
dica.



Myrica, siue Tamarix : Græcis, Μυρίκη:
Arabibus, Tarfa, seu Carfa: Italis, Tamari-
gio: Germanis, Tamarisken, siue, Porst: Hi-
spanis, Tamargueira, siue Tamaris: Gallis,
Tamarisc.

Locus.



Nascitur a- Dio. li. r.
pud pigras, & cap. 99.
stagnantes a-
quas : et iuxta
fluminiū ripas.

Qualitates.

Abstergentis Gal. lib. 7.
est ac inciden- sim. mc.
tis facultatis,
absque perspi-
cua desiccatio-
ne. Habet etiā
adstrictionem
nonnullam.

d 4 Erica

Erica: Græcis, ἐρίκη: Italis, Erica: Germanis,
Heyden: Hispanis Queiro: Gallis, Bruyere.

Locus ex Fuchfio.

*Nascitur in
campestribus:
et colles amat
sabulosos. Syl-
uosus item gau-
det.*

Qualitates.


*Digerendi,
per balitū. fa-
cultatem obti-
net.*

Ex Fuchfio.

*Calida est &
sicca: Et ex a-
maritudine
conijcitur.*

Erica

Gal. li. 5.
fidi. mc.



Erica altera: Gallis, Seconde espece de
Bruyere.



Locus & Qualitates.

Huc refer quæ de Erica priore dicta sunt.
d 5 Rham

Rhamnus, Latinis, & Græcis: Arabibus vero, Nausig, siue, Nauségi: Italis, Rhamno, siue, Marruca: Hispanis, Scambrones: Gallis, Burguespine, siue, Neprun: Germanis, Falbaum.



Locus.

Fructificat in sepibus.

Qualitates.

Dio. li. 1.
cap. 102.
Gal. li. 8.
sim. me.

Desiccatur & digeritur excessu secundo: refrigeratur in primo completo, aut secundo incipiente.

Rham

Rhamnus secundus.



Locus, Qualitates,

*Huc refer omnia quae dicta sunt de Rhamno
primi generis.*

Rham

Rhamnus tertius.



Locus, Qualitates.

*Hæc refer quæcunque dicta sunt in
Rhamno primi ordinis.*

Spino

Spino Merlo, Spin Ceruino, siue Spin
guerzo Italis.



Locus.

Fructificat in sepibus.

Qualitates ex Matthiolo.

*Baccarum succo stuntur Pictores, & bi co-
lore viridi inficere sit opus.*

Hali

Halimus, siue Atriplex marinus, Græcis,
 ἅλιμος: Arabibus, Molochia: Italis, Bidone,
 siue Halimo: Gallis, Franche Pute, siue blā-
 che Pute.

Locus.

Nascitur in
 sepibus, & ma-
 ritimis.

Qualitates.

Gustus falsi
 est, & adstrin-
 gentis: ex qui-
 bus palam est,
 ipsam esse dis-
 similarē. Ma-
 ior autē pars
 eius substantia
 calida est tem-
 peratē, cum hu-
 miditate incō-
 fecta, & leui-
 ter flatuosa.

Palma

Dios. li. 1.
 cap. 10.
 Gal. li. 6.
 sim. me.



Paliurus Aphricana: Theophrasto, Agria,
sive Aria, aut Agrifolium: Italis, Agrifoglio:
Gallis, Houx.



Locus.

*Nascitur in nemorosis, & locis aridis nec
minus quoque diutis.*


Qualitates.

*Folia & radices non obscure adstringunt, Gal. li. 8.
& digerunt. Fructus vero valde incidunt. sim. me.*

Acuta

Theo. li.
3. cap. 17.
de natu.
plant.

Acuta Spina, siue, Oxyacantha, Græcis,
 ὀξύκανθα: Arabibus, Amirberis, Amirbaris,
 siue Berberis. Italis, Bagaia, Amperlo, Pan
 d'Orso, siue Barazzo bianco: Gallis, Aube-
 spin: Hispanis, Pirlitero, siue Pilliriteros.



Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 8.
 sim. mc.

Fructicat in sepibus, & nemorosis.

Qualitates.

*Fructus tenuium est partium, & paulum
 quiddam incisum habet: cetera Pyro similis.*

Berb

Berberis vulgaris, siue Crespinus: Italis,
Crespino: Germanis, Versich: Gallis, Espi-
ne-vinette.

Locus ex Fuchfio.




Fructicat in
sepibus, frute-
tis, montosis,
& locis siccis
& aquosis.

Qualitates
ex Fuchfio.

Adstringit
& desiccatur: re-
frigerat autē
& desiccatur in
secundo ordi-
ne. Fructus
quiddam in-
cidens obtinet
& tenuium
est partium.

e Vua

Vua crispa: Italis, Vua Spina, Vua Marina,
 siue vua crespina: Germanis, Vveg dorn,
 siue Creutz beer: Gallis, Groiselier.



Locus ex Fuchsio.

Fructicat in sepibus.

Qualitates ex Fuchsio.


*Adstringit & refrigerat primo ordine com-
 plecto, aut secundo incipiente, desiccatur autem
 in secundo.*

Ribes

Ribes vulgaris: Italis, Ribes: Germanis.
S. Iohans Treublin: Gallis, Ribettes, Raisins
d'oultre Mer, siue, Groizelles d'oultre Mer.

Locus ex Fuchfio.

Septis & hor-
torum areis
sepiendis acco-
modatissimus
eaque de cau-
sa feritur ho-
die.



Qualitates
ex Fuchfio.

Folia & fru-
ctus valde ad-
stringunt. A-
rabibus refri-
gerat & desic-
cat in secundo
ordine.

e 2

Ligu

Ligustrum: Græcis, *νύκτος*: Arabibus Kenne Henne, siue Hanne: Officinis, Alcanna: Italis, Guistria, Oliuella, Oliuetta, siue Chambrossene: Germanis, Rheinveiden, Peynhoëltzlin siue Mund holt, siue Hartrigel: Hispanis, Alfena, siue Allena: Gallis, Troësne, siue Frezillon.

Pli. li. 16.
cap. 18.

Gal. li. 7.
simpl. me-
dica.



Locus.

In nascitur Se-
pibus: Et se-
cundum Pli-
nium gaudet
aquosus.

Qualitates.

Folia Et
summa germi-
na tempera-
menti sunt
maximè mi-
sti: habent e-
nim quiddam
digerētis, cum
aquea substā-
tia modicè ca-
lida: habent-
que etiam ad

strictorium, quiddam ex terrena substantia
frigida. Desiccant item absque morfu.

Phyl

Phyllirea, Latinis, & Græcis: Arabibus
autem Mahaleb.



Locus.

Nascitur tantum in asperis montibus.

Diosc. li. i.
cap. 108.

Qualitates.

Folia adstringunt,

c 3

Tilia Diosc. su-
pra eo.

Tilia: Græcis, φιλύρα: Italis, Tilia: Germanis, Linden: Gallis, Til, siue Tillet.

Locus.

Nascitur in
montium in-
gis aquosis.


Qualitates
ex Dioscori-
de, & Fuch-
sio.

Cortex vim
spissandi ha-
bet: folia au-
tem, discu-
tiendi, Tilia
calida est: a-
maritudine
& lentore gu-
stu abundans.

Abstergit igitur, & leniter adstringit.


Cistus

Plin. lib.
16. cap. 18



Cistus Mas: Græcis, *νίσος* & *νίσος*, *νίσος*
αγρός: Arabibus, Kaniet, Altheis, siue Lhaie
 Althis: Italis, Cisto: Hispanis, Cerguacos.

Locus ex Matthiolo.



*Aspera loca,
 Et montium
 inga amat.*

Qualitates.

*Astringit: Gale. li. 7.
 Folia autem simpl. me-
 Et parua ger dica.
 mina valde
 desiccant, Et
 astringunt.
 Flore Verò
 non instrenue
 desiccant: Et
 sint secundi
 excessus à tem-
 peratis abso-
 luti.*

e 4

Cistus

HISTORIA
Cistus Foemina.



Locus, & Quali-
tates.

Huc refer que de Cisto mare dicta sunt.

Hypo

Hypocistis.



Locus.

Nascitur iuxta Cisti radices.

Dios. li. 1.
cap. 139.

Qualitates.

*Magis adstringit quàm folia Cisti: roborat
autem & confirmat corpora.*

c 5

Ledum:

Ledum: Græcis λῆδον: Arabibus, Chafus, Ledi Lentor, siue pinguitudo: Græcis, Ἀδά-
 λανον: Arabibus, Ieden, siue, Laden: Offici-
 nis, Ladanum: Italis, Laudano, siue Odano
 Hispanis, Xara.

Locus.

Nascitur in
 calidioribus
 regionibus.

Qualitates.

Eiusdem tem-
 peramenti est
 cum Cisto: ca-
 lidius tamen
 censetur.

Qualitates
Ladani.

Calidum est
 excessu primo
 quodammo-
 do completo:
 Et videlicet
 Et secundum
 attingat.

Habet etiam adstrictionis paululum. Adhuc,
 substantia tenui: ac proinde emolliens, modera-
 te digerens, Et concoquens.

Rosa

Gal. li. 7.
 simp. me-
 dica.



Rosa: Græcis, ῥόδον: Arabibus, Nard, Nardō, seu, Vard: Italis, Rosa: Germanis, Rosen: Hispanis, Rosas: Gallis, Rosier: Flores autem, Rosæ.



Locus ex Fuchfio.

Domestica, nascitur in Hortis: Sylvestris vero, Septis & Campestribus gaudet.

Qualitates.

Constat ex aquea substantia calida, mista duabus alijs qualitatibus, adstringenti & ideli cet, & amara.

Gal. li. 7.
simp. me
dica.

Lycium

Lycium: Græcis, λυκίον, ἢ πυξάνανθα: Arabibus, Hadhath, Hadad, Kilulem, siue, Felzakarag: Officinis, Lycium.

Dio. li. i.
cap. 114.
Gal. lib. 7.
simp. me.



Locus.

Asperis gaudet.

Qualitates.

Facultatis est exiccatoria, compositum ex diuersi generis substantiis: altera quidem tenuium partium digerente atque calida: altera terrestri, & frigida, ex qua adstrictionem obtinet.

Qualitates Lycij.

Digerit & desiccat in secundo recessu: in calore autem mediis & symmetris proximum est.

Aca

Acacia, Latinis. & Græcis: Arabibus autem, Achachie: Officinis Acacia.

Locus.

Nascitur in Theoph.
Aegypto, & de natu.
in Thebano a- plan. l. 4.
gro, in sylvis cap. 3.
riguis. Gal. li. 6.
simp. me.

Qualitates.

Frigidum est
& terrosum,
immista qua-
dam etiam ef-
sentia aquea.
Nec est simila-
re: tenues e-
nim & cali-
das partes in
se dispersas ha-
bet, quæ in ipsa

ab'utione segregantur: Et sit tertij ordinis
exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi
elotum fuerit: illotum verò primi.

Vitix


ἑλαγχων
α. Τ. θρόν. β.
vocat quod
similis sit oleo
a.

Vitex, Salix Amerina, siue Agnus castus
Græcis, ἄγνος η̄γει λύγος: Arabibus, Faman-
chest, Samanchest, siue Bengiechest: Italis,
Vitice, siue Agno Casto: Germanis, Schaff's
mulle, siue Kenschlamp: Hispanis, Gatillo
casto: Officinis, Agnus Castus.

Semen ē quod piperella vocatur, ἀχρωον
ἔσ. medicamentum. Locus.

Dios. li. i.
cap. 116.

Gale. li. 6.
simp. me.



Nascitur in
fluminum ri-
pis, asperisque
locis, ac tor-
rentium al-
neis.

Qualitates.

Excalfacit
Et desiccatur in
tertio ordine:
Et valde te-
nuum est par-
tium. Folia, et
semen calida,
siccaque facul-
tate sunt: sub-
stantia verò tenui.
Salix


Salix, siue Vitex: Græcis, *itréa*: Arabi-
bus, Bulef, Bhulles, Saffaf, siue Chalif: Ita-
lis, Salice, siue Salcio: Germanis, Vueiden,
siue Felbinger: Hispanis, Salce, siue, Sal-
gueiro: Gallis, Saulx.

Locus.

Nascitur in Pli. li. 16.
aquosis. cap. 18.

Qualitates.


Folia vim
spiffandi ha- Gale. li. 6.
bent: Flores simp. me.
Verò desiccāt
absque mor-
fu. Habet e-
tiam quan-
dā adstri-
ctionem Sa-
lix.



Oleaster

Oleaster, siue Olea Syluestris: Grecis, ἀγρελαία, ἢ νότινος: Italis, Oliuo saluatico: Germanis, Vuilder oelbaum: Hispanis, Azebuche: Gallis, Oliuier fauuge.

Pli. li. 16.
cap. 18.
Gale. li. 6.
simp. me.



Locus.

Nascitur in
montibus cā-
pestribus, &
insulis.


Qualitates.

Oliuæ ra-
mi quantum
habent adstri-
ctionis, tanta
& frigidita-
tis participes
sunt. Fructus
verò, si qui-
dem perfectè
maturus est,
moderatè cal-

facit: sin immaturus, magis tum adstringit,
tum refrigerat.

Olea

Olea fatiua : Græcis, *ελαια* *ἡμερος*: Arabi-
bus, Zaiton, siue Caiton: Italis, Oliuo do-
mestico : Germanis, Oelbaum : Hispanis,
Oliuo, siue Azeytuno: Gallis, Oliuier.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in planicierum collibus: Et quan-
doque montes ascendit.*

Qualitates.

Huc refer quæ de Oleastro dicta sunt.

f

Quer

Quercus: Græcis, *Agūs*: Arabibus, Chul-
lot, Hullet, siue Belut: Italis, Quercia: Ger-
manis, Eychbaum: Hispanis, Robre: Gal-
lis, Chesne.

Locus.

Pli. li. 16.
cap. 18.

Cal. lib. 6.
simp. me.



Descendant
Et in plana
Quercus.

Qualitates.

Quercus par-
tes omnes ad-
stringēis qua-
litatis partici-
pes sunt. Sed
plus tamen ha-
bet adstrictio-
nis, quæ in trū-
ci cortice mem-
brana subest:
tum quæ sub
glandis ipsius
caliculo, ea vi-

delicet quæ fructus carnem conuestit. Folia
etiam non infrenuè desiccant.

Fagus

Fagus: Græcis, φηγὺς: Arabibus, Chinars, siue Chiachas: Italis, Faggio: Germanis, Burchbaum: Hispanis, Haia: Gal-
lis, Fau.



Locus.

Planicie & colliculis delectatur.

Qualitates.

Valentius astringit quàm Quercus, cetera, simp. mc.
Quercubus simillima.

Pli. li. 16.

cap. 18.


Gale. li. 6.

simp. mc.

f 2

Ilex

Ilex : Græcis, *ωρίνος*: Arabibus, Carmas,
 siue Barbes : Hispanis, Anzina, siue An-
 zinheira: Italis, Elice: Germanis, Stechend
 Palmen: Gallis, Yeuse.



Locus.

Subit montosa.

Qualitates.

Pli. li. 16.

cap. 18.

Gale. li. 6.

*Vim & qualitates Quercus habet : sed ea
 simp. me. lentius adstringit.*

Suber

Suber : Italis , Souero : Gal-
lis , Liege.



Locus ex Matthiolo.

Montosis, & planicie gaudet.

Qualitates.

*Non instrenuè adstringit : caterà Quercu-
bus similis.*

f 3

Castia

Castaneæ: Græcis, κάστανα, σαρδανίου βάλα-
νοι, ἢ δῖος βάλανοι, ἢ λοπίμα: Arabibus, Sadi-
nalach, Castal, & stebulot: Italis, Castagne:
Germanis, Kesten: Hispanis, Marones: Gal-
lis, Arbor, Chastaignier: Fructus verò, Cha-
staignes,



Pli. li. 16.
cap. 18.
Dio. li. 1.
cap. 122.
Gal. li. 2.
de alim.
facul.

Locus.

Montes & Valles diligit.

Qualitates.

Adstringunt: & sunt boni succi.

Galla

Galla: Græcis, ~~unris~~: Arabibus, Hafes, siue
Hafus: Italis, Galla: Germanis, Galloëpfel,
siue, Eicoëpfel: Hispanis, Galla, siue, Bugal-
la: Gallis, Noix de Galle.



Locus.

Mores et Val Pli. li. 16.
les diligit. cap. 18.

Qualitates.

Galla Om Gale. li. 7.
fin. me.

phacitis acer-
ba est, & ple-
raq; sui par-
te essentia ter-
rena, & frigi-
da. Itē, reper-
cutit, desiccāt
& cōstringit.
Vt sit, in desi-
candō, tertij
ordinis: secun-
di autē in re-
frigerando.

Galla flaua minus desiccāt Galla Omphaci-
tide. Galle omnes, crematæ, tum subtiliorum
sunt partium, tum maiore desiccandi potestā-
te & valent.

f 4 Rhus

Rhus, Fluida Theophrasto Latine red-
dito: Græcis, ῥῆς: Arabibus, Sumach, Ros-
bar sadisticos, seu Rosaidicos: Italis, Rhu,
siue, Sumach: Germanis, Sumach: Hispanis,
Sumach, & Sumagre: Gallis, & Officinis,
Sumac.



Locus.

Nascitur in Petrosis.


Qualitates.

*Est ex tertio ordine exiccantium: ex secun-
do Verò refrigerantium.*

Vib

Dio. li. 1.
cap. 124.
Gale. li. 8.
sim. mc.

Viburnum: Italis, Lantana: Gallis, Vior-
ne, siue Maufflane.



Locus ex Matthiolo.

Fructicat in sepibus, & collibus nemorosis.

Qualitates ex eodem.

*Adstringit: nondum tamen comperta sunt
huius planta qualitates.*

f 5 Palma

Palma: Græcis, φοίνιξ: Arabibus, Machla, siue Nachal: Italis, Palma: Germanis, Dattelbaum: Hispanis, Palmera: Gallis, Palmiers, siue, Dattiers.

Palmulæ, siue Dactyli: Græcis, δάκτυλοι, καὶ φοίνικες: Arabibus, Tamar: Italis, Dattoli: Germanis, Dattilen: Hispanis, Tamaras, & Dattiles: Gallis, Dattes.

Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in
maritimis.*

Qualitates.

Palma adstringit omnibus suis partibus, Succus ramorum constat ex aqua substantia tepida, & terrea frigida.

Palmula non paucam obtinent caliditatem, & maxime dulces.

Malum

Gale. li. 8.
sim. me.



Malum Punicum: Græcis, *ῥοιὰ*: Arabibus, kuman, Ruman, seu, Roman: Italis, Melagrano, siue, Pomo granato: Germanis: Granatoëpfel: Hispanis, Granadas, siue, Romanas: Gallis, Pommes de Grenades, aut, Mygraines.

Locus ex Matthiolo.



Seruntur in
Vinētis, & Vi
ridarijs: &
sponte nascū
tur in plani
cie, & Colli
culis.

Qualitates. Gal. li. 8.
sim. me.

Malū Gra
natum omne
adstringentē
qualitatē ob
tinet: non tamen in omni
bus ea exupe
rat. Acinima
gis quā suc
cus, tum ad

stringunt, tum exiccant: ijs etiam magis pu
tamina. Ad similem illis vim habent cytini.

Myrtus

Myrtus: Græcis, *μυρτιά*: Arabibus, Aës,
 Alas, siue As: Italis, Mirto: Germanis,
 Vvelsch Heydelbeer: Hispanis, Murta, siue,
 Raiam: Gallis, Meurte.

Pli. li. 16.
 cap. 18.
 Gale. li. 7.
 sim. me.



Locus.

Nascitur in
 maritimis,
 & lacuū ri-
 pis: raro autē
 in montibus,
 & frigidis
 tractibus.

Qualitates.

Constat ex
 contrarijs sub-
 statijs: Vincit
 tamen, in ea,
 frigidum ter-
 renum: Ha-
 bet Verò et te-
 nue quiddā
 calidum: On-
 de Salēter de

siccatur. Folia, germina, fructus, & succus non
 parum, inter se in adstriptione dissident.

Myrtus

Myrtus Tarentina.



Locus, & Qualitates.

*Huc refer quæ dicta sunt de Myrto: adstrin-
git tamen valenter Myrtus: ea enim persi-
ciuntur & crispantur coria.*


Myrtus

Myrtus exotica. Vide quæ de Myrtis
dicta sunt.



Cerasia

Cerasia Latinis & Græcis: Arabibus autem, Sarasie: Italis, Ciregie: Germanis, Kirsen: Hispanis, Cerefas: Gallis, Arbor, Cerifier: Poma, Cerises.



Locus.

Nascitur Pli. li. 16.
in montibus cap. 18.
aquosis, Vallibus, et planis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
sim. me.

Cerasus arbor fert fructum non parvis adstrictio-
nis in omnibus particula-
tim plantis participem.

Qualitates Dioscor.
ex Dioscor. lib. 1. cap.
Cerasa Viri- 129.

dia a'uum emolliunt: siccata, sistunt.

Siliquæ.

Siliquæ: Græcis, *legaria*: Arabibus, Charunb: Italis, Carobe, & Carobole: Germanis. S. Iohans brot: Hispanis, Alfarobas: Gallis, Carrouges: Officinis, Carobe.

Locus, ex Matthiolo.

Gal. li. 7.
sim. me.



Planicies
amat. Fre-
quens est in
Regno Nea-
politano.

Qualitates.

Ceratonea
exiccantis est,
& adstrin-
gentis facu-
tatis, sicut &
fructus eius.
Ceratia hu-
mida Ventre
subducunt: sic
ca vero ma-
gis sistunt.

Malus

Malus, siue Pomum: Græcis, *μυρία*: Arabibus, Tuffa, siue Tufaha: Italis, Pomo, siue Melo: Germanis, Oëpfel, Hispanis, Manfanas: Gallis, Arbor, Pômier: Fructus, Pôme.

Locus.

Locis cultis Pli. li. 16.
innascitur: & cap. 18.
inculta montosa & plana
amat.

Qualitates

Acida mala Gal. li. 2.
la frigidum de ali. fascul.
quidem succum
habet: Verum
tenuum est
partium. Gustu
adstringentia
succum habent
frigidum ac
terreum.

Dulcia ad calidius vergunt

& media sunt temperatura. Insipida, & velut aquosa ad frigidius declinant.

g

Coto



Cotonea Malus: Græcis, *νυδώνιος μῆλες*:
 Arabibus, Saffargel: Italis, Mele Cotogno:
 Germanis, Kitten, siue Kутten: Hispanis,
 Mébrillos, siue Marmellos, Gallis, Arbor,
 Coignier: Poma Cydonia: Pômes de Coing.

Pli. li. 16.
 cap. 18.



Locus ex Fuchfio.

*Montes odit.
 Cultis gaudet
 frigidis, &
 humidis: &
 conualles a-
 mat.*

Qualitates
 ex Fuchfio.

*Valenter ad-
 stringunt, id-
 que ex essen-
 tia frigida
 terrea. Mi-
 nus hume-
 Etant quàm
 reliqua Po-*

*ma: refrigerant enim ordine primo: & desic-
 cant secundo.*

Perfi

Perfica Malus : Græcis , *περσική μηλιά* , ἡ
ῥοδανηνα : Arabibus, Sauch, siue Cauch : Ita
 lis, Pesche : Germanis, Pfersich : Hispanis, Pe
 xegos : Gallis, Arbor, Peschier : Fructus, Pe
 sches.

Locus ex Fuchfio.



Seritur in vi
 metis. Et hor
 tis : Et nasci
 tur in aqua
 sis.

Qualitates
 ex Fuchfio.

Folia Et par
 ua germina
 amara sunt,
 atque adeo
 calida : sed
 Persica frigi
 da sunt Et
 humida, in se
 cundo excessu.

Mala

g 2

Mala Armeniaca, siue Præcocia : Græcis, μήλα ἀρμενιανὰ, ἢ πραινοῦνια, ἢ βερνόννια: arabibus, Mermex, Mirmix. Mex, Mesmei, siue Misinis: Italis Bacoche, Grisomele, siue Morache, Germanis, S. Ioans. Pfersich : Hispanis Albiricoques, Albarchigas, seu Aluariques: Gallis, Abricoz, Carmaignoles, & Chicandeliz.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in hortis. Et Vinetis: aquosis autē gaudet.

Qualitates.

Genere, Et dotibus, parū dissidet à Persicis.

Gale. li. 2.
de alim.
facul.

Medi

Medica mala, Citromala, siue Mala Citria: Gæcis, κίτρον, μηδικὰ μήλα: ἢ κεδρόμηλα: Italis, Cedri, & Citroni: Germanis, Citrin oëpfel: Inden oëpfel, siue Citronalen: Hispanis, Cidras: Gallis, Citron.

Locus ex Matthiolo.



Seruntur
tanquam e-
xotica. Inso-
tis autem col-
libus delecta-
tur.

Gale. li. 6.
simp. me-
dica.

Qualitates.

Succos terrij
est ordinis re-
siccantium re-
frigerantium
que, & Vin-
centem habet
qualitatem
acidam &
siccam. Cor-
tex Verò desic-
cat: non parū

Citria
præsupra
venenis
maximè
aduersan-
tur.

tamen habet acrimonia: Et desiccet secundo
excessu. Non tamen frigidus est, sed tempera-
tus, aut paulò infra. Caro crassi succi est, &
pituitosa frigidaque. Nucleus amarus est, &
discutit: hoc est, calefacit & exiccat secundo
recessu.

8 3 Mala

Mala Limonia: Italis, Lomie, siue Limoni: Gallis, Limons.



Locus ex Matthiolo.

Seruntur tanquam exotica: sed conuallibus delectantur.

Qualitates.

Non longe distant à natura & viribus Citriorum. Tamen cum sint acidiora, succi frigidioris, & siccioris existimantur.

Auran

Aurantia Mala: Italis, Arancio: Germanis, Pomercantz: Gallis, Pommes d'orenges.



Locus ex Matthiolo.

Collibus, & maritimis gaudet.

Qualitates ex eodem.

Iisdem pollet viribus, quibus Malus Medica: cortice tamen calidiora censenda sunt: quandoquidem is reliquis, acrior, atque amarior gustu deprehenditur.

§ 4

Pyra

Pyra: Græcis ἀπρία: Arabibus, Humechte,
Cirmetre, siue Kemetry: Italis, Pere: Germa-
nis, Byren: Hispanis, Peras: Gallis, Arbor,
Poyrier: Fructus, Poyres.



Locus.

PH. li. 16.
cap. 18.

Pyra & montes amat, & planiciem.

Qualitates.

Gale. li. 5.
simpl. me-
dica.

Pyra vim habent exiccandi, sylvestria tamen
magis adstringunt.

Mesp

Mespilum: Græcis, μέσπιλον: Arabibus, Zar-
ror, Zarur, & Alzarur: Italis, Nespolo, Ger-
manis, Nespel: Hispanis, Nesperas: siue A-
zarolo, Gallis: Arbor, Nesplier: Fructus,
Neffle, siue Merle.

Locus ex Matthiolo.



*Aquosis
montibus, &
frigidis locis
gaudet, Seri-
tur autem in
hortis in agro
Neapolitano.*

Qualitates.

*Vim eandem
habent quàm
sorba sed ma-
gis adstrin-
gunt.*

Gal. hb. 2.
de alim.
facul.

g 5

Mespi

Mespilus altera, siue Mespilus communis.



Locus ex Matthiolo.

Agnosci; Montibus, & frigidis locis gaudet.

Qualitates.


Vide qua de Mespilo primi generis dicta sunt.

Lotus,

Lotus, siue Celtis: Græcis, λότης & δένδρον:
Arabibus, Sedar, siue Alfadar: Italis, Bago-
laro, siue Perlaro: Hispanis, Almez: Gallis,
Alysier, & in Gallia Narbonensi, Micacou-
lier.

Locus.

Montes & Plin. libr.
Valles amat. 16. ca. 30.
imò expetitur
domibus ra-
morum petu-
lantia.



Qualitates.

Lotus ar- Gal. lib. 7.
bor non ita simpl. me-
multa adstri- dica.
ctoria quali-
tatis est par-
ticeps, sed &
tenuum par-
tium est, &
mediocriter
exiccatoria.

Cornus:

Cornus: Græcis, *κρῆνις*: Italis, Arbor,
Corniolo: Fructus, Cornole: Germanis,
Arbor, Cornelbaum, Kurbeerbaum, siue
Dierlem: Fructus verò, Vuelsch Kirschen:
Hispanis, Cornizolos: Gallis, Arbor, Cor-
nier, Cornoillier, siue Cornillier, Fru-
ctus, Cornoille.

Locus.

Plin. libr.
16. ca. 18.

Montes a-
mant Plinio:
seruntur ta-
men & in hor-
tis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
simpl. me-
dica.

Fructus, fo-
lia, & ger-
mina acerba
sunt, Valen-
tèrque desic-
cant: maxi-
mè autem fo-
lia, & ger-
mina.

Sorba



Sorba, Græcis, *ῥα* : Italis, Sorbe : Germanis, Speierling. Sporoëpfel, siue, Spierbieren : Hispanis, Sorbas : Gallis, Arbor, Cormier, siue Sorbier : Fructus, Sorbes, & Cormes.



Locus.

Gaudet frigidis.

Qualitates.

*Eandem adstringendi naturam præstant
quam Mespila : sed imbecilliore effectû.*

Prunus

Plin. libr.

16. ca. 18.

Gal. li. 8.

simpl. me

dica.

Prunus Arbor: Fructus, Pruna, Græcis,
 ποκνυμλέα : Arabibus, Anas, Auas, siue
 Agias: Italis, Pruno, Succino, siue Susino:
 Germanis, Praumen, Pflaumen, siue Krie-
 chen: Hispanis, Prunas, Andrinās, siue
 Amexeas: Gallis, Arbor, Prunier: Fructus,
 Prunes.

Plin. libr.
 16. ca. 18.

Gale. li. 7.
 simp. me.



Locus.

Vbique se-
 rantur, &
 restibili fer-
 tilitate cre-
 scunt: in mon-
 tibus tamen
 non temerè
 videntur.

Qualitates
 ex Galeno.

Pruna Ven-
 trem subdu-
 cunt: recen-
 tia quidem
 plus, arida
 Verò minus.

Ex Fuchfio.

Domestica Pruna moderatè sunt frigida, &
 humida: sylvestria Verò valenter adstringūt.
 Zizy

Zizypha, siue Serica: Græcis, *Ἰσχυρα* *ἡγεῖ*
Ἰσχυρα: Arabibus, Hunen, Zufalzef, siue
 Hanab: Officinis, Iuiubæ: Italis, Giuggio-
 le: Germanis, Rottburst beerle: Hispanis,
 Azufecifa: Gallis Iuiubes.

Locus

*Exotica sunt: Pli. li. 17.
 seruntur tamen Plinio
 mense Aprili,
 grano.*



Qualitates,
 ex Matthio-
 lo.

*Suo lentore
 sanguinem cras-
 sum reddunt:
 refrigerant ta-
 men, & mor-
 bis acutis pro-
 sunt.*

Ex Galeno.

*Exiguum præbent alimentum: difficile con-
 coquantur & stomacho inutilia sunt.*

Arbutus

Arbutus siue Vnedo: Fructus, Memæcy-
lus: Græcis, *νόμαρος*: Arabibus, Hatiladib:
Italis, Albatro siue Arbuto: Hispanis, Ma-
dronho, siue Madromeiro: Gallis, Ar-
bor, Arbousier: Fructus, Arbouces.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus & Vallibus nemorosis.

Qualitates.

Gal. li. 7. *Arbutus arbor ipsa qualitate acerba & nã*
simp. me. *cum fructu est. Fructus autem insensus est sto-*
macho, & capiti dolorem infert.

Amygda

Amygdalæ, Latinis, & Græcis: Arabi-
bus verò, Iauz, Kauz, siue Lauzi: Italis,
Mandorle: Germanis, Mandel: ern: Hispa-
nis, Almendras: Gallis, Arbor, Amandier:
Fructus verò Amandes.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur in
hortis & vi-
netis: plantis
& collibus
gaudens.

Qualitates.

Amygdala Gal. lib. 2.
nihil prorsus de ali. fa-
adstrictoria cul. & li.
facultatis ser 6. simpli.
tita sunt: so- medica.

la enim exte-
nuandi atque
abstergendi vi
pollent. Item

Amygdala

amara omnino extenuandi vim possident. A-
mygdala dulcia leuicula am amaritudinem
possident, quæ tamen dulcedine superante oc-
cultatur: itaque sunt moderatè calida.

h

Pistacia



Pistacia, siue Pistacea: Græcis, *πισταχία*
 Arabibus, Pistech siue Festuch: Officinis
 & Barbaris, Fistici: Italis, Pistacchi: Germa-
 nis, Vuelsch Bimpernuszlin: Hispanis, Al-
 locigo: Gallis, Pistaches.

Locus, ex Matthiolo.

Germana
 est Syria: se-
 ritur tamen
 in hortis Ma-
 gnatum, in
 Italia.

Qualitates.

Parum præ-
 bent alimen-
 ti: tametsi in-
 farctas humo-
 re iocinoris
 vias expe-
 diant, & à
 vitis libe-
 rent.

Ex Auicenna.

Auicenna. *Nauseam discutiant, & Ventriculi os cor-
 roborant.*

Staphy



Gal. lib. 2.
 de ali. fa.

Auicenna.
 lib. 2.

Staphylodendron, siue Pistacia agrestia:
Gallis, Pistaches sauuages.



Locus,

Arbor est Cisalpina.

Plin. Libr.
16. ca. 18.

Qualitates ex Matthiolo.

Nauseam commouet fructus.


h 2

Nux

Nux Juglans : Græcis , *κάρνα βασίλικα* : Arabibus,, Ieuz, Leuz, siue Giauzi: Italis, Noci: Germanis, Nusz, siue Vuelschnusz: Hispanis, Nuezes: Gallis, Arbor, Noyer: Fructus, Noix.

Plin. libr.
16. ca. 18.

Gal. li. 7.
simpl. me
dic. & li.
2. de ali.
facul.



Locus.

Seritur vbi-
que, maximè
in cultis: nec
temerè visi-
tur in monti-
bus.

Qualitates.

Arbor, fo-
lia, & Ger-
mina adstri-
ctionem quan-
dam possidēt:
ceterum eui-
dentem mul-
tāque in nu-
cis putamine
recenti, &

sicco. Viridis, atque etiamnum humida, ne-
que adstringentis qualitatē neque oleosa con-
spiciē est particeps: sed est quodammodo qua-
litatis exper:.

Nux

Nux myristica: Arabibus, Ieuz baue,
 usbague, siue Giauziban: Italis, Noci Mo-
 cate: Germanis, Muscat nusz: Hispanis,
 Nuez de especie: Gallis, Noix muscates.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in insula Radan, qua est in India.

Qualitates secundum Arabas.

*Siccant & excalfaciunt ordine secundo
 completo. Adstringunt, & absterunt.*

h 3

Nuces

Nuces Auellanae, Noces Ponticae, Noces
Prænestinae: Græcis, κάρνα πόντινα, καὶ λεπτο-
κάρνα: Italis, Nocciuole, Auellane, & Nocel-
le: Cermanis, Haselnusz: Hispanis, Auella-
nas: Gallis, Noyfilles, Noysettes, Auellai-
nes, Petites, & Melline.

Locus ex Fuchſio

Pingui gan-
dent ſolo, &
montibus ne-
morosis.

Qualitates.

Auellana
plus habent
eſſentia terre-
ſtris ac frigi-
de, quàm lu-
glâdes. Quin
& plus præ-
bent alimen-
ti: ſiquidem
denſiores ſunt
et minus pin-
gues.

Ex Simeone Sethi.

Calida ſunt & humida.

Morus

Gal. li. 7.
ſim. me.
& li. 2. de
ali. facul.



Morus Arbor: Morum Fructus: Græcis,
 Arbor, *μορέα*, & *συνάμυρος*: Fructus, *συνάμυρος*:
 Arabibus tam Arbor, quàm fructus, Tut-
 iue, Thut: Italis, Moro: Germanis, Arbor,
 Maulberbaum: Fructus, Maulber: Hispanis,
 Moras del Moral: Gallis, Arbor, Meurier:
 Fructus, Meures.

Locus.

Montes non Plin. lib.
 adeò amant 16. ca. 18.


Plinio: Fuch-
 sio Verò, cali-
 dis & sabulo-
 sis gaudet lo-
 cis. Quin &
 feritur in hor-
 tis: negligi
 enim non se
 permittit.

Qualitates.

Mora matu-
 ra ventrē sub-
 ducit: imma- Gal. li. 8.
 tura, & ubi a- tim. me.
 ruerint, ad & li. 2. de
 modū restrin ali. fac.

gūt. Maturorū succus adstringit mediocriter.
 Immatura Mora & tota Arbor mistā quali-
 tatē habet ex restringēte & purgante compo-
 sitā. In radicis cortice purgatoria cum quadā
 amaritudine exuperat qualitas.

h 4



Sycomorus, siue Ficus Aegyptia: Græcis,
συκόμορος: Arabibus, Mumeiz, Iumeiz, Aliu-
 meiz, seu, Guimeizi.



Locus.

*Aegypto germana est: Et nascitur in Caria,
 Rhodo, locisq; non multum tritici feracibus.*

Dios. li. i.
 cap. 144.


Qualitates.

Emolliendi, digerendi, Et spissandi vim habet.

Ficus.

Ficus, Arbor: Fici, Fructus: Græcis, *σῦκα*: Arabibus, Sin, Fin, seu Tin: Italis, Fichi: Germanis, Feighen: Hispanis, Higos: Gallis, Arbor, Figuier: Fructus, Figues.

Locus ex Fuchfio.



Locis calidis & insolaris delectatur: seritur itē in hortis & Vinetis.

Qualitates.

Gal. li. 2. de ali. fa.

Fici cōmeabiles sunt, & facile in totū corpus penetrant: nā abstergerendi & pollutent haud obscura. Flatuosi tamen sunt aliqua-

Gal. li. 8. sim. mc.

tenus. Itē, Ficus arida habent vim exalfacendi ordine primo etiam completo, aut secundo incipiente. Habent vero etiam partium tenuitatem quandam. Pinguiore magis concoquunt: gustu acrioribus magis extergunt ac discutiunt. Arbor tenuium est partium. Lac, & foliorum succus valenter calidus est.

h 5 Persea

Persea, Latinis, & Græcis.



Theo. li.
4. de na.
plant.
Gal. li. 1.
de cōp.
med. sec.
loc.
Dio. li. 1.
cap. 146.

Locus.

Arbor est Aegypti.

Qualitates.

Folia vim adstringentiam habent.

Iberis

Iberis, siue, Lepidium: Græcis, ἰβέρης, λεπιδίον, ἰβέρης, λεπιδίον: Arabibus, Seitaragi, Asceitaragi, Sitharegi, siue, Hausab: Italis, Iberide, siue Lepidio: Germanis, Vvil der Kresz: Hispanis, Nasturtio Montefino: Gallis, Chasserage, Passerage sauuage, siue Nasitort sauuage.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in Dio. li. 1.
incultis, iuxta cap. ult.
prata, &
vias.

Qualitates.
ex Fuchfio.

Iberis eius
est tempera-
tura cuius Na-
sturtium: mi-
nus tamē de-
siccatur.

Trit

Triticum: Græcis, *τρυγῶν*: Arabibus, Henta, Henca, siue Hantha: Italis, Grano: Germanis, Korn, siue, Vveyffen: Hispanis, Trigo: Gallis, Fourment.

Locus ex Matthiolo.

Seritur Vbi-
que ferè.

Qualitates.

Triticū, & Medicamen-
tum foris im-
positum, pri-
mi est ordinis
excalfacien-
tium: non ta-
men resicca-
re, nec refrige-
rare manife-
stò potest. Ha-
bet Verò etiā
quiddam vis-
cosum & ob-
struens. Item:

in cibum assumptum agrè concoquitur, flatus
excitat, laborem Ventriculo infert, & caput
Vaporibus tentat.

Hordeum

Gal. li. 8.
sim. me.

Idē li. 1.
de ali. fa.



Hordeum: Græcis, *κριθή*: Arabibus, Xa-
haen, siue Shair: Italis, Orzo: Germanis,
Gersten: Hispanis, Cenada: Gallis, Orge.



Locus ex Matthiolo.

Seritur & bique ferè.

Qualitates.

Primi est ordinis in exsiccando, & refrige- Gal. lib. 7.
rando: habet etiam pauxillum absterstonis. sim. me. 3
Pau'ò plus desiccat quàm farina fabacea: ca-
tera similia, foris & tentibus.

Zea:

Zæa: Græcis, zea: Arabibus, Hais: Italis,
 Zea, Spelta, siue Pirra: Germanis, Speltz. S.
 Peters Korn, Kin, Korn, siue, Dinckelkorn:
 Hispanis, Spelta: Gallis, Espeautre.



Locus ex Matthiolo.

Familiaris est Germania, & Italia.

Qualitates.

Gal. li. 6. Zea vniuersa sua facu'tate quodammodo
 sim. me. in medio est tritici, & hordei. Itaque ex illis
 cognoscatur.

Auena:

Auena, Græcis, Βῆλος: Arabibus, Cartamum, siue Churtal: Italis, Vena, siue, Biaua: Germanis, Habern: Hispanis, Auena, siue Auca: Gallis, Auoyne.



Locus ex
Matthiolo.

Seritur ubi-
que ferè, in is-
mentorii pa-
bulum.

Qualitates. Gale. li. 6.

Auena, & sim. mæ.
medicamen-
tum, similem
hordeo vim
obtinet: nam
illitum, desic-
cat, & dige-
rit mediocri-
ter, & sine
morsu. Tem-
perie autem

habet paulò frigidiorē. Nonnihil etiam ad-
strictionis habet. In cibum sumpta, moderatè
calfacit. In alijs, desiccatorium est medica-
mentum.

Oryza,

Oryza, Latinis, & Græcis: Arabibus autē,
 Arz, seu Arzi: Italis, Riso: Germanis, Reisz:
 Hispanis, Atroz: Gallis, Ris.



Locus.

Dio. li. 2.
 cap. 38.

Nascitur in palustribus, riguisq̃.

Gal. li. 8.
 sim. me.

Qualitates.

Habet adstrictorium quidpiam.

Milium

Milium: Græcis, κέϕχος: Arabibus, Ieuers, Geguers, siue Giaures, Italis, Miglio: Germanis, Hirsz: Hispanis, Millo, & Miyo: Gallicis, Mil, siue Millet.

Locus ex Fuchſio.



Serendum.
Agricola censent, primò in locis frigidis & humidis: deinde in calidis. Palustribus, & pingui solo delectatur.

Qualitates.

Primo ordine refrigerat: exiccatur. Verò tertio exsoluto, aut

Gal. li. 7.
simp. medica.

certe secundo intenso. Paululum etiam habet tenuitatis. Estum minimũ confert nutrimenti: sed & Ventrem desiccatur. Appositum, citra morsum desiccatur.

i

Pani

Panicum: Græcis, ἔλνυμος: Arabibus, Dochon: Italis, Panico: Germanis, Pfenich: Heydel pfenich pray, siue Fuchschvantz: Hispanis, Panizo, siue Paniso: Gallis, Paniz.


Locus ex Fuchfio.

Puluerulento, & subtilissimè subactò solo delectatur: sed nec sabbulifera effruit.

Qualitates.

Panci est nutrimenti, & exiccatorium. Adstringit item & Milium. Illitum, exiccat atque refrigerat.

Sesa



Gal. li. 6.
simpl. me
dica. 12

Sesamū siue Pseudolinū: Græcis, Σησαμύνη: Arabibus, Semsem, siue Sensera: Italis, Sese-
mo: Germanis, Leindotter: Hispanis, Iorgi-
lim, siue Alegria: Gallis, Iugioline.

Locus ex Matthiolo.




Seritur: Se-
rūm, nihila-
quē emacrat
Solum. Indis
familiarissi-
mum est.

Qualitates.

Sesamum Gal. li. 8.
non parum simpl. me-
dica.
continet in se
viscosum, &
pingue: quare
emplasticum,
est & emol-
liens, ac modi-
cè calidum.

i 2 Sesa

HISTORIA
Sesamum aliorum.



Locus, Qualitates.

*Huc refer omnia quae de priore Sesamo dis-
ta sunt.*

Lolium

Lolium: Græcis, αἶλα: Arabibus, Sceilem,
siue Zeuen: Italis, Loglio, siue Gioglio: Ger
manis, Tvvalch trespe, Rue vveyssen, siue
Lulch: Hispanis, Yoio: Gallis, Yuraye.

Locus.

Nascitur in Diof. li. 2.
ter segetes. cap. 93.

Qualitates.

Desiccat, & Gale. li. 6.
excalfacit ef- simpl. me
ficaciter: & dica.
propinquum
sit acribus,
magis quàm
Iris: sed non
est perinde, &
illa, subtilis
essentia: ve-
rum in hoc
multum defi-
cit. Est ergo

tertij ordinis excalfacientium: secundi verò
extremò exiccantium.

i 3

Fœnum



Fœnum græcum: Græcis, τῆλιν, κέρας, αἰγόνερο, καὶ βόνης: Arabibus, Olba, Helbe, seu Hebbe: Italis, Fiē græco: Germanis, Fenigrec, siue Bockshorn: Hispanis, Alfor-
nas, siue Alloluas: Gallis, Fenigrec, siue Senegre.



Locus ex Fuchfio.

Seritur semine vbiq̃ue.

Qualitates.

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Excalfacit secundo ordine: desiccatur
prime.

Linum

Linum, Latinis & Græcis: Arabibus verò,
Bazarichichē, siue Bezerchetan: Italis, Lino:
Germanis, Lein, siue Flachs: Hispanis, Lino:
Gallis, Lin.

Locus ex Fuchſio.



Pingue So-
lum amat, et
aliquatenus
humidum: Ve-
rum idema-
crat.

Qualitates.

Lini semen, Gal. li. 7.
esum, flatuo- simpl. me-
sum est, etiā dica.
si frigatur, a-
deo sane ex-
crementitia
humiditate
plenum est.

Est verò etiā
in primo ordine, quodammodo calidum: at hu-
miditatis & siccitatis quodammodo in me-
dio situm.

i 4

Cicer

Cicer: Græcis, ἐγέβυθος: Arabibus, Chemps,
Hamos, seu Alhamos: Italis, Ceci: Germa-
nis, Kichern, Kichererbs, siue Ziser erbs: Hi-
spanis, Grauanços, Gallis, Cices, siue, Chi-
ches.

Locus ex Fuchfio.

Pingue So-
lum, & ni-
grum amat.

Qualitates.

Non minus
inflationes ex-
citāt, quā
faba: Valen-
tius tamē nu-
trit, Venerem
stimulat, et se-
men generat.
Abstergit etiā
magis quā
faba.

Ex Aetio:

Quod Oro-
bium voca-

tur, attrahit, discutit, incidit, & abstergit.

Sylvestre, Plinio, Ventrem subducit, sed fla-
tus gignit.

Ex Fuchfio.

Calidum & siccum est in primo ordine.

Faba:

Gale. li. 1.
de alimē.
facul.



Faba: Græcis, *κίβανος*: Arabibus, Hachille,
Haballe, siue Bachale: Italis, Faua: Germa-
nis, Bonen: Gallis, Feue.

Locus ex Fuc hño.



*Fimum, pin-
gue Solum, &
optime suba-
ctum amat.*

Qualitates.

*In exican- Gal. li. 7.
do & refrige- simp. me
rando, secun- dica.
dum & trun-
que, ad me-
dium tempe-
rumentum
propinquis-
me accedit. Ca-
ro paulū quid
abstergentis*

*facultatis continet, sicut cortex non nihil ad-
stringentis. Vt edulium, flatulenta est, ac co-
ctu difficilis, siquid aliud. Imposita, sine mole-
stia desiccatur.*

i 5

Fiba

* Radix
eius est.

Faba Aegyptia, siue* Colocasia: Græcis:
νύκτος αἰγυψίος: Italis, Fava d'Egitto: Hispani,
Inhame: Gallis, Feue d'Egipte.



Locus.

Theoph.
de natu.
plā. li. 4.
cap. 10.
Gale. li. 1.
de alim.
facul.

Exit in paludibus, stagnisque, in Aegypto.
Qualitates.

*Faba Aegyptia, sicuti nostratē magni-
tudine longè præcellit: ita & naturam humi-
diorem, magisque excrementitiā sortita est.*
Lens

Lens: Græcis, φαῖς: Arabibus, Hades: Italia,
 lis, Leticchia: Germanis, Linsen: Hispanis,
 Lenteyas: Gallis, Lentille.

Locus ex Fuchfio.



Seritur ubi-
 que ferè.

Qualitates.

Valenter ad Gale. li. 8.
 stringit: in ca simp. me
 liditate Verò dica.
 Et frigidita-
 te medium te-
 net: desiccatur
 tamen in se-
 cundo ordine.
 Ipsum itaque
 eius corpus de-
 siccatur Et si-
 stit Ventrem:
 ceterum, deco-

Etum prouocat. Proinde prior aqua abijci-
 tur, ubi retentione opus est.

Phasio

Phasioli, Latinis & Græcis: Italis verò,
Fagiuoli: Gallis, Fasioles.



Locus ex Matthiolo.

Seruntur semine in hortis & aruis.

Qualitates ex Simeone Sethi.

Calidi sunt & humidi in primo ordine.

Ex Galeno.

Humectant natura.

Gale. li. i.
de ali. fa.

Eruum

Eruum, siue Herba Iudaica Auicennæ:
Græcis, ὀροβός: Arabibus, Herbum, Keise-
ne, siue Kersene: Officinis, Orobus: Italis,
Eruo, siue Mocho: Germanis, Eruen: Hi-
spanis, Yeruos: Gallis, Ers, siue, vessie noire.

Locus ex Matthiolo, & Fuchio.



Seritur, &
sponte nasci-
tur. Tenue &
siccum solum
amat.

Qualitates.

Deficcat ex. Gale. li. 8.
cessu secundo simp. mc.
intenso: calfa-
cit Verò pri-
mo. Quatenus
autem ama-
ritudinis est
particeps, ea-
tenus incidit,
extergit, at-
que obstructio

nes expedit. In cibis damnatur. Si sumitur co-
piose, sanguinem per Urinas euocat.

Lupi

Lupinus sativus : Græcis , *δέφυλον* & *κίρπος* :
Arabibus, *Tarinus*, *Arinus*, seu *Tormus*: Ita-
lis, *Lupino domestico* : Germanis, *Vuick-*
bonen, *Feigbonen*, siue *Vuolffasch bonē*:
Hispanis, *Entramuces*, siue *Entramocos*:
Gallis, *Lupins*.



Gale. li. i.
de ali. fa.
& libr. 6.
simp. me.

Locus ex
Fuchfio.

Tenne solum
amat. Gaudet
item rubro, &
sabuloso solo,
nec coli vult.

Ex Matthio-
lo.

Sylvestris na-
scitur in cam-
pestribus.

Qualitates.

Lupinus dura
ac terrestris
substantia est.

Lupinus ma-
ceratus ex ge-

nere est emplasticorum. Qui vero nativam a-
maritudinem retinet, extergendi, digerendi-
que vim obtinet. Agrestis amarior, & ad om-
nia valentior domestico.

Ex Matthiolo. Notoriè calidus est & siccus.
Rapum:

Rapum, siue Rapa: Græcis, γογγύλη: Arabibus, Seliem, Selgem, Selgiem, siue Alsegiem: Italis, Rapo: Germanis, Rueben: Hispanis, Nabo: Gallis, Raue, seu Naueau blanc des Iardins.

Locus ex Fuchfio.



*Vlginosum
& tenue a-
mat Solum.*

Qualitates.

*Rapi semen Gal. li. 6.
Venerem ex- simp. me.
citat: flatuo- & li. 2. de
sum enim est. alim. fac.
Radix diffi-
cile concoqui-
tur, inflat-
que, & se-
men generat.*

Ex Fuchfio.

*Calidum est
in secundo recessu: & humidum in primo.
Napus*

Napus: Græcis, βαρυάς: Italis, Napo: Gërmanis, Steckrueben: Hispanis, Nabicas: Gallis, Nauet.



Locus ex Fuchfio.

Frigidis locis gaudet.

Qualitates ex Fuchfio.

Napus eandem temperaturam obtinet quam Rapum. Excalfacit igitur in secundo ordine, & humectat in primo.

Raphanus

Raphanus, siue Radix: Græcis, *ραφανίς*:
Arabibus, Fugel, siue Fegiel: Italis, Rapa-
no, & Radice: Germanis, Rettich: Hispa-
nis, Rauano, & Rauanillo: Gallis, Reffort.

Locus.

Seritur sc. Pallad. li.
mine. Pingue 9. cap. 5.
solum amat,
& bene suba-
etum.

Qualitates.

Excalfacit Gale. li. 8.
simp. mc.
excessu tertio,
desiccatur vero
secundo. Quin
& semen ipsi
planta effica-
cius est. Fa-
cultas ei inest
digerendi.
Item, vim ex-
tenuatoriam

gerit: cum qua conspicue calfacit: acris enim
in ea qualitas exuperat.

k

Rapha



Raphanus agrestis: Italis, Rafano saluatico: Romanis, Ramoracia: Germanis, Vuald Rettich: Gallis, Rafan, siue Reffort sauage.



Locus ex Fuchfio.

*Sabulosis gaudet, & Pratis: & nascitur
secus vias.*

Qualitates.

Gale. li. 8.
simpl. me
dica.

*Raphanus agrestis Valentius desiccatur &
excalfacit, domestico.*

Sifer

Sifer: Græcis, *σίσαρον*: Arabibus, Culcas,
Fifarum, siue Seifarum: Italis, Sifaro: Ger-
manis, Gierlin, siue Girgeline: Hispanis,
Chiriuias: Gallis, Cheruy, siue Giroles,
aut Carottes blanches.

Locus ex Fuchfio.

Frigidos tra-
ctus amat: &
seritur in hor-
tis.

Qualitates.

Secundo or-
dine excalfa-
cit: & habet
adiectam ama-
ritudinē quan-
dam cum leni-
cula adstri-
ctione.

Gale. li. 8.
simp. me.

Ex Aegineta.

Excalfacit ter-
tio ordine.

Ex Fuchfio.

Satium desiccatur primo excessu: & Vene-
rem stimulat.

k 2

Sifer



Sifer alterum : Gallis, Cherüys
communis.



Locus & Qualitates.

Huc refer qua dicta sunt de Sifaro.

Lapa

Lapathum, siue Rumex: Græcis, λάπα-
 θον, ἢ ὀξύλάπαθον: Officinis, Lapathum acu-
 tum: Arabibus, Humadh, Hunadh, siue
 Hamad: Italis, Rombice, siue Lapatio: Ger-
 manis, Ampffer: Hispanis, Labara: Gallis,
 Lapais, Lampe, Parelle, siue Patience.

Locus.

Nascitur in
 palustribus. Dio. li. 2.
 cap. 108.

Qualitates.

Lapathum Gale. li. 7.
 moderatè di- simpl. me
 gerentem for- dica.
 titum est fa-
 cultatem: at
 Oxylapathū,
 mistam. Nam
 simul cum eo
 quod digerit,
 nonnihil quo-
 que repercu-
 tit. Semen co-
 rum manife-


stam quandam adstrictionem obtinet.

k 3

Hip



Hippolapathum, siue Reubarbarum Monachorum : Græcis, ἵππολόπαθον : Germanis, Munch Rabarbaren : Gallis, Reubarbe de Marais.



Locus.

Nascitur in Paludibus.

Qualitates.

Diosc. li. 2.

cap. 108.

Gale. li. 7.

simp. me.

Easdem qualitates & facultates obtinet, quas Rumex : sed imbecilliores.

Oxa

Oxalis, Latinis, & Græcis: Italis verò,
Agretta: Germanis, Sauer Ampffer: Hispa-
nis, Azederilla: Gallis, Ozeille, Vinette, siue
Saliette.

Locus ex Fuchfio.

*Nascitur te-
merè in Pra-
tis: & feritur
in hortis.*

Qualitates.
ex Fuchfio.

*Recentiori-
bus Oxalis de
siccatur et refri-
gerat in se-
cundo ordine.*

Ex Galeno.

*Huc refer
que dicta sũt
de Lapathis.*



k 4

Oxalis

Oxalis altera: Gallis, Autre espece d'O-
zeille.



Locus, & Qualitates.

Accommoda hic omnem Oxalidis historiam.
Lamp

Lampsana, siue Brassica sylvestris: Græcis, Πλι. li. 20.
 λαμπσάνη: Gallis Sanues blanches. cap. 9.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Campestribus, & Nonalibus.

Qualitates.

Lampsana es a succos prauos procreat. Ca-
 terum illita abstergerendi nonnullam, digeren-
 dique facultatem possidet.

Gal. li. 7.
 sim. me.

k s Blitum:

Blitum: Græcis, βλῦτον: Arabibus, Bacha
la iamenia, siue, Bachalæ alie manie: Italis,
Blito: Germanis, Mayer: Hispanis, Bredos:
Gallis, Blette, siue Poyrée rouge.



Locus ex Matthiolo, & Fuchfio.

*Nascitur in hortis & campis, & restibili
fertilitate perennat in multos annos.*

Gal. li. 6.
sim. me.

Qualitates.

*Blitum humida frigidaq; temperatura est,
in secundo maxime excessu à temperatis.*

Malua:

Malua: Græcis, μαλάχη: Arabibus, Chubeze, siue Chabazi: Italis, Malua: Germanis, Pappel: Hispanis, Maluas: Gallis, Malue.

Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis. Verum sponte nascitur in incultis: & maxime in pingui & humido solo.

Qualitates. Gal. li. 7. sim. me.

Malua agrestis, digredientis paululum, & emollientis leuiter est facultatis. Hortensis vero quāto plus habet aqueæ

humiditatis, tantò facultate imbecillior est. Fructus eius tantò validior est, quāto & siccior. Item, A refrigerandi facultate maxime abest, & facile comseat, Syluestres satius sicciores sunt.

Malua

Malua Arborea: Gallis, Malues des Iardins.



Locus.

Seritur in hortis: & cultura adulteratur.

Qualitates.

Huc refer qua de Malua dicta sunt.

Atrip

Theo. de
nat. plan.
li. 1. ca. 5.

Atriplex: Græcis, ἀτράφαξις, ἢ χρυσοδάχα-
 ρον: Arabibus, Cataf, seu, Caraf: Italis, Atri-
 plice: Germanis, Molten, siue, Milten: Hispa-
 nis, Armoles: Gallis, Choux Armoux, Ar-
 roches, Bonnes Dames, Folles, siue Femēs.

Locus ex Fuchfio.



Seritur: &
 nascitur in
 cultis.

Qualitates.

Atriplex
 constat humi Gal. li. 5.
 da et frigida sim. nic.
 temperie: hu-
 mida quidē
 secundi ordi-
 nis à medijs:
 frigida Verò
 primi: quam
 Etique tepi-
 dam, esse ca-
 liditatem po-
 suimus, cuius
 modi Rosis

inest. Non tamen adstringit: sed aquea est,
 & minimum terrena. Ventrem celeriter per-
 meat: & paululum digerit. Hortensis fri-
 gidor & humidior agresit.

Atrip

Atriplex Sylvestris: Gallis, Arroches
sauuages.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur sponte in cultis, & campestribus.

Qualitates.

Huc refer quæ de satina Atriplice dicta sunt.
Spinacia,

Spinacia, siue Oulus Hispanicum: Græcis,
 σπινάχια: Arabibus, Hispanach: Italis, Spi-
 nacci: Germanis, Spinat: Gallis, Espinoches,
 siue, Espinars.




Locus ex Fuchſio.

Seritur ſbique.

Qualitates.

Frigida ſunt & humida in primo ordine.
 Atriplex

Atriplex marina: Gallis, Arroches marines.



Locus ex Matthiolo.


Littoribus, & maritimis gaudet.

Qualitates

Accedit propè ad Halimi facultates.

Kali

Kali.



Locus ex Matthiolo.

Salinas, & littora peramat.

Qualitates ex Matthiolo.

*Sapor Vniuersa planta salis: inde
qualitates conycito.*

1

Brassica

Brassica crispa: Græcis, κράμβη: Italis, Ca-
uoli, siue Verze: Germanis, Koël: Gallis,
Choux vers: Hispanis, Colles, & Couues.

Locus ex Fuchfio.

Seruntur
Ubique semi-
ne, et radice.

Qualitates.

Sativa Bras-
sica desiccan-
di vim habet,
tum esca, tum
foris imposi-
ta, nō tamen
etiam admo-
dum acrem.
Vim etiam
spissandi ha-
bet: & abster-
sorium quid-

am continet. Semen amarae qualitatē par-
ticeps est: estque aliquatenus abstersorium. Ci-
vis Caulium valde desiccatur: ut sit causticus.

Brassi

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.



Brassica capitata: Italis, Cauolo cappuc-
cio: Germanis, Capshaut: Gallis, Choux
Cabuz.




Locus, & Qualitates.

Huc refer qua de Brassica dicta sunt.

1 2

Brassi

Brassica Marina: Græcis, *πράμνη θαλασσία*:
 Officinis, Soldanella: Italis, Cauolo mari-
 no: Gallis, Chou de Mer.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Maritimis.

Qualitates ex eodem.

*Folia gustu, amara, sa'sa, & quadamte-
 nus acria. Hinc facultates & temperaturam
 conijcito.*

Beta

Beta nigra: Græcis *ῥηλον*: Arabibus, Dec-
ka, & Celb: Italis, Bietola: Germanis, Man-
golt, & Pieslèn: Hispanis, Aselgas: Gallis,
Loutte, Reparée, siue Porrée.

Locus ex Matthiolo.

Seritur in
hortis.

Qualitates

Beta Nitro Gale. li. 8.
se facultatis simpl. me
particeps est, dica.

qua tum dige-
rit, tum exter-
git, & per
nares pur-
gat. Cocta ni-
trositatem o-
mnem exuit,
fitque faculta-
tis leuiter di-
gerentis. Por-

ro, ad detergendum digerendumque, Validior
est, Beta alba: nam nigra adiunctum habet
adstrictionis quidpiam, & magis in radice
quàm alijs partibus. Succus absterforius est.
Exigui est alimenti.

Gal. li. 2.
de ali. fa-
cul.

1 3

Beta



Beta candida: Gallis, Blanche Porrée.




Locus & Qualitates.

Huc refer qua de Beta nigra dicta sunt.

Portula

Portulaca: Græcis *ἀνὰ ἀράχυν*: Arabibus, Ba-
kleancha, seu Bachele alhanicha: Italis, Por-
tulaca, Procacchia siue Porcellana: Germa-
nis, Burtzel: raut: Hispanis, Verdolagas, &
Baldrægas: Gallis, Porcelaine, Pourpier, si-
ue Pourchaille. Locus ex Matthiolo.



Seritur na-
sciturque spo-
te in locis pe-
trosis, & in
cultis.

Qualitates.

Portulaca Gale. li. 6.
frigida, & a- simpl. me-
que a tempe- dica.
ramento est,
paucæ cuius-
dā particeps
austeritatis.

Refrigerat
quidem exces-
su tertio à
temperatis ac
medijs: hume-

Etat Verò secundo, viscosum etiam quiddam
obtinet. Succus refrigerat, eiusdèmq; tempe-
raturæ est cuius herba. Succus magis adstrin-
git quam herba: quæ succum gignit modicum,
cūmq; humidum frigidum, & glutinosum.

1 4

Aspa

Asparagus: Græcis, ἀσπάργος: Arabibus, Halion, siue Helium: Italis, Asparago: Germanis, Spargen: Hispanis, Esparagos: Gallis, Esparge.

Locus ex Fuchfio, & Matthiolo.



Gale. li. 2.
de alimē.
facul.

Gale. li. 6.
simpl. me
dica.

Renes & Iecur infarctū liberat. Vrinam cit,
& parum præbet nutrimenti. Cocti tamen
magis alunt.

Seritur in
hortis: gaudet
que Arundi-
netis, & locis
petrosis. Est &
alius Aspara-
gus palustris.

Qualitates.

Asparagus
Petraeus: abster-
gendi vim ha-
bet: id, ne ci-
tra manife-
stam aut cali-
ditatem, aut
frigiditatem.

Plan

Plantago maior: Græcis, ἀρνόγλωσσον: Arabibus, Lifan, siue Lefan alhamel: Italis, Piantagine: Germanis, Vvegerich: Hispanis, Lhantem, siue Tamehagē: Gallis, Plantain.

Locus.

Nascitur in La- Dios.li.2.
cinos, sepibus, cap. 119.
& locis humidis.

Qualitates.

Plantago mista Gale.li.6.
est temperatura: simp me-
dica.

habet enim quid-
dam aqueum fri-
gidum: habet &
austereum quid-
dam, id quod ter-
reum est siccum,
frigidum. Itaque
refrigerat simul
& desiccatur: & in
utroque secundi
excessus à me-
dijs est. In omni-
bus medicamen-
tis, quæ refrige-
rant simul & de-

siccant, primas tenet Plantago: idque temperatura symme-
tria. Siccitatem enim obtinet morsus expertem, & frigidi-
tatem quæ nondum obstupefaciat. Semen & radix similis
sunt facultatis, nisi quod siccioris & minus frigide. Sed &
semen subtilium est partium: radices verò crassiorum. Sic-
ca folia tenuioris & minus frigide sunt facultatis: folia &
semina sunt aliquatenus abstersoria.

1 5

Plan



HISTORIA
Plantago minor.

Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Plantaginis historiam.

Siuri

Sium, seu Lauer: Græcis, *σιόπ*: Arabibus, *Ror cathalmi*, Inhamehanella, seu Hameha-
hahellnella: Italis, Sio, siue Gorgolestro: Germa-
nis, Vvasser merck: Hispanis, Rabacas: Gal-
lis, Berle.

Locus.

Sion in sca- Dios.li.2.
turiētium fon cap. 123.
tium riuis ple

runque nasci-
tur.

Qualitates.

Sium, quan- Gal.li. 8.
tum gustu odo simp. me
ratum est, tan dica.
tum etiam cal
facientis qua
litatis est par
ticeps. Digerit
autem, & Uri
nam mouet, et
calculos re-

nam frangit, & menses euocat.

Ex Fuchfio.

Ex amaritudine conijci potest Sium esse ca-
idum & siccum.

Sisym




Sisymbrium hortense: Græcis, σισυμβριον:
Arabibus, Sifnabarion, siue Sifnabar: Ita-
lis, Sisembro, & Menta Romana: Germa-
nis, Vuasser muntz, siue Bachmuntz: Hi-
spanis, Yerua buena de agria: Gallis, Men-
te aquatique, Baume, Thymbree, ou Ser-
pollet sauage.

Locus ex Dioscoride & Fuchfio.

Dio. li. 2.
cap. 121.

Gale. li. 8.
simp. meo.



Nascitur in
incultis. Item
aquosis &
aquis stagnā-
tibus gaudet.


Qualitates.

Tenuium est
partium: &
digerētis, ex-
calfacientis,
& exiccantis
facultatis in
tertio ordine.
Semen eius te-
nuū est par-
tium, & ca-
lidum.

Sisym

Sisymbrium aquaticum, Cardamina, siue Nasturtium aquaticum: Græcis, σισυμβριον ἑρεπον: Italis, Sisembro aquatiko, siue Crescione: Germanis, Brun kressen, siue Vuasser kressen: Hispanis, Berros, aut Agri-
ris: Gallis, Cresson.

Lotus.



Riguis gan- Dic. lib. 2.
det: & eis. cap. 121.
dem locis qui
bus Sion pro-
uenit.

Qualitates.

Sisymbrium Gale. li. 8.
aquaticum simp. me.
gustu simile
quiddam Na-
sturtio præ-
fert. Siccum
tertij est ordi-
nis excalfa-
cientium, &
desiccantium.

cum humidum & Viride, secundi.

Sisym

Sisymbrium aquaticum alterum: Gallis,
petit Cresson.



Locus, & Qualitates.

*Huc refer omnem Sisymbrij aquatici
prioris historiam.*

Crith

Crithmum, Crithamon, siue Fœniculum marinum: Græcis, *κρίθμον*: Italis, Fendicchio marino, Bacille, & herba di San Pietro: Germanis, Bacillen, siue Meerfenchel: Hispanis, Perexil de la Mar, siue Vnhas de Agnula yerua: Gallis, Bassille, siue Fenoil marin.



Locus.

Nascitur in ^{Diosc. li. 2.} maritimis & ^{cap. 122.} petrosis, & seritur in hortis.

Qualitates.

Crithmum ^{Gal. lib. 6.} gustatibus sal ^{simp. me.} sum quodammodo est, cum paucula amaritate: Et vis eius sit exiccatoria, & absterforia: Et raque tamen imbecillior est in leo, quàm in amaris.

Crith

Crithmum alterum, siue Crista marina:
Gallis, Creste marine, espece de Bassille.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Scopulis, Promontoriis, ac locis maritimis petrosis.

Qualitates.

Huc refer omnia de Crithamo.

Coroio

Coronopus, Serpentina, siue Sanguina-
ria: Græcis, *κορονόπικον ἢ ἀσπερον*: Italis, Herba
stella: Germanis, Kraentfuosfz: Hispanis,
Guiabella: Gallis, Corne de Cerf, siue
Sanguinaire.



Locus.

Pronenit in Diosc. li. 2.
cap. 123.
*aggeribus, lo-
cis incultis,
& secus vias:
seritur tamē
hodie in Ace-
tariarū vsū.*

Qualitates.

Radix man Gale. li. 6.
simp. nic.
*ducata, cæ-
liacis prodes-
se creditur.*

*Ex Diosco-
ride.*

*Radix ha-
bet vim adstringentem.*


Ex Fuchsio.

Ex gustus coniectura desiccet,

m

Core

Coronopus sylvestris, aut Serpentina.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur sponte in diluto extenuatoque
Solo.

Qualitates, ex Matthiolo.

Radix in vino pota praeipuum remedium
est ad venenosos ictus & morsus.

Sonchilodon

Sonchus, Cicerbita, Lactucella, siue Pa-
latum leporis: Græcis, σόνχης: Italis, Ci-
cerbita: Germanis, Vuilder hasen koel,
siue Gens distel: Hispanis, Serraya, siue
Serralla: Gallis, Laiteron, Laitteffon, si-
ue Palais au Lieure.

Locus, ex Matthiolo.

Visitur in
hortis, campis
& Vinetis.

Qualitates.



Temperamen Gale. li. 8.
tum eius quo sim. me.
dammodo mi-
sum est: con-
stat enim ex
aquea terrea
que substan-
tia, & traque
leuiter frigi-
da: nam &
adstrictionis
cuiusdam est
particeps. Illi-

tum autem, & esum, manifestò refrigerat.
Siccum vero terrestris est temperatura, & mo-
dicam habet caliditatem.

m a Son

Sonchus planus : Italis , Cicerbita liscia:
Gallis, Laitteron aux Lieures.



Locus, & Qualitates.

Refer huc Sonchi historiam.

Seris

Carthago Seris, Intubus satiuus, siue Endiuia: Græ
 cæ, ὀκρίς: Arabibus, Dumbebe, Hundebe,
 Ebnu Endeba: Italis, Endiuia: Germanis, En-
 diuien. Hispanis, Endiuia: Gallis, Endiue,
 ba Eue Endiuie.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
 Acetariarum
 Esu.

Qualitates.

Intybus olus Gal. li. 8.
 est subama- simpl. me-
 rum. & ma- dica.

gis quæ agre-
 stis est. Est au-
 tem ea frigi-
 da siccaq; tem-
 peratura, &
 trunque se-
 cundo exces-
 su. Porro do-
 mestica ma-

ris etiam quàm agrestis refrigerat. Sed &
 humiditatis multæ admistio siccitatem extin-
 guit. Verùm & traque adstringentis qualita-
 tis st particeps.

m 3

Im



Intubus hortensis alter : Gallis, seconde
espece d'Endiue.



Locus, & Qualitates.

Huc refer quæ de priore Intubo dicta sunt.

Intybus

Intybus Sylvestris, siue Cichorium: Græ-
 cis, Σέπιν ἀγρία, αἰχώριον, ἢ κινῆρις: Italis, Cico-
 ria Saluatica: Germanis, Vvegveiz, siue,
 Vveg vvarzt: Hispanis, Almerones, & Ci-
 chororia: Gallis, Cicorée sauuage.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in campestribus, & secus vias.

Qualitates.

Hic resumito quæ de Intubo dicta sunt.

m 4 Cich

Cichorium sativum: Gallis, Cicorée
blanche, siue Cicorée des Iardins.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in aletariarum & sum.

Qualitates.

Historiam Intybi hic sumito.

Dens

Dens Leonis, Dens Caninus, caput Monachi, Rostrū porcinum, siue Ambubeia: Theo. de Theophrasto, ἀγῶνα: Gallis, Pissenliet, siue, ^{nat. plāt.} Dent de Lyon: Germanis, Pfaffen roerlin. ^{li. 7. c. 11.}



Locus ex Fuchfio.

Nascitur ubique, praesertim in hortis.

Qualitates.

Hic dicta sint quae de Cichorio agresti praefati sumus.

m 5 Cya

Cyanus maior, Flos Frumenti, siue Baptifecula: Græcis, *κίανος*: Italis, Fior Campese, Battifecula, siue Battifuocere: Germanis, Kornbluomen: Gallis, Aubiffoin, Blauelles, Blaueoles, Bluet, siue Bleuet.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur in cultis, & inter segetes.

Qualitates. ex Fuchfio.

Refrigerat, & repercutit: Viscosus enim gustu est, absq; manifesto calore.

Ex Placētino.

Propria dote pestilentibus morbis aduersatur.

Ex Recentiorum placitis.

Inflammationibus oculorum, & aliarum corporis partium prodest.

Cyanus



Cyanus minor: Gallis, Petit Aubiffoin.



Locus, & Qualitates.

Hinc refer qua dicta sunt de Cyano maiore.
Chon

Chondrilla prima: Græcis, *χονδρίλλα*: Arabibus. Candarel, Cadaron, seu Amiron: Italis, Chondrilla siue Lattaiuola: Germanis, Kleyn Sonnen Vvirbel: Hispanis, Laitugas, siue Leichugas dentre los planos: Gallis, Laitteron.

Gal. li. 8.
sim. me.




Locus, ex
Matthiolo.

*Nascitur in
cultis locis,
scrobium ag-
geribus, & se-
cus vias,
Qualitates.*

*Adstringit
Et Cichorium:
est enim Seri-
dis species, &
eiusdem facul-
tatis.*

Chon

Chondrilla altera.



Locus.

Nascitur in latis & cultis.

Qualitates.

*Huc refer quæ de Chondrilla priore dicta
sunt. Galenus tamen Lactucæ Chondrillam se
mitem facit.*

Dio. li. 2.
cap. 126.

Gal. li. 2.
de alim.
facul.

Cucur

Cucurbita: Græcis, *κολοκύνθα ἐλωδιμή*: Arabibus, Haraha, Hara, seu Charha: Italis, Zucca: Germanis, Kurbfs: Hispanis, Calabassa: Gallis, Cource, Courle, siue, Cauffe.

Locus, ex Fuchfio.

Frigidis & humidis gaudet: nec sponte nascitur.

Qualitates.

Humida frigidaq; temperatura est, & traque qualitate secundum ordinis. Comesta humida est, & sitim propellens: stomacho tamen perniciofa, & concoctum plane inexpugnabile.

Frigidum, humidumq; corpori alimentum prebet, ac idipsum ea de causa exiguum: sed facile per aluum subit, ob substantia sua lubricitatem.

Cucur

Gal. li. 8.
sim. me.

Idé li. 1.
de ali. fa.



Cucurbitæ Indiane, & peregrinæ: Italis,
Zucche Indiane: Gallis Courges d'yver.




Locus, & Qualitates.

Huc refer que de Cucurbita dicta sunt.

Cucu

Cucumer fatiuus: Græcis, σίνυς ήνεπος: Arabibus, Chathe, siue, Chetha: Italis, Cocome ro, & Cedruolo: Germanis, Cucumeru: Hispanis, Cocombro: Gallis, Cocombre.

Locus ex Fuchfio.



Gal. li. 8.
fimi. me.

Latum Solum & apri- cum amat.

Qualitates.

Cucumis escu- lentus matu- rus, quidē te- nuioris essen- tia est: im- maturus Verò crassioris. Sed & absterge di & incidendi facultate par- ticipant. Pul- vis seminis arefacti, con- tusi, & cribra

ti, absterjorius est. Superat in eis humida fri- gidaq; temperies: non tamen magnopere, sed quasi in secundo ordine. Radix, aut semen are- factum, desiccatur in primo quodā ordine, aut etiam in secundo incipiente. Magis etiam abstergit quā caro.

Ang

Anguriæ: Arabibus, Dullaha: Italis, An-
 guria, Citrullo, siue Cocomero: Germanis,
 Gurchen: Hispanis, Cogombro: Gallis, Co-
 ombres.



Locus ex Matthiolo.

Germana est Italia.

Qualitates.

Huc refer omnem Cucumeris historiam.
 n Melones.

Melones, siue Pepones: Græcis *πέπων*: Arabibus, Batheca, seu Bathiech: Italis, Mello ne: Germanis, Pfeben, siue Melaon: Hispanis, Melon: Gallis, Melons.

Locus ex Fuchfio.



Gal.li. 2.
de ali. fa-
cul.

*Loca inso-
lata amat,
& bene sub-
acta.*

Qualitates.

*Vniuersa
Peponum na-
tura frigida,
& largè hu-
mida est, ha-
bentque quā-
dam abster-
gendi vim: et
rapiuntur deor-
sum expedi-
tius quàm Cu-
curbita, aut
Melo pepones.*

*Semen, eorum carne efficacius censetur. Melo-
pepones Verò minus humectant quàm Pepo-
nes: nec adeò prauis succi, tardiùsque deorsum
descendunt, minùsque Urinam prouocant.*

Lactu

Lactuca crispa: Græcis, *Θηράξ*; Arabibus,
Cherbas, siue Chas: Italis, Lattuca: Germa-
nis. Lactuck: Hispanis, Lechuga, siue Alfal-
fala: Gallis, Laitue.

Locus ex Fuchſio.

Seritur in
hortis, Et cate-
ra Oleracea.

Qualitates.

Olus humi- Gale. li. 6.
dum est & fri simpl. me
gidum: non ta dica.
men extreme
(siquidem e-
dendo non fo-
ret) Verū ma-
ximè secun-
dū aquæ fon-
tanae frigidita-
tem.



Ex Simeone Sethi.

Refrigerat & humectat in tertio ordine.

n 2

Lactu

Lactuca florida: Gallis, Laitue en fleur.



Locus, Qualitates.

Vide Lactuca crispa historiam.

Lactuca

Lactuca sylvestris : Græcis, θηραξ ἄγρια:
italis, Lattuca saluatica: Germanis, Vvild
la stuck: Gallis, Laitue sauvage.



Locus ex Fuchſio , & Theophrasto.

Nascitur in aruis , & in Vinearum aut
hortorum septis.

Qualitates.

Viribus quodammodo Papaueri similis.

Ex Simeone Sethi.

Minus humectat & refrigerat quàm satina.

n 3

Chære

Theoph.
de natu.
plan. li. 7.
cap. 6.

Dioſc. li.
2. ca. 130.

Chærefolium, quibusdam, Gingidium
Græcis, χαίρηφιλον, ἢ κυγγύδιον: Italis, Cerefo-
lio: Germanis, Koerffel, siue Kerbelkraut
Gallis, Cerfueil.

Diosc. li. 2.
cap. 131.
Pli. li. 20.
cap. 5.

Locus, ex Diosc. & Plinio.



Gal. li. 6.
simpl. me-
dicæ.

Peculiare
Olus Ciliciæ
& Syriæ hor-
tis. Nunc tam-
men familia-
rissimum est
& ubique se-
ritur.

Qualitates.

Gingidium
sicut gustu a-
maritudinē,
& astrictio-
nem præfert.
sic tempera-
mento quoque
ipso calidit-
atem & frigi-
ditatem. Secundum Verò utramque qualita-
tem desiccatorium est. Non parvam obtinet
adstrictionem: nec admodum conspicuam cali-
ditatem: Veram desiccatur secundo recessu.

Pecten

Pecten Veneris, siue Scandix Hermolai
Barbari: Germanis, Vvild moren.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur inter segetes, praesertimque in a-
grorum marginibus.*

Qualitates ex eodem.

*Ex acrimonia & amaritudine quam gu-
stui representat, non excedit primum siccita-
tis & caliditatis ordinem.*

Ex Plinio.


Radix contusa corpori infixa extrahit.

Pli. li. 24.
cap. 19.

n 4

Cau

Caucalis, siue Daucus sylvestris, aut Petroselinum erraticum: Græcis, *κωνναλιν*: Italis, Petrosello saluatico: Gallis, Persil sauvage.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Campestribus, inculto præsertim solo.

Qualitates.

Gal. li. 7.
simp. me
dica.

Caucalis adsimilis est Dauco, gustu, ac Viribus: nam exalfacit ut ille, & desiccatur.

Eruca

Eruca: Græcis, *ἑρσιν*: Arabibus, Iergir,
Ergir, seu Giargir: Italis, Ruchetta, siue Ruc
cola: Germanis, Vveisz senff: Hispanis, Oru
ga, & Aruga: Gallis, Roquette.



Locus ex Fuchſio.

Seritur in acetariarum & ſum.

Qualitates.

Excalfacit per quàm manifeſtè: genitale
ſemen auget, & Venerem ſtimulat.

Gale. li. 2.
de alimē.
facul.

Ex Fuchſio.

Eiusdem eſt temperatura cuius Eryſimon.

n 5

Eruca

Eruca fyluestris: Græcis, *ἐνσωμοε ἀγγιον*: Italia, Ruchetta gentile, siue saluatica: Gallis, Petite Roquette, siue Roquette gentille, aut Roquette sauuage.

Locus.

Dio. lib. 1.
cap. 134.



*Gignitur
maximè in I-
beria quæ Oc-
cidentem spe-
ctat.*

Ex Fuchfio.

*Nascitur spon-
te in riguis:
Et seritur in
acetariarum
et sum.*

*Qualitates
ex Dioscori-
de.*

*Multò satina acrior: Et magis Grinam pellit.
Ocim*

Ocimum Latinis & Græcis : Arabibus,
verò Berendaros, & Bedarog: Italis, Basili-
co: Germanis, Basilien, siue Basilgram: Hi-
spanis, Albahaca: Gallis, Basilic.

Locus ex Matthiolo.



Seritur in
hortis: & per
rara sunt a-
dium fene-
stra, perrara-
que cœnacula
ac Viridaria,
qua Ocimum
non redoleât:
frequens enim
seritur & fo-
netur in figu-
linis & asis.

Qualitates.


Ex secundo Gale. li. 8.
est ordine cal- simp. me.
facientium.

Habet autem
recrementitiâ
humiditatem:

proinde nec commodum est quod in corpus su- Gal. lib. 2.
matur. Illitum, ad digerendum & concoquen de ali. fa.
dum & tile est. & itiosi est succi.

Ocimum

Ocimum gariophyllatum, siue Ocimum
paruum: Italis, Basilico gentile: Germanis,
Kleyn Basiliën: Gallis, Petit Basilic, siue
Basilic gentil.



Locus & Qualitates.

Huc refer omnem Ocimi historiam.

Oroban

Orobanche, siue Erui angina: Græcis *ὀροβάνχη*: Italis, Herba lupa, Coda di Leone, siue Herba Tora.



Locus.

Nascitur inter legumina, eaque strangulat. Dio. li. 2. cap. 136.

Qualitates.

Refrigerat, & desiccatur in primo recessu. Gale. li. 8. simp. me.

Hirci

Hirci Barbula: Græcis, τραγονάριον: Ital-
lis, Barba di Becco, siue, Sassefrica: Ger-
manis, Boksbart, siue Gauch brott: Hispan-
nis, Barba de Cabron: Gallis, Barbe de
Bouc.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur te-
merè in pra-
tis.

Qualitates,
ex Matthio-
lo.

Succus fo-
liorum, vel eo-
rum stillatitia
aqua, vim
spissandi ha-
bet.

Ex Fuchio.

Radix, &
herba, quæ gu-
sta dulcis est, indicat Tragopogon humidum
esse, & moderatè calidum.

Ornith

Ornithogalum, Latinis & Græcis,
Gallis, Churles.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur frequens inter Segetes.

Qualitates ex eodem.

*Radices suauissimi sunt gustus, & esui
aptissima.*

Trasi.



Locus ex Matthiolo.

Germinant in cultis, & Campestribus.

Qualitates ex eodem.

*Venerem stimulant : & quantum ex dul-
cedine conijci potest, in calfacientium & hu-
meclantium genere censentur: sed flatu quo-
dammodo gignunt.*

Tubera

Tubera : Græcis , *ῥαβδα* : Arabibus , Ra-
 abomech, Alchamech, Tamer, siue Kema: Ita-
 lis, Tartuffi : Germanis , Hirs brunst : Hi-
 spanis, Turmas de tierra : Gallis, Truffles,
 siue Truffles.



Locus ex Matthiolo.

*Terra occulta quadam facultate conglobat
 Syluosis & montium radicibus gaudent.*

Qualitates.

*Nullam habent euidentem qualitatem. Fri Gale. li. 2.
 gidiusculum & crassum præbent alimentum. de alim.
 facul.*


Ex Auicenna.

*Tubera terrena magis quàm aquea sunt,
 omni que prorsus sapore expertia. Atrabilia-
 res & crassos gignunt humores : concoctu que
 sunt contumacia, & Ventriculum aggrauât.*

o

Smi

Smilax hortenſis: Græcis, *σμίλαξ ἡκτωρία*:
 Arabibus, Lubia: Italis, Faggiuolo Tur-
 cheſco: Germanis, Vuelfſch bonen: Hispa-
 nis, Feyones: Gallis, Faſiolz de Turquie,
 Feues peintes, ſiue, Pois à viſages.



Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis ad opacandas Pergulas.

Qualitates, ex Simeone Sethi.

Gale. li. 2. *Excalfaciunt & humectant in primo ordine.*
 de ali. fa.

Ex Galeno.

Humectant.

Apha

Aphaca, Aphace, Vicia syluestris, siue
 Os mundi: Græcis, ἀφάκη: Arabibus, Apaki,
 Afaki, siue Albikia: Italis, Vicia saluatica:
 Germanis, Vuilde vuicken, siue, vogels
 vuicken: Gallis, Vesse sauuage.

Locus ex Matthiolo.

Non solum
 sponte nasci-
 tur: sed & a
 multis feritur
 ad Columba-
 rum saginā.

Qualitates.

Insuavis est, Gale. li. 1.
 concoctu diffi- de ali. fa.
 cilis, & aluū
 retinens, Im-
 probum cras-
 sumque suc-
 cum gignit, et
 qui facile in
 humorem me-

Lancholicum vertatur.

Ex Fuchfio.

Moderatè calida est: Verum desiccant effi-
 aciter.

②

Vicia

Vicia: Græcis, βυνίον: Italis, Vitia: Germanis,
Vuicken: Gallis, Vesse.



Locus ex Fuchfio.

Aridis gaudet. Seritur autem inter segetes.
Qualitates.

Eiusdem temperatura cuius Aphaca.
Ex Fuchfio.

*In medio est caliditatis & siccitatis: ma-
gis autem desiccatur: Et sit secundi ordinis de-
siccantium.*

Porrum

Porrum capitatum: Græcis, *ῥάδιον* *ῥαδιον*
ῥάδιον: Arabibus, Curat, seu Kurat: Italis,
 Porro de gli horti: Germanis, Lauch: Hi-
 spanis, Puerro: Gallis, Porreau.

Locus ex Fuchfio.



*Latis gaudet: humidum
 Verò & aquosum solum odit.*

Qualitates.

*Corpus ex Galc. li. 2.
 calfacit, & de ali. fa.
 crassos in eo
 humores extenuat, g'utinososque incidit.*

Ex Dioscoride.

*Flatuosum
 est: Semen tam
 acris est Diof. li. 2.
 & quandam cap. 143.
 adstrictoriam*

Sim habet. Venerem stimulat.

Ex Fuchfio.

Calfacit & incidit & Capa.

Ex Symeone Sethi.

Calfacit & desiccatur in secundo ordine.

Porrum agreste: Græcis ἀμπελόπρασον: Arabibus, Nabati: Italis, Porro saluatico, siue, Porrandello: Germanis, Vvild lauch: Hispanis, Hayos, & Pierros de las vinhas: Gallis, Vigneporrette, Porrée de Chien, siue, Porreau sauvage.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur perun-
que in vineis, agrorum
marginibus,
et in amœnis
collium locis.

Qualitates.

Ampeloprasum acrius et
siccius est porro domestico,
& stomacho
nocentius. Sed
& crassos &
lentos humores
potentius
incidit: Valen-
tiusq; infar-

cta organa obstructione liberat. Adeo calidum
est, ut illitum exulceret. Extremi ergo est or-
dinis calfacientium.

Cepa

Gale. li. 6.
sim. me.



Cepa: Græcis, *κρόμμυς*: Arabibus, Basil,
 seu Bassal: Italis, Cipolla: Germanis, Zvvi-
 bel: Hispanis, Cebolla: Gallis, Oignons.



Locus, ex
 Fuchfio.

*Pingui solo
 gaudet, et Oli-
 ginoso. Seri-
 tur semine &
 radice.*

Qualitates.

Gal. li. 7.

sim. me.

*Ex quarto
 est ordine cal-
 faciētium: es-
 sentia autem
 eius potius
 crassarū par-
 tium. Porro, si
 succum expri-
 mas, quod re-
 liquū est ad-*

*modum terrea substantia est, eiusq; calide: suc-
 cus verò aquea, aëreaq; qualitatis. Cepa mā-
 ducata flatuosa est. Itaque quæ temperatura
 sunt siccior, minus flatuum generant. Cetera
 verò Porro similis.*


0 4

Allium

Allium : Græcis , *ονόπoδoν* : Arabibus
 Chaum, Cairin, seu, Thum : Italis, Aglio
 Germanis, Knoblauch: Hispanis, Ayos: Gal-
 lis, Ail, seu, Aux.

Theo. de
 na. plan.
 li. 7. c. 4.

Gal. lib. 2.
 de alim.
 facul.



Locus.

Seritur, nu-
 cleatim diuisi-
 sum, in hortis
 Qualitates.

Allium non
 modo & obso-
 lium, verum
 etiam & me-
 dicamentum
 & surpatur: o-
 strueta enim
 soluere & di-
 scutere potest
 Aliquatisper
 elixum, & squa-
 dum acritud-
 nem abiiciat

imbecillius fit, sed succi prauitatem amittit.

Ex Fuchio.

Dio. li. 2.
 cap. 146.

Desiccant & calfaciunt quarto ordine.

Ex Dioscoride.

Vis Allij acris est. Excalfacit, mordet, infla-
 tiones facit, & summam cutem exulcerat.

Scoro

Scorodoprasum Latinis, & Græcis: Germa-
nis, Aberknoblauch, siue Feld Knoblauch:
Gallis, Ail. porreau.



Locus ex Matthiolo.

*Vmbrosis gaudet: & sponte nascitur in pra-
torum marginibus.*

Qualitates.

*Scorodoprasum sicut gustu & odore mediā Gal. li. 8.
Allij, & Porri qualitate obtinet: ita & Vires. sim. me.*

o 5 Sinapi

Sinapi primum: Græcis, Σίνυπι ἢ νάπι: Arabibus, Cardel, siue, Chardel, Italis, Senape: Germanis, Senff: Hispanis, Mostaza. Gallis, Seneué, siue, Moustarde aux fleurs blâches.

Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Calfacit & desiccatur quatuor ordine.

Ex Dioscoride.

Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum efficacax.

Ex Matthiol. Officina vtuntur ad caustica.

Gal. li. 8.
sim. inc.



Sinapi

Sinapi secundum, siue, Sinapi erraticum:
 Gallis, Seneué à fleurs iaunes, seu, Seneué
 sauuage: Italis, Senape saluatica.



Locus, ex Fuchſio.

Nascitur ſponte in cultis, & Nonalibus.

Qualitates.

Eiusdem eſt temperaturæ cuius primum
 Sinapi.

Sinapi

Sinapi tertium : Gallis, Moustarde blanche & douce.



Locus ex Matthiolo.

Sativum est.

Qualitates

Huc refer omnem Sinapis historiam. Id tamen proprium habet, ut musto recenti commistum (sit modò tritum) eius dulcedinem tueatur, eamq; deficere prohibeat, quòd ebullitionem reprimat.

Nastu

Nasturtium hortense: Græcis *ναρδακον*:
Arabibus, Norf alchef, seu Narf: Italis: Na-
sturtio, & Agretto: Germanis, Kressen, siue,
GartenKress: Hispanis, Nasturcio, & Malpi-
ca: Gallis, Nasitort, Cresson Alnoys, siue,
Cresson de Iardin.

Locus, ex Matthiolo.



Familiaris
est hortis, &
frequens her-
ba, expetita
in Acetaria-
rum & sum.

Qualitates.

Adueris
facultatis est
particeps na-
sturtij semen,
sicut Sinapi:
Itaque ubi ru-
brificatione
opus est, eo per
inde atque Si-
napi excalfa-
ciunt. Valēter

Gal. lib. 7.
sim. mc.

incidit crassos succos. Herba arefacta similem
semini Sinapi possidet: Viridis autem multo se-
mine inferior est.

Thlaspi

Thlaspi, Capsella, Scandulaceum, Nasturtium rectorum, aut Sylvestre Nasturtium: Græcis, θλάσι, ἢ θλασπίδιον, σίνυπι ἄγριον: Italis Tlaspi: Germanis, Bisem Kraut: Hispanis, Paniqueso de flor blanco: Gallis, Seneué sauvage.

Dio. li. 2.
cap. 150.

Gal. li. 5.
sim. me.



Locus.

Nascitur in
emitis, & se-
pibus, fossisq³.

Qualitates.

Thlaspi semē
habet facultā-
tem acrē, adeo
ut internos
atque potū
disrumpat. Fœ-
tus enecat:
estq³ tum su-
perne, tum in-
ferne bilio-
forum, huma-
rum euacua-
terium, aceta-

buli mensura potum.

Ex Fuchio.

Semen desiccatur & calfacit quarto ordine.

Bursa

Bursa Pastoris: Germanis, Tetschelkraut:
Gallis, Bourse à Pasteur.



Locus ex Fuchsio.

*Vbiq̃ue temerè nascitur, maximè secus
vias, & inter Rudera.*

Qualitates ex Matthiolo.

*Est ex refrigeratium, exiccantium, & ad-
stringentium ordine. Succus herbae glutinato-
rius est, in summa, adstringit valenter omnes
sanguinis fluxiones.*

Arabis,

Arabis, Draba, siue Nasturtium Orientale, aut Nasturtium Babylonicum: Græcis, ἀράβις, ἢ ἀράβη: Gallis, Draue.

Locus, ex Matthiolo.

*Nascitur in
campestribus,
Et agrorum
marginibus.
Ex Ruellio.*

*Non alibus
Et sæpè cultis
gaudet.*

*Qualitates.
ex Dioscorid.*

*Semen ar-
dum pro pipe-
re obsonijs ad
miscetur.*

Ex Serapiõe.

*Insignis est
acrimonia, et
Nasturtio, si-
milis.*

Irio

Dioscor.
lib. 1. cap.
151.



Irio, Erysimum, Rapiſtrum, ſiue Sinapis
ſylueſtris: Græcis, ἐρύσιμον: Italis, Eryſimo:
Germanis, Hederich, ſiue Vvilder ſenff: Hi-
ſpanis, Rinchaon: Gallis, Velar, ſiue Tor-
telle.

Locus.

Nascitur in Dioſ. li. 2.
xta Vrbes, ru- ca. 152.
dera, hortos-
que.

Ex Matthio-
lo.

Fructicat paſ-
ſim in plateis,
ædificiorū a-
reis, & ruderi-
bus, & ſecus
vias oritur.

Qualitates.

Acrimonia
pollet Et Naſturtium & Sinapi.

Gale. li. 6.
ſimp. me-
dica.

Ex Fuchſio.

Semen Irionis eodem ordine calfacit & de-
ſiccatur quo Naſturtij. Herba arefacta ſemini
par eſt. Sirens enim imbecillior eſt.

p

Canta



Cantabrica, quibusdam, Vettonica altera: Officinis, Tunica, aut Gariophyllata: Italica, Garofoli: Germanis, Grafsblum, siue Naiglinblum: Gallis, Oeilletz, siue Giroflées.



Locus ex Fuchſio.

*Seruntur studiosè in hortis, fouenturque in
figulinis ad Cœnaculorum decorem.*

Qualitates ex Eodem.

*Odor, amaritudoque indicia sunt calidita-
tis, & siccitatis.*

Canta

Cantabrica altera, siue Vettonica sylue-
stris: Italis, Garoffoli saluatichi: Germanis,
Donderneglin: Gallis, Armoiries, Oeilletz
sauuages, siue Chante pouletz.



Locus ex Fuchsio.

*Nascitur sponte in Pratis, montibus, & lo-
cis insolatis.*

Qualitates ex eodem.

*Huc refer omnem prioris Canta-
brica historiam.*

P 2

Hydro

Hydropiper, siue Persicaria: Græcis, *ὑδρο-
πύριον*: Italis, Hydropepe, siue Pepe aquati-
co: Germanis Vvasser pfeffer, siue Mucken-
kraut: Hispanis, Hierua pexiguera sin man-
chas: Gallis, Curage



Locus.

Dio. li. 2.
cap. 155.

*Apud aquas na scitur que stagnant, aut pi-
gro lapsu repunt.*


Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Qualitates.

*Calidum est, & siccum sed non tan-
tum ut Piper.*

Persicaria

Periscaria: Gallis, Curage.



Locus ex Fuchſio.

In humidis & paluſtribus naſcitur.

Qualitates ex eodem.

Frigida eſt & ſicca, Et ex adſtringente guſtu conijcitur.

P 3

Ptarmi

Ptarmica, Sternutamentaria, siue Pyrethrum syluestre: quibusdam, Tanacetum aquaticum acutum: Italis, Oliuella: Germanis, Vvasser oder spitzer Keynfarn: Gallis, Herbe à esterneuer.

Locus.

Nascitur in montibus, & petrosis.

Qualitates.

Ptarmica flores cienda sternutationis vim obtinent: est enim temperies eius calida, & sicca: Viridis etiamnum ordine secundo: siccata tertio.


Cycla

Diosc. li.
2. ca. 156.

Gale. li. 8.
simpl. medica.



Cyclaminus, Cyclamen, Rapum, Tuber,
 siue Umbilicus terræ, aut Panis Porcinus:
 Græcis, κυκλάμιον & Arabibus, Buchor ma-
 rien, Buther marien, siue Bothor mariæ: Of
 ficinis, Cyclamen, siue Arthamita: Italis,
 Cyclamino, siue Pan Porcino: Germanis,
 Schvvinbrott, siue Erdapffel: Hispanis, Pan
 de Puerco: Gallis, Cyclamen, siue Pain
 Porcin.



Locus.

Nascitur in
 Umbrosis, ma-
 ximè sub ar-
 boribus.

Dio. lib. 2.
 cap. 138.

Qualitates.

Abstergit, in- Gal. li. 7.
 cidit, ora ve- simp. me
 narum aperit, dica.
 attrahit, &
 digerit: adeo-
 que Vehemens
 eius facultas
 est, Et abdomi-
 ne illito, Ven-
 trem subdis-
 cat, & fletum
 interimat.

Ex Fuchfio.

Calfacit & desiccatur tertio ordine.

P 4

Dra

Dracunculus maior, siue Serpentaria maior: Græcis, *δρακοντρία μεγάλη*: Arabibus, Luf, siue Alluf: Italis, Dragontea maggiore: Germanis, Natter vvurtz: Hispanis, Taragontia: Gallis, Serpentine, siue Serpentaire.

Dios. li. 2.
cap. 163.

Gale. li. 6.
simpl. medica.



Locus.

Nascitur in
Embrosia, &
circum septa.

Qualitates.

Quiddam
Aro persimi-
le obtinet, tū
folijs, tum ra-
dice: acrior ta-
men est, &
amarior, ac
proinde ma-
gis calfacto-
ria, & subti-
liorum par-
tium. Habet
etiam lenem
quadam ad-

frictionem. Radix viscera omnia expurgat,
crassos potissimum & lentos succos extenuas:
optimūque remedium est contumacium & l-
cerum.

Ex Fuchio.

Calfacit & desiccant.

Dracun

Dracunculus minor, siue Serpentaria minor: Græcis, *Agavovíox* *μινγὰ*: Italis, Dragótea minore: Germanis, Kleyn Natter vvurtz: Gallis, Petite Serpentaire.

Locus.

Nascitur in *Dis. li. 2.*
sepibus Smbro *cap. 151.*
sis.

Qualitates
ex Dioscori-
de.

Radix exal-
facit, & Vene-
rem stimulat.

Ex Theophra-
sto.

Radix cibo i- *Theoph.*
nepta penitus *de natu.*
est, & Medi. *plāt. li. 7.*
cis tantum comoda. *cap. 11.*

Vide historiam Dracunculi maioris.

P 5

Dracua



Dracunculus hortensis, siue Dracuncu-
lus Acetariarum: Italis, Dragoncello: Gal-
lis, Targon.

Locus ex Matthiolo.



Quibusdam
cultorum man-
gonio factitia
est, ex Lini se-
mine excava-
tis cepis impo-
sito, ac deinde
terra recondi-
to. Seritur ta-
men & radi-
ce, & semine,
in Acetaria-
rum & sum.


Qualitates
ex eodem.
Perpensa eius
acrimonia,
qua maximè

linguam vellicat, eorum esse Medicamento-
rum, quæ Valentissimè excalfaciunt, conijci
potest.

Lingua

Lingua Serpentina: Græcis, ὀφιογλωσσός:
 Italis, Lingua Serpentina, Argentina, siue
 Lucciola: Germanis, Natterzuonglin: Gal-
 lis, Herbe sans cousture, siue Langue de
 Serpent.

Locus ex Matthiolo, & Fuchfio.



Nascitur in
 Pratis vligino-
 sis, & monto-
 sis.

Qualitates
 ex Matthio-
 lo.

Glutinato-
 ria est: et com-
 mendatur mi-
 rificè ad Ente-
 rocelas.

Ex Fuchfio.
 Desiccat absq;
 manifesto ca-
 lore: idque ex
 gustu conijci-
 tur.

Arum:

Arum: Græcis, ἄρον: Syris, Lupha: Arabibus, Iarus, siue Sara: Officinis, Aron, Barba Aaron, Dragontea minor, siue Serpētaria minor: Italis, Aro, siue Gigaro: Germanis, Aron, siue Kleyn natter vvurtz: Hispanis, Yaro: Gallis, Vit de Chien.

Locus, ex Matthiolo.



Gal. li. ii.
simp. mc.

Frequentissimum provenit in campis, vineis, scrobium marginibus, semitis propter sepes, & in maritimis.

Qualitates.

Terrena constat essentia, sed calida: proinde extergendi vim obtinet, Verum non ita valentem sicut Dracontium.

Est itaque in exiccando & calefaciendo primi ordinis.

Ex Fuchfio.

Arum nostrum calidum est & siccum tertio ordine: idque indicat Vehemens eius acrimonia.

Arifia

Arisarum primum.



Locus ex Matthiolo.

Plurimum nascitur in agro Romano, non
longè ab Vrbe.

Qualitates.

Acrius est Aro.

Gale. li. 6.
simp. me.

Arifa

HISTORIA
Arisarum alterum.



Locus.

Nascitur in Umbrosis.

Qualitates.

Huc refer prioris Arisari historiam.

Asphod

Asphodelus, siue, Hastula Regia: Græcis, ἀσφόδελα, Arabibus, Cheunce, Bhunte, Biruach, Abg, seu, Axeras: Italis, Asphodelo, Amphodillo, siue, Hastula Regia: Germanis, Goldvvurtz, siue, Heidnisch: Hispanis, Gamones, Gamonites: Gallis, Afrodilles.

Locus ex Matthiolo.

Montes syl-
uosos amat.

Qualitates.



Asphodeli ra Gal. li. 6.
dix Stilis est simp me.
sicut Ari, * Ari * quidam
sari, & Dra- legunt,
contij, nempe Afari.
extergentis &
discutientis fa-
cultatis. Vsta
autem cinis ca-
lidior & exic-
cantior, subti-
liorque, ac di-
gerere potetior

efficitur: proinde & Alopecias sanat.

Scilla

Scilla, Varroni, Squilla: Græcis, *σύνιμα*: Arabibus, Haspel, Hansel, Aschil, siue Alaschil: Officinis, Squilla, siue Scilla: Italis. Squilla: Germanis, Meer zvvibel: Hispanis, Cebolla albatrana: Gallis, Squille, Stipouille, Charpentaire, siue Oignon marin.

Locus, ex Matthiolo.



Gale. li. 8.
fin. mc.

Innumera
oriuntur in Hi
spania mari-
timis.

Ex Fuchio.

Seruntur
Ubique, Et Al
lia & Capa.

Qualitates.

Admodum
incidētem fa-
cultatem obti-
net, non ta-
men admodū
calidam. Se-
cundi tamen
est ordinis ex
calfaciētium.

Præstat an-
tem assam vel elixam sumere, ad exoluen-
dam eius Vehementiam.

Capparis.

Capparis, Latinis, & Græcis: Arabibus
verò Cappar, siue Kappar: Italis, Capparo:
Germanis, Kappren: Hispanis, Alcaparras:
Gallis, Cappres.

Locus.

Tenui ple- Diof. li. 2.
runque solo, cap. 169.
asperisque lo-
cis, in insulis,
& iuxta ru-
dera nascitur.

Qualitates.

Capparis ra- Gale. li. 7.
dicis cortex & simpl. me
centem habet dica.


qualitatem a-
maram: pro-
ximam acré:
deinde acer-
bam. Constat
ergo ex pugna
tibus & diuer
sis facultati-

bus. Incidit enim, purgat, & abstergit amari-
tudine: excalfacit autem, incidit, & digerit
acrimonia: porrò contrahit, densat, & con-
stringit acerbitate. Abstergit item, nec segni-
ter desiccatur. Fructu & stimur & medicamen-
to magis quàm & alimento.

q

Lepi

Lepidium Dioscoridis.



*Nomenclaturam, locum, & qualitate
Vide in hiftoria Iberidis.*

Lepidium

Lepidium Pauli Aeginetæ, & Plinij: Of-
ficinis, Piperitis maior: Italis, Piperella: Gal Pli. li. 19.
lis, Passe-rage, Chasse-rage, siue, Poyurée. cap. 8.



Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis, et in multos annos perënat.

Qualitates ex eodem.

*Excalfacit, vt Nasturtium, in quarto ordi-
ne: nō tamen attingit tertiu siccitatis gradu.*

Hæc etiam refer omnem Iberidis historiam.

q 2 Ra

Ranunculus primus: Græcis, βασιλίσκος, Ranunculus
 Italis, Ranunculo: Germanis, Hane-
 fuosz: Hispanis, Hyerua belida: Gallis, Gre-
 noillette, siue Bassinetz.

Locus ex Fuchsi

Dios. li. 2.
 cap. 171.

Gal. lib. 6.
 si mp. me.



Rignis ga-
 det & opaci-
 latisque pra-
 tis, & hum-
 dis. Item, na-
 scitur in lim-
 tibus humida

Qualitate

Omnes R-
 nunculi Veh-
 ementer acres-
 facultatem p-
 sident, adeo &
 cum dolore e-
 ulcerent. Ra-
 dix arefacta

sternutatorium est medicamentum, similite-
 alijs omnibus quæ valenter desiccant. In sum-
 ma, calida & sicca & valde est tum radix, tum
 & niuersa adeo herba. Radix sicca frangi-
 dentes & valenti exiccatione.

Ranu

Ranunculus secundus, Apium risus, si-
 ne Herba Sardonis, aut Sardoia, Sallustio, Plin. libr.
 Plinio verò, Apiastrum. 20. ca. 11.



Locus ex Fuchfio.

Riguis & fontium scaturiginibus gaudet.

Ex Dioscoride.

Plurimum in Sardinia prouenit.

Dio. li. 2.
 cap. 171.

Qualitates.

Venenatam vim sortitur: cetera à Ranun-
 culo similis.

9 5

Ter

Tertius Ranunculus: Gal-
lis, Bassinetz.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur temerè in Pratis, & Campestribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Ranunculi historiam.

Ranunculus

Ranunculus quartus: Germanis, Vveisz
Vvalt thendlin: Gallis, Grenoillette blan-
che: Italis, Pie Coruino.



Locus ex Fuchfio.

Syluosis gaudet, & opacis.

Qualitates.

*Eiusdem est temperatura, cuius Ranun-
culus.*

q 4 Ranun

Ranunculus quintus: Italis, Pie di Gallo:
Germanis, Druosz vvurtz: Gallis, Piepou.



'Locus, ex Fuchfio.

Nascitur in Campestribus, & Pratis.

Qualitates ex Matthiolo.

*Radix acris est & exulcerans: folia item
septica sunt.*

Anem

Anemone: Græcis, *ανημόνιον*: Arabibus,
Iackaik alnahamen, siue, Sakaik anhea-
men: Italis, Anemone: Germanis, Anemo-
ner roeszlin: Gallis, Paffefleur.



cat: & succus ex naribus purgat.

q 5

Anem

Locus. Dio. li. 2.
In Aruis sa cap. 172.
pius enasci-
tur: feritur ta-
men hodie in
hortis ad Co-
ronas.

Qualitates. Gal. li. 6.
sim. mc.

Anemona
omnes acrem
extergendi, at-
trahendi, &
ora Vasorum
referandi fa-
cultatem obti-
nent. Radix
commansa pi-
tuitam eno-

Anemone altera : Gallis, seconde espece
de Paffè fleur.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Anemones historiam.

Puls

Pulsatilla: Germanis Ruchenschell.



Locus,

Seritur hodie ad Coronas.

Qualitates, ex Matthiolo.

*Folia sapore sunt perquam acri, adeo Et nō
minus exulcerent quā Ranunculus, & Flā
mula. Radicis sapor subdulcis, non autē acris,
Veluti folijs & caulibus. Hanc miris laudibus
efferunt contra pestilentiam & hausta Gene-
ra, itemq; cōtra Venenosorū morsus & ictus.*

Anag

Anagallis mas, siue. Morsus Gallinæ: Græcis, ἀναγallis: Italis, Anagallide: Germanis, Gauch heyl: Hispanis, Muruges: Gallis, Morgeline, siue, Mouron à fleurs rouges.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur
Ubique, ma-
ximè in lato,
solo.

Qualitates.

Anagalli-
des extergunt
Valenter: ha-
bentq; quen-
dam calorem
attractoriū:
ita ut infixos
aculeos attra-
hant. Desic-
cāt citra mor-
dicationē: &
glutinatoria
sunt. Succus


ex naribus purgat.

Ex Fuchfio.

Calida sunt & sicca: detergent enim cu-
rem illita.

Anag

Cal. li. 6.
simp. mc.



Anagallis foemina: Gallis, Mouron bleu.



Locum & Qualitates vide in historia
Anagallidis masculæ.

Morsus

Morsus Diaboli, aut Succisa.

Locus ex Matthiolo.

Prouenit in incultis, in saltibus, pratis, et dumetis.

Qualitates. ex eodem.

Herba Viridis trita et imposita, carbunculis pestiferis praesentiremedio est: aut si Vinum, in quo decocta fuerit, bibatur. Radix, per se estur, aut eius decocti Vinum


Stiliter bibitur ad pestilentem auram arcendam, & ad Vteri dolores. Calida, & sicca est facultatis. Siccata puluis Valet ad tineas alui necandas. Radix illita sugillata emendat.

Hedera



Hedera Helix: Græcis, *uivōs*: Arabibus,
Cuslus: Italis, Hedera: Germanis, Mavver,
Ephevvbaum, Ephevv, siue, Ebich: Hispa-
nis, Edera, siue, Era: Gallis, Terreſtre, siue,
Lyerre.

Locus, ex Fuchſio.



Nāſcitur te-
mere in ſyluo-
ſis, ſcandit q̄
arboreſ, et hu-
mi repit.

Qualitates. Gal. lib. 7.

Hedera ex ſim. me.

cōtrarijs com-
poſita eſt ſacul-
tatibus: habet
enim quiddā
adſtringentis
ſubſtātiæ, quā
terrenam &
frigida eſſe
cōſtat. Habet
item nonnihil
acris: quā ca-

lida eſſe & el guſtus comprobat. Aqueam præ-
tereā ſubſtantiā quandam tepidā obti-
net, certe ſi viridis ſit. Siquidem arefacta hac
prima exhalet neceſſe eſt: naueſt q̄, quæ terrenæ
& frigida eſt, adſtringens: & ea quæ calida,
& acris.

Hedera

Hedera arborea: Gallis, Lierre se tenant
en pied comme vn Arbre.



Dio. li. 2.
cap. 175.

Locus ex Fuchſio.

Humidis gaudet & parietinis.

Qualitates.

*Hedera omnis acris eſt, & adſtringens. La
cryma autem pſylothrum eſt. Vide hiftoriam
Hedera Helicis.*

Cheli

Chelidonium maius: Græcis, χελιδόνιον
 μέγα: Arabibus, Kauroch, Chalidunium,
 Chilodomontoma, seu Memirā: Italis, Ce-
 lidonia: Germanis, Schel vvurtz, siue Schel
 kraut: Hispanis, Celiduenha, siue Yerua de
 las golundrinhas: Gallis, Chelidoine, Escle-
 re, siue Felongne.

Locus ex Matthiolo.



Fructicat
 propter sepes
 in scrobium ri-
 pis, secus vias,
 inter rudera,
 & in edificio-
 rum ruinis,
 seu parietinis.

Qualitates. Gale. li. 8.
 Extergentis simp. me-
 dica.

admodum &
 calida faculta-
 tis est: Succus
 eius ad acuen-
 diū & sum com-
 modus est: & i-
 que in quibus
 crassum quid-

dam in pupilla colligitur, digestionē indigens.

Ex Fuchio.

Calfacit & desiccāt tertio ordine completo.

r Cheli

Chelidonium minus, Triticum sylvestre,
 siue Scrofularia minor: Græcis, χελιδόνιον μ
 ἄρον: Arabibus, Memiten, seu Chilodomon
 Italis, Celidonia minore, seu Fauoscello
 Germanis, Feigvartzen, Blanterkraut, Pfa
 fenhoëdlin, & Meienkraut: Hispanis, Scro
 fularia menor: Gallis, Couillons de Pre
 stres, siue Petite Esclere.

Locus.

Dios. li. 2.
 cap. 177.

Gal. li. 8.
 simpl. me
 dica.



Iuxta aquas
 & Lacus na
 scitur.

Qualitates.

Chelidonium
 minus, cum
 acrius sit ma
 iore, celeriter
 illitum cutem
 exulcerat, & n
 guesque sca
 bros eijcit. Suc
 cus eius per
 nares purgat,
 Et pote admo
 dum acer. Ita
 que quarti est
 ordinis ca fa

cientium, & desiccantium. Ex Fuchfio.

Nullam habet evidentē acrimoniā nostrum
 Chelidonium: modò nō germinet in loco arido.

Aqui

Aquilegia, Aquilina, quibusdam, Cheli-
donium maius: Italis. Aquilina: Germanis,
Ackeley: Gallis, Ancholies.

Locus ex Fuchſio.



Seritur ad
coronas, in hor-
tis. Sponte ta-
men nascitur
in pratis & ligi-
nosis, monti-
bus syluosis, et
inter saxa &
fruteta: aqua
que perennem
subesse & bicun-
que deprehen-
datur Aquile-
ges dicunt.

Qualitates
ex eodem.
Gustu aliqua-
tenus dulcis

est: itaque & immoderate calfaciendi & dige-
rendi obtinet.

r 2

Auricu

Auricula muris : Græcis, *μυρὸς ὠρία*, *κ. μυρὸς ὠρία*
ωρία: Italis, Orecchia di topo : Germanis
 Vvaldt mangolt mit blauuen bluomen: H
 spanis: Oreyra de raton, Yerua: Gallis, Ore
 le de rat, siue Espece de Mouron.



Locus ex Matthiolo.

*Viret in Pratis, in Campis, in hortis, secus
 Vias, & Vbique frè locorum.*

Qualitates.

Gale. li. 7.
 simpl. me
 dica.

*Auricula muris, desiccata ordine secundo: ca
 terum nullam euidentē caliditatem possidet.*

Gla.

Glastum, siue Isatis sativa: Græcis, *ισατὶς*
ῥαβδ: Arabibus, Dili, Dileg, Vesme, Cha-
 re, Alchat, Adlen, Adhlen, seu Nil: Italis,
 Isatide, Glasto, seu Guado: Germanis,
 Vveidt: Hispanis, Pastel: Gallis, Guede, seu
 Pastel.

Locus.

Seritur in
 Gallia Narbo-
 nensi, magno
 prouentu: &
 in Germania
 ad Erdfor-
 diam.

Qualitates.

Isatis sati-
 ua, qua vtun-
 tur tinctorum,
 facultatis est
 valenter exic-
 cantis, non-
 dum tamen
 mordentis: est
 enim simul a-
 mara atque
 adstringens.

Gal. li. 6.
 simp. me-
 dica.



Ex Matthiolo.

Fit ex Isatide Pictorum Indicum.

r 3

Isatis

Ifatis sylvestris: Græcis, ἰσάρις ἀγρία: Gallis
Pastel sauvage, Italis, Guado saluatico: Ger-
manis, Vvaldt vveidt.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in Vinetis propè Tubingam, & in
pluribus Germaniæ locis.

Gale. li. 6.
simpl. me-
dica.

Qualitates.

Ifatis sylvestris manifestè iam acre quid-
dam tum gustu tum actione præfert. Proinde
quàm satina Valentius desiccet, Valentius e-
tiam humidis putredinibus obsistit.

Tele

Telephium, Fabaria, Faba inuerfa, Illecebra, Crassula minor, siue Faba crassa: Græcis, τηλεφίον, ἢ ἀϊσῶον ἀγρίου: Italis, Faba grassa: Gallis, Reprise, Ioubarbe des vignes, Feuespeffe, siue Chicotrin.



tenso, aut certe principio tertij.

Ex Matthiolo.

Istas qualitates non reperies in nostrate Fabaria, & si notis omnibus ad Telephij historiam accedat.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 2.
cultis, & maxime inter vi-
tes. cap. vlt.

Qualitates.

Telephium Gal. li. 8.
exiccandi & simpl. me-
dica.
detergendi facultate est, non
tamen insigniter calida, & e-
runt in hoc forsan quissiam
ipsum primi esse ordinis cen-
seat. Desiccat tamen secun-
do ordine in-

Agaricum, Latinis, & Græcis, Arabibus
verò, Garichum, seu Garicum: Italis, Agarico:
Germanis, Dannen schvvan: Hispanis,
Agarico: Gallis, Agaric.

Dios. li. 3.
cap. 1.

Gal. li. 6.
sim. mc.



Locus.

Nascitur in
arborum can-
dicibus, qua-
dam putredine.

Ex Matthio-
lo.

Gignitur in
Laricum can-
dicibus.

Qualitates:
Primo gustu
dulce, sed pau-
lo post subama-
rum apparet
& acrimonia
quandam spe-
ciem temporis

spatio inducit, leniculaq; adstrictionis. Est ei
consistentia laxa. Constat ergo ex substantia
aërea, & terrea à caliditate extenuata: mi-
nimùmque habet substantia aquea. Hac ra-
tione digerendi, & calfaciendi vim habet, &
crassitudinem incidendi, tum in farctus visce-
rum expurgandi.

Gentia

Gentiana: Græcis, γέντιανή: Arabibus, Gentiana, Genthiana Basilica, siue Basateca: Italis, Gentiana: Germanis, Entzian, Bitter vvutz, siue Creutz vvurtz: Hispanis, Gentiana: Gallis, Gentienne.

Locus.

Dios. li. 3.
cap. 3.

Nascitur in
sublimibus
montium in-
gis, Umbrosis
locis, aquo-
sisque.

Qualitates.

Radix Val Gal. li. 6.
de efficax est, sim. mc.
ubi extenua-
tione, purga-
tione, abster-
sione, obstru-
ctionis libera-
tione opus sit.
Nec mirum,
cùm impense
sit amara.




Ex Auicenna.

Excalfacit ordine tertio, siccâtque secundo.

κ ς

Cruciata

Cruciata, siue Gentiana minor:
Italica, Pettinborfa.



Locus ex Matthiolo.

In incultis præcipuè locis nascitur.

Qualitates ex eodem.

*Eadem præstat quæ Gentiana. Radix pol-
let contra Venenatorum ietus, & pestilentia.*

Aristo

Aristolochia rotunda: Græcis, ἀρίστολοχα:
Arabibus, Zaraund, Masimocra, siue Zara-
ued: Officinis, Aristologia: Italis, Aristolo-
chia: Germanis, Oster lutei: Hispanis, Astro-
nomia: Gallis, Sarrazine ronde, siue Aristo-
logie ronde.

Locus ex Plinio. *Pli. li. 25. cap. 8.*

*Pinguibus lo-
cis & cāpestri-
bus gaudet.*

Ex Matthio-
lo.

*Plurima na-
scitur in agro
Goritiensi,
quanquam
non ubique
proveniat.*

Qualitates.

*Radix ama-
ra est & sub-
acris. Rotun-
da ad omnia
est efficacior.*

*Gale. li. 6.
simp. me-
dica.*

*Quæ Clemati-
tes appellatur, fragrantior est, & ad sana-
tiones infirmior. Rotunda crassos humores ex-
ternuat.*

Ex Fuchfio.

*Ex amaritudine & acrimonia quam possi-
dent, censentur calida & sicca in secundo ordi-
ne intenso, vel etiā in tertio inchoante. Ari*



Aristolochia longa, seu, Pistolochia Plin. libr. nij: Gallis, Foterle, Rattelou, siue Sarrazine longue: Italis, Aristolochia longa: Germanis, Hol vvurtz.

Locus ex Plinio.

Nascitur in pinguibus locis, & Campesribus.

Ex Fuchio.

Inuenitur ubiq; ferè, maxime in vineis, & scrobium marginibus.

Qualitates.

Minus tenuitatis obtinet quam rotunda. Abstergendi atque excalfaciendi potentiam possidet: minus tamen abstergit ac digerit quam rotunda: sed non minus calefacit, imò etiam plus, modicèque abstergit. Vide historiam Aristolochia rotunda.

Dulcis

suprà co.

Gale. li. 6.
simp. me.



Dulcis radix, siue, Liquiritia: Græcis, γλυκύριζα: Arabibus, Sus: Italis, Regolitia: Germanis, Leckritz, siue, Sueszholtz: Hispanis, Regaliza: Gallis, Reclisse, Erculisse, seu Reygallisse.

Locus ex Matthiolo.

Abundat hac Apulia, præsertim Gargano monte. Vixitur etiamnum in viridariis ad spectaculū, & ad medicinam sata.

Qualitates.

Natura eius Gal. li. 6. familiaris est simpl. medica. temperatura nostra, Temperamentum enim, quantum ex caliditate

& adstrictione est, tepidum est potius quam temperatum. Caterum modice est humidum, & humana natura frigidius.

Centau.



Centaurium maius, siue, Officinarum
Reuponticum: Græcis, *νεῖλαυρον μέγα*: Ara-
bibus, Chanturion, Kibir, Sacurion habre,
siue Canthurium.

Locus.

Dio. li. 3.
cap. 6.



Amat so-
lum pingue et
apricum, ac
syluas & col-
les.

Ex Matthio-
lo.

Numerosum
nascitur in
Gargano A-
pulie monte,
& in monte
Baldo in agro
Veronensi, ad
lacum Bena-
cum.

Qualitates.

Gal. lib. 7.
simpl. me-
dica.

Radix sicut
gustu contrarias qualitates, ita in usu contra-
rios effectus demonstrat. Gustu itaque acris
simul adstringensque apparet, cum lenicula
quadam dulcedine. In actionibus, acrimonia
quidem caliditatis, adstrictio verò crassæ, ter-
renaque frigiditatis opera demonstrat. Suc-
cus eadem que radix efficit.

Cen

Centaurium minus, Fel terræ, siue Febri
fuga : Græcis, *κενταύριον μινόν* : Arabibus,
Chanturion sege, & Segir, seu, Katarion sa-
ges: Italis, Centaurea minore : Germanis,
Tausent gulden Kraut, Fieber Kraut, Erdt
gall, seu, Biber, Kraut: Hispanis, Fel de tier-
ra : Gallis, Repeyret, Fiel de terre, Cen-
taurée, siue, Chante poulet.

Locus.

Rigua amat Diof. li. 3.
loca. cap. 7.

Ex Apuleio.

*Firmum so-
lum amat.*

Qualitates.

Radix inef- Gale. li. 7.
ficax est. In fo- simp. me.

*lis & floribus
vincit quali-
tas amara, pau-
lulum habens
adstrictionis.*

*Atque ob eiuſ-
modi tempera-
mentum admo-
dum desiccato-
rium est medi-*

*camentum, expers mordacitatis. Succus ea-
rum abstergit & desiccatur.*

Chamæ



Chamæleon albus, Ixia, Carduus Suarius, aut Varius, siue Cardopatium: Græcis, χαμαιλέον λονός: Arabibus, Chemeleon leute, siue, Chamalium: Italis, Carlina: Germanis, Vveisz eber vvurtz: Hispanis, Cardo pinto: Gallis, Carline, siue, Chamæleon blanc.

Locus ex Fuchfio.

Dios li. 3.
cap. 8.



*Nascitur in
siccoribus mō
tium & Col-
lium locis, &
minus herbi-
dis.*

*Qualitates
ex eodem.*

*Radix cal
facit secundo
ordine, & de-
siccatur tertio.*

Chamæ

Chameleon niger, Carduus niger, aut
verniligium: Græcis, χαμαιλέον μέλας: Ara-
bibus, Chameleon Melamos: Italis, Ca-
meleone nero, Germanis, Schvvartz eber
vvurtz: Hispanis, Cardo pinto: Gallis,
Chardonnette.

Locus.

Prouenit in Diof. li. 3.
Campeſtribus cap. 9.
ſiccis, & clino
ſis tractibus,
& mariti-
mis.

Ex Theo-
phraſto.

Loca gelida
humidaque
amat. Theo. de
nat. plâr.
li. 9. c. 13.

Qualitates,
ex Fuchſio.

Radix de-
ſiccatur tertio reſeſſu. & excaľfacit in fine ſe-
cundi.

3 Dipſa



Dipsacus, Labrum Veneris, Carduus Veneris, Virga Pastoris maior, siue, Cardo Fullonum: Græcis, Δίψανθ: Arabibus, Dipsacos: Italis, Cardo da cardare, siue Garzo: Germanis, Karten distel, Garden kraut, Burbenstrel, seu Vveber karten: Hispanis, Cardencha, seu Cardo penteador: Gallis, Chardon à carder.

Locus ex Matthiolo.



Gal. li. 6.
simp. me.

Seritur singulari diligentia. Sponte etiam nascitur in campestribus, agrorum & scrobium aggeribus & in viis iuxta sepes.

Qualitates.

Radix secundum ordinem exiccatoria est habetque non nihil abstersorium.

Virga

Virga Pastoris minor.



Locus ex Matthiolo.

Isdem ferè locis nascitur quibus Dipsacus.

Qualitates.

Huc refer omnem Dipsaci historiam.

S. 2

Spi

Spina alba: Græcis, ἄκανθα λευκή: Arabibus & Officinis, Bedeguar: Italis, Spina bianca: Germanis, Vveisz Gatten Disteln: Gallis, Espine blanche.



Locus.

Dios. li. 3.
cap. 12.

Nascitur in montibus, & syluosis.

Ex Matthiolo.

Seritur in hortis.

Qualitates.

Gal. li. 6.
simpl. me
dica.

Radix desiccatoria est, & modicè adstringens. Semen tenuis essentia, & calida facultatis est.

Acan

Acanthus, Acantha, Pæderota, Marmora-
raria, siue, Branca vrsina: Græcis, ἀνάβλητον:
Italīs, Branca Orsina: Germanis, Beren-
klavv: Hispanis, Yerua giguante, siue, Bran-
qua vrsina: Gallis, Branque vrsine.



Locus.

Nascitur in hortis, petrosīs, & riguis,

Qualitates.

Folia mediocriter digerentem facultatem
obtinēt: at radix exiccatoria est, & leuiter
incisoria, & tenuium partium.

Diosc. li. 3.

cap. 17.

Gale. li. 6.

simpl. me-

dica.

s 3

Ano

Anonis, Ononis, Remora aratri, Acutella, siue, Resta Bouis: Græcis, ἀώνις, ἢ, ὀώνις: Italis, Bonaga: Germanis. Havvhechel, siue, Stallkraut: Hispanis, Gatillos, siue, Gathinos: Gallis, Arreste beuf, Bugraues, seu Bugrundes.

Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in pratis, cultis, & incultis locis, arido præsertim solo.

Qualitates.

Radix tertio quadante nus ordine ex calfacit. Cortex eius habet quidpiam abstersorium, & incisorium.

Gal. li. 8.
sim. mc.



Alba

Alba spina, siue, Lactaria: Græcis, λουκά-
ναβα: Italis, Cardo di sancta Maria: Germa-
nis, Marien Distel: Gallis, Chardon nostre
Dame.



Locus, ex Matthiolo.

In Aruis, & campestri planicie nascitur.

Qualitates.

Radix amara est: proinde incidit & exic-
cat tertio ordine: in calfaciendo autem ex pri-
mo est ordine.

Gal. li. 7.
sim. me.

s 4 Trag

Tragacantha, Latinis & Græcis: Arabibus, Chitira, Itica, Chatheth, Alcuted, seu, Alchathad: Italis, Draganta: Germanis, Dragant: Hispanis, Alquetira: Gallis, Draganta.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur in Gargano Monte Apulia.

Qualitates.

Gal. li. 8. *Tragacantha similem gummi vim obtinet,*
 sim. mc. *emplasticam quādam, & acrimoniam hebe-*
tiozem (legunt aliqui, quæ acrimoniam ob-
tundit) & sanè similiter illi deficcet.

Eryng

Eryngium, Erynge Plinio: quibusdam,
Centum capita: Græcis, ἑρύνγιον: Officinis,
Iringus: Italis, Eringio, seu, Iringo: Germa-
nis, Brachen distel, siue, Manstrevv: Hispa-
nis, Cardo corredor: Gallis, Panicault, seu,
Eryngium.



Locus. Dioscor.
Nascitur in lib. 3. cap.
asperis, et cam 21.
pestribus.

Qualitates. Gal. li. 6.
Eryngium sim. me.
caliditate qui-
dem aut pa-
rum, aut nihil
qua tempera-
ta sunt supe-
rat. Siccitatē
Verò in tenui
essentia consi-
stentem, non
parvam obti-
net.

s s Eryin

Eryngium Marinum, falso Crocodilium
dictum.



Pli. li. 22.
cap. 7.

Locus ex Plinio.


Nascitur in littoribus maris.

Qualitates ex eodem.

*Valet aduersus Venenata: catera Eryngio
simile.*

Aloë

Aloë Latinis, & Græcis: Arabibus, Saber,
Paber, seu, Sabar: Italis, Aloë: Germanis,
Alepatie, siue, Bitter Aloës: Hispanis, Yer-
ba sua babosa: Gallis, Aloës, Parroquet, seu,
Ioubarbe de Mer.



Locus. Dio. li. 3.
Plurima in cap. 22.

India gigni-
tur. Nascitur
etiā in Asia
& Arabia in
locis quibusdā
maritimis, &
in insulis.

Ex Matthiol.

Fouetur ad
spectaculū in
fictilibus va-
sis.

Qualitates.

Multiplicis Gale. li. 6.
est natura: ad simp. mc.

stringit enim

mediocriter gustu, sed vehementer amara est.

Succus eius desiccatur absque mordicatione.

Tertij est ergo ordinis exsiccantium: calfacien-
tium autem primi intensi, aut secūdo exoluti.

Opun

Opuntia Plinii, seu, Ficus Indica.



li. 21, c. 17.

Locus, ex Plinio.

*Huius folio tantum plātato radices sunt:
foveturq; ad spectaculum figulinis.*

Qualitates ex eodem.

Homini dulcis.

Absin

Abfinthiū, Latinis, & Græcis: Arabibus,
Affinithiū: Italis, Affenzo: Germanis, Vver-
muot, aut, Eltz: Hispanis, Asentios, siue,
Alofna: Gallis, Aluyne, Fort, seu, Absynce.

Locus ex Apuleio. Dios. li. 3.
Non solum cap. 23.

cultis gaudet:
sed & Mon-
tibus, & locis
saxosis.

Qualitates.

Gal. li. 6.
sim. me.

Adstricto-
riam, amarā,
& acrem si-
mul qualita-
tem possidet,
excalfaciēs pa-
riter et exter-
gens, roborās,
& desiccans,
Magis tamen
calfacit quā
refrigeret, pro-

pter acrimoniam: Et sit calidum primo ex-
cessu, & siccum tertio. Succus herba ipsa cali-
dior est.

Abfin

Abſinthium marinum, ſive, Seriphium
Italſ, Affenzo marino: Gallis, Petit Fort.



Locus ex Matthiolo.

Frequentiffimum eſt in Maris Littoribus

Gal. li. 8.
ſum. me.

Qualitates.

Specie & guſtu Abſynthio ſimile eſt: igitur qualitates ipſius conijcito.

Abro

Abrotonum mas: Græcis, ἀβρότονος: Arabibus, Catsum, Kesum, siue, Gaissum: Italis, Abrotano, seu Veronica: Germanis, Stabvvertz, Scheszvvertz, seu, Gert vvurtz: Hispanis, Abrotano, & Hyerua Lombrigue: Gallis, Auronne, seu, Brotonne.

Locus ex Matthiolo.

Seritur, & sponte nascitur in campis.

Qualitates. Gale. li. 6. Calidum & sim. inc.

siccum facultate in tertio ordine, post media, situm est: Itaq, nō instrenuē calfacit, et desiccāt, imō etiā ulcerat.

Digerendi et incidendi vim etiam quandam habet, et refaciendi, &

mordendi: tenuium enim est partium.

Abro



Abrotonum foemina: Italis, Cipresso, si-
ue, Santolina. Germanis, Garten Cypresz:
Gallis, Cyprés, siue, Garderobbe.



Locus ex Fuchfio.

*Pingue solum & lentum amat: Seritur
etiam in hortis.*

Qualitates ex Fuchfio.

*Ex gustu acri, amaro, & aliquatenus acer-
bo coniicitur desiccare absq; calore manifesto.*

Cetera Abrotano Masculo simile.

Hissop

Hissopum, seu Hissopus Latinis, & Græ-
cis: Arabibus, Cyfe, Infa, siue Iabes: Italis,
Ysopo: Germanis, Firch, Hyssop, seu oster
Hissop: Hispanis, Hisopo Yerua, seu Hissop-
pillo yerua: Gallis, Ysope.

Locus.

Montanum Dio. lib. 3.
est, & horten cap. 25.
se.

Qualitates.

Desiccat & Gale. li. 8.
excalfacit or- simpl. me
dine tertio: sed dica.
& tenuium
est partiam.

Ex Mesue.

Facit ad pi-
tuitosos tum-
cerebri, tum
neruorum affe-

ctus, pituitam enim manifesto experimento
purgat.

Gra



Gratiola, siue Gratia Dei: Foroiulien-
sibus, Stanca Cauallo.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in locis humidis, præcipuè in pra-
tis Siginosis: prouenitque in Palustribus.*

Qualitates ex eodem.

*Vulneraria est, amarissima gustu, & qua-
damtenus astringens. Bilem pituitamque
tam sicca, quàm recens, abundè trahit, & al-
uum Vehementer purgat.*

Stæcas

Stœcas: Græcis, *στεινὰς*: Arabibus, Astocodos, Astuhorados, seu Astuchudes: Officinis, Sticados Arabica: Italis, Stecade: Germanis, Sticas Kraut: Hispanis, Cantuesflo: Gallis, Stecados.

Locus.



Nascitur in-
sta Galliam,
in Insulis eius-
dem nominis
è regione Mas-
silia.

Dios. li. 3.
cap. 27.

Ex Matthio-
lo.

Arabia ger-
mana est: &
ex Alexan-
dria Aegypti
comportatur
Venetias. Na-
scitur etiam
in Gargano
Apulia Môte.

Qualitates.

Gustu amara est, & mediocriter subad-
stringens. Constat autem essentia terrena fri-
gida exigua, unde adstringit: & ex attenu-
ta altera copiosiore, à qua utique amara est.
Caterum obstructions expedit.

Gale. li. 8.
simp. me-
dica.

t 2

Origa

Origanum Heracleoticum, siue Cunila:
Græcis, ὀρίαν & Arabibus, Fandenegi, Fu-
denegi, siue Faudenegi.



Locus ex Matthiolo.

Exoticum est, & Crætenſibus germanum.

Qualitates.

Gal. li. 8. Origani Heracleotica efficacior est Oniti
simp. me de: sed agrestis Valentior & traque est. Omnes
dica. Vero incidendi, extenuandi, calfaciendique fa-
cultatem possident, hasque tertio excessu ob-
tinent.

Origa

Origanum Onitis.



Locus ex Matthiolo.

Exoticum est, & Cretensibus familiare.

Qualitates.

Huc refer omnem Heracleotici Origani historiam.

Origanum sylvestre, siue Origanum Offi-
cinarum: Italis, Origano: Germanis, Vvol-
gemuot, Rottkosten, siue Costentz: Hispa-
nis, Oreganos: Gallis, Mariolaine d'Angle-
terre, seu, Origan.



Locus ex Matthiolo.

*Sponte nascitur in Campestribus, asperis,
clinosisque locis, & Montibus: sed & gaudet
sepibus, & dumetis.*

Qualitates ex Galeno.

*Huc refer omnem Heracleotici Origani
historiam.*

Trago

Tragoriganum: Gallis, Grosse Mariolaine
bastarde.



Locus ex Matthiolo.

*Nasitur frequens in Agro Foroiulensi.
Sed & hodie visitur in hortis.*

Qualitates.

*Tragoriganum assumpsit adstrictionis quid
piam: cetera à Origano simile.*

Gal. li. 8.
simpl. me
dica.

t 4 Pule

Pulegium: Græcis *καίχωρ*: Arabibus, Alnam, Alnegen, seu Aluegen: Italis, Pulegio: Germanis, Poley, siue Hertz poley: Hispanis, Poleyo: Gallis, Pouliot, seu Pillölet.



Locus ex Fuchſio, & Matthiolo.


Nascitur in cultis, & aquosis: foueturque in hortis, & fœtilibus.

Qualitates.

*Gale. li. 6. Acre & subamarum est: itaque Valde tum
simp. me. calfacit, tum extenuat. Rubrificat quoque, et
Ulcerat: & humida, crassa, & lenta ex Thora
ce euocat.*

Dictam

Dictamnium: Græcis, *Διάνθιον*: Arabibus,
Mescatremefir, Alnegem Araba, siue Bary:
Germanis, Diptam, seu Vvilden poley: Hi-
spanis, Dittamo real: Italis, Dittamo: Gallis,
Diptam.



Locus.

Proprium est Creta Insula. & rara admo-
dum herba est: amatque solum asperum.

Qualitates.


Dictamnium tenuiore essentia constat, quàm
Pulegium: ceterà illi simile.

Theoph.
de natu.
plât. li. 9.
cap. 26.
Gal. li. 6.
sim. me.

t 5

Pseudo

HISTORIA
Pseudo Dictamnus.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in quibusdam Hetruria montibus

Qualitates.

Gal., li. 6. *Pseudo Dictamnus ad omnia imbecillitas*
sim. me. *Dictamno est.*

Salvia

Salvia maior, siue Salvia Mascula, & hor-
 tensis, Theophrasto, Sphacelus: Græcis, Theo. de
 ἐλελίσφακος: Arabibus, Aelisfacos, seu, Elis- na. plan.
 phacos: Italis, Salvia maggiore: Germanis, li. 6. ca. 2.
 Grofz salbey: Hispanis, Salvia, siue, Salua:
 Gallis, Grosse Sauge.

Locus, ex Matthiolo.



In Campe- Diof. li. 3.
 stribus, aspe- cap. 34.
 ris, incultis, &
 montibus pro-
 uenit: sed &
 cicuratur in
 hortis.

Qualitates.

Temperamen Gal. lib. 6.
 to est euiden- simp. me.
 ter excalfa-
 ciente, & le-
 niter adstrin-
 gente.

Salvia

Salvia minor, siue, Salvia Fœmina, au
agrestis: Gallis, Petite Sauge.



Locus ex Matthiolo.

*Asperis & saxosis gaudet: sed & seritur
in hortis.*

Qualitates.

*Habita proportionem syluestrium ad satinas,
similis est salvia mascula.*

Mentha:

Mentha: Græcis, *ἄνθος*: Arabibus, *Nahanaha*: Italis. Menta: Germanis, *Muntz*: Hispanis, *Yerua buena* & *ortelana*: Gal-
lis, *Mente*.

Locus ex Fuchſio.



Seritur ubi-
que in hortis.
Fimum odit,
& insolato lo-
co gaudet,
quanquā ma-
gis fructicet in
humido.

Qualitates.

Gustu acris, Gal. li. 6.
& facultate simp. me.
calida est, ex
tertio ordine
calfacietium:
obq; eam, qua
ex cultu acce-
dit humidita

tem, mediocriter ad Venerem excitat. Desic-
cat secundo ordine.

Mentha

Mentha altera, nil differt à priore: pro-
inde ex illa, sumito de hac iudicium.



Menthastrum

Menthastrum, siue, Mentha syluestris,
quibusdam, Minthe non odorata.



Locus ex Fuchfio.

Letis gaudet & rignis.

Qualitates.

Acrior est & magis calida quam Mentha, Gale. li. 6.
& magis desiccatur. Habet etiam quiddam a simp. me.
narum in se, & acerbum. Substantia est te-
nuum partium, si qua alia est herba.

Mentha

Mentha Græca, Menta Matronalis, Salvia
 uia Romana, Herba Diuæ Mariæ, siue Lassa-
 fulata: Germanis, Unser fravven Muntz
 Gallis, Mente Nostre Dame, ou Coq.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
 hortis, estque
 Embemmatiss
 familiaris.

Qualitates,
 ex Matthiolo.



Succus epo-
 tus lumbricos
 necat, frigida
 utero subuenit
 Ventriculūmq;
 roborat, tam
 haustus, quā
 illius, & vo-
 mitiones com-
 pescit. Herba
 infarctus expe-
 dit, & capiti robur addit, Venenisque ser-
 pentium resistit.

Calamintha

Calamintha montana: Græcis, *καλαμίνδα*:
Arabibus, & Officinis, Calamentum.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in Dio. libr.
excelsis mon- 3. cap. 36.
tibus.

Qualitates.

Essentia est
tenuis, & cali- Gale. li. 7.
da siccaq; tem- simpl. me-
perie, ex tertio dica.
quodammodo
ordine & traq;
qualitate. Gu-
stu acris & pa-
lām calida est
ac paulū o-
mnino suba-
mari habet.

Imposita & al-
de excalfacit,
& mordicat,

Ulcera tque cutem. Intus assumpta, calfacit,
& sudore s ciet. Ad Venenata etiam prodest:
inciditque propter tenuitatem eius, calorem,
& amaritudinem: & abstergit propter so-
lam amaritudinem. Montana adhuc omnia
efficacior est reliquis.

Cala

Calamintha altera, seu Nepeta: Officinis, Calamentum communis vsus: Italis, Calamento, seu Nipotella: Germanis, Vvild poley: Hispanis, la Neuada: Gallis, Calament commun, seu Pouliot sauuage.



Locus.

Diosc. l. 3. *Nascitur in campestribus, asperis, & aquosis.*
cap. 36.

Qualitates.

Huc refer omnem Calamenti montani historiam.

Cala

Calamintha tertia, Mentha-
stri species.



Locus.

*Nascitur in campestribus, asperis, praefer-
timque in locis aquosis.*

Diosc. l. 3.
cap. 36.

Qualitates.

*Ad omnia inefficacior est montana: cetera
illi similis.*

V 2

Herba

Herba Cattorum: Italis, Gattaria, seu,
Herba Gatta: Gallis, Herbe du Chat.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in aquosis.

Qualitares.

*Ad Apiastrum potius accedit, quàm ad
Pulegium, vel Calamentum.*

Thymum

Thymum, Thymus, siue, Serpillum Romanum: Græcis, *θύμος*: Arabibus, *Hasce*: Italis, *Thymo*: Germanis, *Romischer quendel*, seu, *Vvelscher quendel*: Hispanis, *Tomillo falsero*: Gallis, *Thym*, *primme Mariolaine*, siue *Mariolaine de Languedoc*.



Locus.

Gracili solo, & petroso provenit.

Qualitates.

*Incidit, & calfacit manifeste: estq; in calfa-
ciendo & siccando in tertio ordine situm.*

Diosc. li. 3.

cap. 37.

Gale. li. 6.

sim. me.

V 3

Sa

Satureia, Thymbra, siue, Cunila: Græci
 Δύμβρα: Arabibus, Sahater, seu, Shatar: Itali
 Tymbra, Coniella, Sauoreggia, seu, Peus
 xella: Germanis, Kunel, Zvvibel yfop, seu
 Saturey: Hispanis, Segurella: Gallis, Sau
 rée, & Sarriette.

Dios. li. 3.
 cap. 38.



Aegl. li. 7.

Locus.

Gignitur in
 asperis locis, et
 tenui solo: ga
 det etiam sa
 bulosis, feri
 turque in hor
 tis.

Qualitates.

ex Aegineta.
 Sylvestris ea
 dem qua Thy
 mum prastat.
 hortensis au
 tē imbecillior
 est, sed ad ci
 borū & sum ac
 commodatior.

Ex Fuchsio.

Calfacit & desiccatur excessu tertio.

Serp

Serpyllum: Græcis, ἑρπυλλον: Arabibus,
Hemen: Italis, Serpillo: Germanis, Quédch,
seu, Hueuer Koël: Hispanis, Serpollio, seu,
Serpam: Gallis, Serpollet.

Locus, ex Matthiolo. Diof. li. 3.

Nascitur in cap. 39.

petris, locisq;
cliuosis. Ser-
tur tamen in
hortis magna
diligētia: ema-
cratumq; &
tenue solum
amat, modò
siccum sit, &
insolatum.

Qualitates.

Vsq; adeo Gal. li. 6.
exca facit, & sim. mc.
& menses, &
vrinas mo-

ueat. Est autem & gustu admodum acre.

v 4 Samp



Sampsuchū, Amaracus, Mariū, seu, Maiorana: Græcis σάμψυχον: Arabibus, Merzenius, seu, Morsangius: Italis, Maiorana, & Persa. Germanis, Meyeron, Maiorana, & Meyram. Hispanis, Maiorana: Gallis, petite Mario-laine.

Locus ex Matthiolo.

Seritur & fouetur diligenti cultura, & ombrosisque gaudet.

Qualitates.

Tenuiū est partium, & digerentis facultatis: desiccatur enim & excafcit ordine tertio.

Gal. lib. 3.
sim. me.



Bacch

Baccharis, Latinis, & Græcis.



Locus.

Aperum squalidumq; solum amat.

Ex Matthiolo.

Nascitur in Romano agro.

Qualitates ex Paulo.

Odore Cinnamomo proxima, coronaria, acris. Decoctum eius meatus aperit: folia autem adstringunt.

Dio. li. 3.
cap. 44.

Aegin. li.
bro 7.

v s Ruta

Ruta: Græcis, *ῥύγανος*: Arabibus, Sadeb, seu, Sedab: Italis, Ruta: Germanis, Raut, seu, Vvein raut: Hispanis, Arruda: Gallis, Rue.

Pli. li. 19.
cap. 8.



Gal. li. 8.
simpl. me
dica.

autem non solum gustu acri, sed & amaro: ex quo etiam digerere ac incidere crassos lentosque humores potest. Tenuium est partium, flatusque extinguit. Valenter digerit & desiccatur.

Locus.

Seritur Favonio, & ab æquinoctio Autūni. Odit hyemē, humorem, ac simū. Apricis gaudet & siccis, terraque maxime lateritia, & cinere, & sub Fici ſombra libentiſſime acquieſcit.

Qualitates.

Calfacit tertio ordine. Est

Par

Panaces Herculeum, siue, Heracleum:
Græcis, *πανάκης ἡράκλειου*: Arabibus, Steu-
cir, Ieusir, seu, Giausir.



Locus. Dioscor. li. 3.
Plurimum cap. 48.

in Bæotia &
in Phocide Ar-
cadia nasci-
tur: ibiq; com-
pedit gratia,
& quæstus
qui ex Opopa-
nace prouenit,
studiosè colit-
tur.

Ex Matthio-
lo.

In Apulia
frequens na-
scitur, & in
Apennini iu-

gis, & Promōtorio Argentario: studiosè item
colitur in hortis.

Qualitates.

Succus seu liquor eius excoquit, emollit, Gal. li. 8.
& digerit: calfacitq; tertio recessu, & desic- sim. me.
cat secundo. Cortex radicis minus exsiccatur &
excoquit quàm succus: quiddam tamen ab-
sterforium obtinet. Fructus calidus est.

Pana

Panaces Asclepium, Latinis, & Græcis
Arabibus verò Panax Aschilibet.



Pli. li. 25.
cap. 4.

Locus.

Iuxta Lacus & Amnes inuenitur.

Qualitates.

Gale. li. 8.
sim. mc.

*Minus est calidum Heraclio: quamobrem
eo, & floribus eius, & semine Melli mistis, ad
Ulceras, phymata, & phagedanas vtuntur.*

Ligust

Ligusticum, seu Libyficum: Græcis, α-
 γύσινον.



Locus.

Cignitur in altissimis asperisq³ montibus,
 ac Umbrosis, maximè iuxta fluentia.

Dio. li. 3.
 cap. 31.

Qualitates.

Radix & semen ex genere excalfacientiu
 sunt: adeò ut menses creant, & Urinas promo-
 cent, flatusq³ discutiant.

Gal. li. 8.
 sim. nic.

Pastin

Pastinaca sativa : Græcis, *σαφνλivos ημερος* : Arabibus, Iezar, Gezar, seu Giezar : Italis, Pastinaca : Germanis, Pasteney, seu, Pastinachen : Hispanis, Conaoria blanqua : Gallis, Pastenailles, Panais, seu Pastenades.

Locus ex Matthiolo.

Seritur in hortis, in ciborum & sum.

Qualitates.

Pastinaca sativa imbecillior : agrestis ad omnia potentior est.

Vrinā ac menses mouet cum herba quidem tota, tum maxime semē ac radix. Habet porro in se ab-

sterforium quidpiam.

Pastinaca

Gal. li. 8.
sim. me.



Pastinaca sylvestris: Gallis, Panais sauua-
ge: Germanis, Vvild Moren.



Locus ex Matthiolo.

In campis ac incultis sponte nascitur.

Qualitates.

*Huc refer historiam Pastinacae sativae: Ca- Gal. li. 8.
terū parum vel nihil differt à viribus Dauci. simp. mc.
Caro*

Carotæ Italis: Germanis, Moren: Gallis,
Carrottes, seu, Pastenades.



Locus ex Matthiolo,

Seruntur in hortis, in acetariarum & sum.

Qualitates.

Accedunt ad Dauci naturam.

Seseli

Seseli Massiliense: Græcis, σίσελι: Arabi-
bus, Sisalios: Officinis, Siler montanū, seu
Sisileos: Germanis, Steinbrech: Italis, Sese-
li: Gallis, Ser montain.

Locus.



Nascitur in Diof. li. 3.
asperis, riguis cap. 53.

Et collibus. In
uenitur etiā-
num in Insu-
lis.

Ex Matthio-
lo.

In omnibus
ferè montibus
legitur.

Ex Fuchfio.
Seritur, Et lo-
ca amat cali-
da.

Qualitates. Gale. li. 8
Radix et se-
men valde ex-
simp. mac.

calfaciunt, tenuiūque sunt partium.

Ex Fuchfio.

Calidum est Et siccum in secundo ordine.

x

Sese

Seseli Aethiopicum.



Locus.

Dio. li. 3. *Nascitur in asperis, rignis, & collibus. Inue-*
 rap. 153. *nitur etiamnum in Insulis.*

Qualitates ex Dioscoride.

Semen acrius & odoratius Massiliensica-
tera illi simile.

Ex Fuchfio.

Fuchsius censet Siler montanum Officina-
rum esse Seseli Aethiopicum.

Seseli

Seseli Peloponenfe: Gallis,
Seseli de la Moree.



Locus.

*Nascitur in asperis, riguis, & collibus,
inueniturque in Insulis.*

Dioscor. l. 3.
cap. 53.

Qualitates.

Huc refer Massiliensis historiam.

x 2

Ani

Anisum, Latinis, & Græcis: Arabibus autem Aneisum, seu Anexissum: Italis, Aniso: Germanis, Anisz, seu Enisz: Hispanis, Matahalua, seu Yerua dulce: Gallis, Anis.

Locus ex Fuchfio.

Gak. li. 6.
simpl. me-
dica.



*Ex Syria
translatum
est in hortos.*

Qualitates.

*Anisi semen
acre est et sub
amarum, ac-
ceditque pro-
pè ad Vren-
tium calidita-
tem. Est au-
tem in siccan-
do tertij ordi-
nis, sicut &
in calfacien-
do. Vrinam
ciet, & dige-
rit, atque e-
tiam Ventris inflationes sedat.*

Carum

Carum: Græcis, καρί: Arabibus, Caruia,
Karauia, seu Karui: Officinis, Carui: Italis,
Caro: Germanis, Matkumich, seu Kim: Hi-
spanis, Alcarauea: Gallis, Carui, seu, Cheru.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in
Pratis & Col-
libus Oligino-
sis.

Qualitates.
Carum est cal-
facit & exic- Gale. li. 7.
cat tertio quo- simpl. me-
dammodo or- dica.
dine, modera-
tè acrem qua-
litatem possi-
dens. Itaque
flatus extin-
guit, & Uri-
nas ciet, non se-
men tantum,
sed & Pläta.


x 3

Anc

Anethum: Græcis, ἀνυθον. Arabibus, Iebet, seu Sebet: Italis, Aneto: Germanis, Dyllen, siue Hoch kraut: Hispanis, Eneldo: Galis, A net.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 6.
simp. me-
dica.



Hortis omnibus, ut Feniculum seritur.

Qualitates.

Excalfacit secundo ordine intenso, aut tertio remisso: exiccat Verò secundo incipiente, aut in fine primi. Oleum Anethinum propinqua temperie est pus mouētibus & cōcoquentibus Medicamētis,

nisi quatenus paulò illis tum calidius tum tenuiorum partium est, ac proinde digerendi facultate pradiatum. Vstum tertij est ordinis tum excalfacientium, tum exiccantium. Viride humidius est & minus quàm siccum concoquit, & digerit.

Cumi

Cuminum sativum: Græcis, *κνίαν* *κνέ-
ρον*: Arabibus, Camum, seu Kemum: Italis,
Cumino domestico: Germanis, Kimmel: Hi-
spanis, Comino: Gallis, Comin.

Locus ex Matthiolo.



Tractu gau-
det calido. &
putrescibili:
quamobrem
frequentissi-
mum in mari-
timis nasci-
tur.

Qualitates.

Cymini semi Gal. li. 7.
ne utimur sim. me.

quemadmo-
dum Anisi,
Ligustici, Ca-
ri, & Petrose-
lini. Est autē
& facultatis
excalfacientis,

sicut illorum & unumquodque: tum Urinam mo-
uentis, & flatum discutientis, ex tertio ordi-
ne calfacientium.

X 4

Cumi

Cuminum sylvestre alterum, siue Conso-
lida regalis: Italis, Consolida regia: Germa-
nis, Ritter sporn: Gallis, Pie d'Alouette, seu
Consolida royalle.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Segetibus.

Qualitates ex Diosc.

Diosc. li. 3. *Venenatorum moribus prodest, & calculo*
2. ca. 60. *su, & ijs qui Urina stillicidio vexantur, aut*
concoctum sanguinem cum lotio reddunt.

Arabi,

Ammi, Latinis, & Græcis: Arabibus vero, Nanchach, Anazne, Nanachua, seu, Nanchue: Officinis, Ammeos: Germanis, Ammey: Italis, Hispanis, & Gallis, Ammi.

Locus ex Fuchſio.



Exoticum
est: Verum ſe-
ſeratur, reſti-
bili fertilita-
te perennat.

Qualitates.

Facultatis eſt Gale. li. 6.
excalfactoria ſimp. me-
dica.

Et deſiccato-
ria, tenuium-
que partium.

Sed Et guſtus
ſubamarum
eſt, Et acre.

Et clarum eſt
quod Et dige-
rat, Et Urinā
moue at. Fue-

rit autem in calefaciendo, deſiccandōque ex
ordine tertio intenſo.

x 5

Corian

Coriandrum: Græcis, κόριανδρον, κορίαννον
Arabibus, Rusbor, Rasbera, Kuzbara, seu
Kuzibara: Italis, Coriandro: Germanis, Co
riander, & Coleander: Hispanis, Culantro,
& Ciliandro: Gallis, Coriandre.

Locus ex Palladio.



Gal. li. 7.
sim. nie.

Latius gaudet
sed & amara
quandoque se
lum tenue. Se
ritur, & spon
te nascitur.

Qualitates.

Ex contrarijs
facultatibus
constat: pluri
mum enim
habet essentia
amara, qua
terrestris est,
& tenuium
partium: nec
parum obtinet
humiditatis

aquea, quae tepentis est facultatis. Habet an
tem & adstrictionis pauxillum.

Auice. li.

Auicenna refutatur Galeno, frigidum esse
2. ca. 144. assuerans Coriandrum.

Hiera

Hieracium mains, seu Sonchitis: Græcis,
ἱεράκιον: Italis, Cicerbita: Germanis, Ha-
 bichskraut: Gallis, Cicoree iaune.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in Pratis, & locis cultis.

Qualitates.

*Vim refrigerandi habet, & modicè
 substringendi.*

Dio. lib. 3.
 cap. 53.

Hiera

Hieracium paruum.



Locus, & Qualitates.

Diosc. li. 3.
cap. 63.*Huc refer omnem historiam Hieracij
maioris.*

Apium

Apium hortense: Græcis, σέλινον κηπόων:
Arabibus, Charfs, Charfi, seu Cares: Ita-
lis, Petrosello: Germanis, Peterfilien, seu,
Peterlin: Hispanis, Perexil: Gallis, Perfil.

Locus ex Matthiolo.



*Omni-
bus hor-
tis frequen-
tissimum, & o-
mnium ole-
rum familia-
rissimum.*

Qualitates.

*Apium & Gal. lib. 2.
que adeo cali- de ali. fa.
dum est, ut & & libr. 8.
Erinas, & mē sim. nic.
ses cieat.*

Ex Fuchfio.

*Calefacit se-
cundo ordine,
& desiccatur in tertio à medii.*

Apium

Apium palustre, Paludapium, siue Eleo-
selinum: Arabes, Asalis: Italis, Apio com-
mune: Germanis, Epffich, seu, Eppich: Hi-
spanis, Apio, seu Perexil dagoa: Gallis,
Ache.



Locus.

Nascitur in humidis.

Diosc. li. 3.
cap. 64.

Qualitates ex eodem.

Satino grandius, & ad eadem efficax.

Hip

Hipposelinum, Leusticum, seu, Olusatrum: Græcis, *ἵπποσέλινον*: Arabibus. Sallis: Italis, Leustico: Germanis, Lieb Stocckel: Gallis, Ache large, Leuesche, seu Liuesche.

Locus.

In Umbrosis & palustribus nascitur, olerum generis ut Apium.

Dios. li. 3. cap. 64.

Qualitates.

Oroselinum, & Hipposelinum similis vis est. Verum Hipposelinum imbecillius est.

Gal. li. 8. simpl. medica.



Ex Fuchfio.

Excalfacit & desiccatur tertio ordine.

Smyr

Smyrnum Latinis, & Græcis: Arabibus
verò Seniruion: Italis, Macerone, seu, Alef-
fandrin: Hispanis, Apio Macedonico: Gal-
lis, Maceron.

Dios. li. 3.
cap. 65.

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.



Locus.

Nascitur in
saxosis, & col-
libus, atque
squalidis, &
limitibus ter-
renis.

Qualitates.

Smyrnum
ex eodem gene-
re cum Apio
est, & Petro-
selino: estque
Apio validius,
Petroselino au-
tem imbecil-
lius. Menses
itaque & Uri-

nas mouet, calidum siccumque tertio ordine.
Sed & digerere qua indurata sunt valet. Re-
liqua vis eius Apio, & Petroselino similis.

Impera

Imperatoria, Astrentia, Ostrution, seu,
Osterition : Italis, Imperatoria : Gallis,
Otruche, Imperatoire, seu, l'herbe du
Benioin, sed falsò : Germanis, Meyster
vvurtz.

Locus ex Matthiolo, & Fuchfio.

Frequentis-
sima nascitur
in mōtibz: ho-
diēque colitur
in hortis ma-
gna diligen-
tia.

Qualitates,
ex Matthiolo.

Radix eius
gustū acris ad-
modum depræ-
henditur, ac
mordax, sub
amara, et odo-
rata. Ex quo
conijcitur ex-
calfacere ter-
tio excessu completo, vel quarto inchoante: sic-
care verò secundo. Discutit item mirificè fla-
tus Ventrīculi intestinorum, & Vteri. In sum-
ma excalfacit omnes corporis partes quas frī-
gus occupavit.



y

Elapho

Elaphoboscum, Cerui ocellus, seu falso
 Gratia Dei : Græcis, ἐλαφόβοσκον : Germa-
 nis, Vveisz hirtz vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in campestribus.

Qualitates.

Cak. li. 6. *Facultatis est calida, & tenuium partium.*
 Simp. me. *ac proinde exiccatoria secundo maxime ex-*
cessuum ordine.

Fœni

Fœniculum : Græcis , *μαράθρον* : Arabi-
bus, Raienigi : Italis, Finocchio : Germa-
nis, Fenckel: Hispanis, Hinoio, seu, Fun-
cho: Gallis, Fenoil.



Locus ex Matthiolo.

Seritur Vere ineunte in locis apricis, &
modicè saxosis.

Qualitates.

Ex tertio est ordine calefacientium, & Gale. li. 7.
primo desiccantium. simpl. me-
dica.

2432

y 2

Dau

Daucum : Græcis , *δαῦνος* : Arabibus ,
 Ducu, Gezar, seu, Ciezar: Italis , Carotte
 saluatiche , seu , Dauco : Germanis , Ber
 vvurtz : Hispanis , Dauco Cretico : Gallis ,
 Carotte sauuage.

Dios. li. 3.
 cap. 69.

Gale. li 6.
 simpl. me
 dica.



Locus.

*Nascitur in
 saxosis, & lo-
 cis sole illustra-
 tis.*

Qualitates.


*Acrem, &
 calefaciendi fa-
 cultatem obti-
 net, ac proin-
 de etiam ex-
 tenuandi. Ra-
 dix flatuosum
 quiddam obti-
 net, & ultra com-
 prehensa, ac
 Venereum. Se-
 men excalfa-
 ciendi vehe-
 menter facul-*

*tatem habet: digeritque per halitum, foris im-
 positum. Herba inferior est semine, ob aquea
 humiditatis misturam, quarequam & ipsa
 calida sit.*

Sena

Sena, seu, Sene: Italis, Sena: Germanis,
Senet: Hispanis, Sen de Alexandria: Gallis,
Sené de Leuant.

Locus ex Matthiolo.



Frigeris est
impatiens: ob
idque seritur
Maio, nec Ul-
tra Autumnu
perdurat.

Qualitates,
ex eodem.

Dilutum e-
ius modestissi-
me, & sine
molestia alui
soluit, sex En-
ciarum ponde-
re potum.

Ex Mesue.

Educit per
inferna bilem

tum atram, tum flauam, sed & pituitam.


Ex Fuchsio.

Desiccatur in primo ordine, & exalfacit se-
cunda incipiente.

Y 3

Colu

Colutea: Germanis, Vvelsch linsen: Gal-
lis, Baguenaudier, aut Sené de païs.



Locus.

Theo. de
nat. plāt.
li. 3. c. 17.

Seritur semine, & sime præcipue Onillo.

Qualitates ex Fuchfio.

Desiccat, Arabibus, primo ordine, & ex-
calfacit secundo incipiente.

Pyre

Pyrethrum, siue, Saliuaris herba, Græcis,
 πύρεθρον, Arabibus, Macharcaraha, seu, Ha-
 charcharha: Italis, Piretro: Germanis, Ber-
 tram: Hispanis, Pelitre: Gallis, Piretre.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in quibusdam Italia montibus.

Qualitates.

Radix causticam & rentemq; facultatem Gal.lib.8.
obtinet. sim.me.

y 4

Rosma

Rosmarinum: Græcis, *λεβανώτις*: Arabibus,
 Xaier almeriem, Alpinalfach, seu, Cachola.



Locus.

Dio. li. 3.
 cap. 72.

Nascitur in saxosis & asperis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
 simp. me.

*Emollientis est, & digerentis facultatis:
 abstergit etiam & quodammodo incidit.*

Rosma

Rosmarinum coronarium, Græcis, λιβανωτός στεφανωμήνη : Arabibus, Elkialgeber: Italis, Rosinarino de gli horti : Germanis, Roszmarin: Hispanis, Romero: Gallis, Rosmarin.

Locus ex Matthiolo.

Seritur passim in hortis, ac Viridarijs.

Qualitates.

Decoctum Gale. li. 7. eius regio morbo prodest, potum: abstergit enim, & incidit. sim. rac.

Ex Fuchσιο

Calidū est & siccū: idq; ex gustu deprehenditur.

y s Spon



Spondylium, seu Sphondylium Latinis
& Græcis, quibusdam, Pastinaca Sylvestris



Locus ex Matthiolo.

Dio. li. 3.
cap. 74.

*Nascitur in palustribus & aquosis: estq;
frequentissimum in Pratis & liginosis.*

Qualitates.

Gal. li. 8.
sim. me.

*Sphondylii fructus acris, & secantis est fa-
cultatis. Radix illius ad eadem pollet.*

Feru

Ferula: Græcis, *νάρβηξ*: Italis, Ferola: Hispanis Cananheia: Gallis, Ferule.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in æstuosis locis: abundatq; Ferulis Apulia. Fructicat & plurimum in Maritimis.

Qualitates.

Semen excalfacit & attenuat. Medulla resins adstrictoria est, & venenisq; resistit.

Gal. li. 3.


sim. mc.

Peuce

Peucedanum, Fœniculum Porcinum, aut
Pinastellum: Græcis, *πουνδάριον* & Arabibus,
Harbatû: Italis Peucedano: Germanis, Har-
strang: Gallis, *Queuë de Porceau*, seu, Peu-
cedane.

Dios. li. 3.
cap. 72.

Gale. li. 8.
Ani. inc.



Locus

Gignitur in
montibus opa-
cis.

Qualitates.

Peucedani
radice quàm
maxime, sed
tamen etiam
succo, & li-
quore utimur.
Sunt autē hac
omnia eiusdē
facultatis: sed
valentior suc-
cus, admodū
excalfaciens,
& digerens.

Olfactu etiā prodest. Incidit & extenuat, te-
nuum enim est partium, & excalfactorium.
Radix valide desiccat: minus tamen calefa-
cit quàm succus. Excalfacit ergo ordine secun-
do iam completo: desiccat vero tertio iam in-
cipiente.

Melan

Melanthium sativum, Nigella, Gith, seu,
Papauer nigrum: Græcis, μελαμβιον: Arabi-
bus, Xamin, Sunis, & Sunizi: Italis, Nigella:
Germanis, Schvvartz roemisch, seu, Sch-
vvartz Coriander: Hispanis, Neguillia, &
Alipiure: Gallis, Barbue, seu Poyurette.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
hortis, & Vi-
ridarijs.

Qualitates. Gal. li. 7.
sim. me.

Melanthiū
excalfacit at-
que desiccāt
tertio ordine.
Videtur etiā
tenuium esse
partium. In-
tus assumptū
flatus extin-
guit: essentia
enim est subti-
lis, & ad ſm-
guem à calidi-
tate elabora-

ta. Amarum etiam est. In summa, & bi inci-
sione, extersione, desiccatione, & excalfactione
est opus, præstantissimum id remedium est.

Mel



Melanchium Sylvestre, Gallis, Barbuës



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in Campestribus: sed & seritur
ad Coronamenta.*

Qualitates.

Huc refer Nigella Historiam.

Pseudo

Pseudo-melanthium, siue Melanthium
falsum : Italis, Gittone : Germanis, Raden:
Gallis, Nielle des blez.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur inter Segetes.

Qualitates ex Fuchsio.

Eisdem facultatibus pollet, quibus Lolium.

Visc

Viscum: Græcis, ἰξός : Arabibus, Dabach
 seu, Dibach: Italis, Vischio: Germanis, Mi-
 stel: Hispanis, Visco: Gallis, Guy.



Locus.

Plin. libr.
 26. ca. vi.

Viuit in Arboribus.

Qualitates.

Gal. li. 6.
 6m. me.

*Viscum ex plurima aërea, & aquea cali-
 da, paucissima terrena substantia constat.
 Nam acrimonia in eo, amaritudinem excel-
 lit. Non excalfacit protinus post primam ap-
 positionem, sed tēpus requirit, Velut Thapsia:
 habetque id commune cum omnibus calidis fa-
 cultate medicamentis, Vbi largum continent
 humorem recrementitium.*

Appa

Aparine, Aspergula, siue Asperula: Græ-
cis, ἀσπρίνη, ἢ, ὠμὰ δένδραρον, καὶ φιλάνθε-
ως: Italis, Speronella: Germanis, Klebkraut,
Hispanis, Prefera: Gallis, Gratteron.

Locus ex Theophrasto.



Nusquam
non provenit:
sed præsertim
inter Lentes.

Qualitates.
Modicè exte Gale. li. 6.
git & de sic. simp. me.
cat, habetque
nonnihil subti-
lium partiū.
Ex Recentio-
rum placitis.
Succuseius &
lenter recen-
t a glutinat
vulnera: facit
que ad Papil-
larum rimas.

z Card

Carduus benedictus, siue Cnicum sylue-
stre alterum: Italis, Cardo santo: Germanis,
Carden benedictem: Gallis, Chardon beny.

Locus ex Matthiolo.



*Nascitur in
montibus: sed
et passim feri-
tur in hortis.*

*Qualitates
ex eodem.*

*Constat ter-
reis partibus
calore quodā
attenuatis.*

*Tam interius
sumptus, quā
adhibitus, va-
let ad pestilen-
tiam, et ad-
uersus venena
lethalia. Deco-
ctis miscetur*

ad luem Gallicam paratis.

Clino

Clinopodium, Latinis, & Græcis.



Locus.

Nascitur in petrosis.

Qualitates.

Dios. li. 3.
cap. 93.


*Excalfaciendi vim obtinet, sed nōdum adu-
rendi. Est Verò essentia tenuium partium: Et
sit in tertio ordine tum excalfacientium, tum
exiccantium.*

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.

Z 2

Clinopo

HISTORIA
Clinopodium alterum.



Locus, Qualitates.

*Huc refer omnem Clinopodij
prioris historiam.*

Leonto

Leontopetalum, Latinis & Græcis.



Locus.

Nascitur in aruis & segetibus: est que frequenter in Apulia, & in quibusdam Italia locis. Dio. li. 3. cap. 94.

Qualitates.

Radice maxime utimur. Digerendi facultatem, & exiccandi, excalfaciendique in tertio ordine possidet. Gal. li. 7. sim. me.

2 3

Teuc

Teucrium, siue Teucris: Græcis, *Teucrion*:
Germanis, Grosz Bathengel: Gallis, Grosse
Germandree.



Locus ex Matthiolo.

*Fruëticat in pluribus locis, maximèque in
Clinosis, montibus, & Campestribus.*

Qualitates.

*Incidētis, & tenuium partium facu'tatis est:
Et sit in tertio ordine exiccantium: in secundo
Verò excalfacientium.*

Sale. li. 8.
simp. me
dica.

Triffa

Triffago, siue Trixago: Græcis χαμαίδρις:
Arabibus, Damederios, Chamadrius, seu
Kemadrius: Italis, Querciuola, seu Calamā
drina: Germanis, Gamanderle, seu Bathen-
gel: Hispanis, Chamedreos: Gallis, German
dree.

Locus.



Nascitur in a- Diof. li. 3.
spenis & pe- cap. 96.
trofis.

Qualitates.

Vincentem Gal. li. 8.
habet qualita simpl. me
tem amarā, dica.

& est quodam
modo acris.

Crassitudines
humorum inci-
dit, & visce-
rum obstructio-
nes expurgat.

Et sit tertij or-
dinis excalsa-
cientium, &

desiccantium:

plus tamen desiccet, quam calefacit.

2 4

Lichnis

Lychnis coronaria: Græcis, λυχνίς:
Germanis, Mergen roeszlin.



Locus ex Matthiolo.

*Seritur in hortis ad Coronamenta: Et spon-
te nascitur in montibus saxosis.*

Qualitates.

Gale. li. 7. *Semen calidum est secundo quodammodo
simp. inc. ordine, aut iam etiam tertio: siccum sanè eo-
dem quoque modo.*

Lilium

Lilium: Græcis, κρίνον, & λεῖριον: Arabibus,
Sufen: Italis, Giglio: Germanis, Lilgen, seu
Gilgen: Hispanis, Azucena, & Lirio blanco:
Gallis, Lis blanc.



Locus.

Seritur radi-
ce in hortis.

Qualitates.

Lilij flos tem Gale. li. 7.
peraturam sinap. nic.

mistam obti-
net, partim
ex tenni, par-
tim ex terre-
na essentia,
ex qua uti-
que in gustu
amaritudinē
habet: partim
ex aquea, eā-
que tempera-
ta. Oleū, quod
ex eo confici-

tur, citra morsum digerendi, simulque emol-
liendi facultatem obtinet. Radix foliaque per
se, trita desiccant, abstergunt & digerunt
moderate. Plus tamen inest facultatis abster-
gentis in radice, quam in folijs: quanquam ta-
men abstergat primo tantum ordine;

z 5

Marta

Martagon, Chymistis, siue Liliū Punicum : Italis, Giglio rosso : Gallis, Lis Orengé.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in Montibus, & nemorosis,
Qualitates ex Fuchfio.

Radix & folia viscosa sunt & amara:
itaque faciunt ad Ulcera maligna.


Ex Matthiolo.

Meritò annumeratur inter Lilia: ex illis
ergo huius qualitates cony cito.

Ballo

Ballote, Marrubiastrum, seu Marrubium
nigrum, aut foetidū: Græcis, βαμβύλη, καὶ μέ-
λαρ πγάσιον: Italis, Marrobionero, Marrobia-
stro, seu, Marrobio bastardo: Germanis,
Schvvartz Andorn: Hispanis, Marroio ne-
gro: Gallis, Marrubin noir.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur fre-
quens in a-
grorum mar-
ginibus, & se-
cus vias.

Qualitates.

Acris est, & Agi. li. 7.
abstersoria fa-
cultatis.

Ex Fuchſio.

Pollet ama-
ritudine &
acrimonia: i-
tāque excal-
facit secundo
ordine inten-
so, aut tertio
incipiente: &

desiccatur tertio: eāque ratione Marrubio prope
modum simile.

Apia

Apiastrum, Citrago, siue, Melissa: Græcis, κελιδόφυλλον: Arabibus, Bederangir, Bedarungi, Bederenzegum, Turungem, Trutugian, seu, Marmacor: Italis, Melissa, seu, Cedronella: Germanis, Melissen, seu, Binenkraut: Hispanis, Torongil, & Yerua cidre: Gallis, Melise.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur, & ex fonte nascitur in nemorosis.


Qualitates.

Melissophyllum Marrubio est simile facultate: sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec vititur eo quissiam, presente Marrubio. Caterum ubi ad manum non

erit Marrubium, uti licebit Melissophyllo, habitz proportionis ratione.

Marru

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.



Marrubium album: Græcis, *ὑπόκιστος*: Arabibus, Farasio, seu, Frasium: Italis, Marrobio: Germanis, Andorn, seu Lungenkraut: Hispanis, Marroio: Gallis, Saupomme, Marrube, seu Marrubin.

Locus.

Nascitur propter adificia, ruinas, & ruderata.

Dioscor. li. 3.
cap. 102.

Qualitates.

Marrubium ut gustu amarum est, ita consentientem huic saporis actionem possidet, leuatur ac Lienem obstructione liberat, thoracem, pulmonemque expurgans. Ill-

Gal. li. 8.
simp me.

tum detergit ac digerit: estque calidum secundo ordine iam completo: & siccum in tertio medio, aut completo. Succo ad acumen visus stantur.

Stachys



Stachys Latinis, & Græcis: Italis, Salvia
 Montana: Germanis, Riechender Andorn
 Gallis, Sauge molle, seu, Sauge de Mont
 taigne.



Locus.

Nascitur in montibus, & asperis.

Qualitates.

Diosc. li. 3.
 cap. 103.
 Gale. li. 8.
 simpl. me
 dica.

*Gustu est acri & amaro, tertiique ordinis
 excalfacientium. Menses mouet, abortum ad-
 fert, & secundas eicit.*

Lingua

Lingua Ceruina: Græcis, *φυνίτις*: Italis,
Lingua Ceruina: Germanis, Hirtz Zun-
gen: Hispanis, Lengoa Ceruina: Gallis,
Langue Cerue, seu, Langue de Cerf.

Locus.

In Embrosis Dio. libr.
Et opacis emi- 3. c. 104.
cat. Aquosis
item delecta-
tur.


Qualitates.

Phyllitis, cum
qualitatis sit Gale. li. 8.
acerba, non ab- sim. mc.
surde diarrhoe-
as, Et dysen-
terias, potu, in-
uat.

Ex Fuchfio.

Gustu ad-
stringit, Et aliquatenus amara: ex quibus ca-
lesfacere videtur, primo ordine, Et desiccare
secundo.

Trifo



Trifolium Bituminosum, siue, Trifolium Asphaltites: Græcis, *τρίφυλλον*: Gallis, Treffle velu, seu, Triolet blanc: Germanis, Vveyfz klee.

Locus ex Matthiolo.

Virent Præta Trifoliis omnis generis.

Qualitates.

Vis Planta est calida & sicca, Et Bitumen, cui odore est similis.

Ex Fuchfio.

Trifolium omne gustu adstringit aliquatenus, & tenuium est

partium, Item, quandam acrimoniam possident, desiccantque quodammodo.

Trifolium

Gal. lib. 8.
simp. mc.



Trifolium pratense: Italis, Trifoglio: Hispanis, Treuol: Gallis, Treffle des prez, rouge.



Locus.

Nomen indicat.

Qualitates.

Vide historiam Trifolij Bituminosi.

A

Tri

Trifolium Pratense alterum, seu, Trifolium acutum, aut Oxytriphylon: Italis, Trifoglio acuto: Germanis, Spitzklee: Gallis, Treffle à feuilles pointuës.



Locus & Qualitates.

Isdem Natalibus oritur quibus Pratense primum, easdemque vires habet.

Trifo

Trifolium acetosum, Allehuya, seu, Pan-
nis Cuculi: Græcis, *δξίς*: Italis, Pan Cucu-
lo: Germanis, Buoch klee: Gallis, Allehuya,
seu, Pain de Cocu.

Locus ex Fuchfio.



*Nascitur in
nemoribus sa-
xosis & aquo-
sis: & seritur
in Gallia, Em-
brofi: q̄s gan-
det.*

Qualitates.

*Edunt qui Pli. li. 27.
Enterocelen ha cap. 12.
bent.*

Ex Fuchfio.

*Acerbitas &
ariditas gustu,
inducant eius-*

*dem esse temperatura cuius Oxalis, frigida
videlicet, & sicca.*

A 2

Trifo

Trifolium odoratum, seu, Trifolium Equinum: Italis, Tribulo, seu, Trifoglio degli Caualli: Gallis quibusdam, Melilot commun.



Locus.


*Nascitur in cultis & inter segetes: pratisque
Eliginosis gaudet, & colles nonnunquam
ascendit.*

Qualitates ex Matthiolo.

*Aquam stillaticiam eliciunt odoris gratia.
Equi autem hanc herbam avidissime in pa-
bulum suum sequuntur.*

Trini

Trinitas, siue Trifolium magnum: Germanis,, Edel leber Kraut: Gallis, Treffle de marais.



Locus, ex Matthiolo.

Nascitur in Viginosis, & inter frutera.

Qualitates ex eodem.

Glutinatoria est tam exterius illita, quàm interius sumpta. Quinetiam Valet ad Enterocelas: in quem vsus, puluerem dimidiꝝ cochlearis mensura ex vino austero propinant.

A 3

Polium

Polium montanum, siue, Iua Muschata:
Arabibus, Cahade, Iahade, seu, Giade: Gal-
lis, Iue muscate.

Pli. li. 21.
cap. 7.

Gale. li. 8.
sim. mc.



Locus.

Campestre
est, quāquam
tamen Mōti-
bus gaudeat.

Qualitates.

Amarū est
gustātibus, &
modice acre.

Itaque obstru-
ctiōnes expe-
dit, Urinamq;
& mēses ciet.

Viride, ma-
gna Vulnera
glutinat, ma-
ximè quod fru-
eticosum est,

Aridum illi-
tum maligna Vlcera sanat.

A 4 Pol

Polium minus.



Locus ex Matthiolo.

Rara est planta, scribitur tamen à quibusdam ad spectaculum duntaxat.

Qualitates.

Ad Antidota amarius, & acrius est quàm maius, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantium, ex secundo autem completo excalfaciendum. Illitum Ulceribus malignis magis predest quàm Polium maius.

Gal. li. 3.
sim. me.

A 4

Scord

Scordium, siue Trissago palustris: Græcis, *σκόδιον*: Arabibus, Scordeon, aut, Scordeū: Italis, Calamandrina palustre: Germanis, Vvasser battenig: Hispanis, Scordio: Gallis, Chamaraz.

Dio. li. 3.
cap. 108.

Gal. li. 8.
fm. mc.



Locus.

In Montibus
Et palustri-
bus nascitur.

Qualitates.

Scordium
ex multiformibus tum sa-
poribus, tum fa-
cultatibus con-
stat. Nam Et
amarū quid-
dam obtinet,
Et acerbum:
acrimoniam
que habet Al-
lio persimile.
Expurgat Et

excalfacit viscera, mensesque Et Urinas ciet.
Viride illitum glutinatorium est.

Alliar

Alliariis, siue Alliaria, aut Pes Asini : Ita-
lis, Alliaria : Germanis, Knobblanchs kraut:
Gallis, Alliairé.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur
iuxta Sepes,
in agrorum
marginibus,
& in hortis.

Qualitates
ex eodem.

Crassos &
lentos humo-
res incidit, &
extenuat. Se-
mē emplastri
modo vulna
impositū, mu-
lieres & teristrā
gulatu oppres-
sas liberat, &
excitat.



Ex Fuchfio.

Calfacit & desiccāt quarto ordine, imbe-
cillus tamen quādam Allium.

A 5 Tussil

Tussilago, Farfaria, siue, Vngula Caballina: Græcis, βέρυον: Italis, Falfarella, Farfara, seu, Vnghia di Cauallo: Germanis, Roszhuob, seu, Brant lattich: Hispanis, Vnha de Asno: Gallis, Pas de Cheual, ou d'Asne, siue, Tacconnet.

Diosc. li. 3.
cap. 109.

Gal. li. 6.
simp. me.



Locus.

Nascitur in
amœnis, & ri-
guis.

Qualitates.

Radix sicca et
suffita tusses et
Orthopnœas
iuvat. Est au-
tem modicè
acris, & sine
molestia om-
nes Thoracis
abscessus cre-
dita sit rum-
pere. Folia sic-
ca acriora quā
et partibus in
flammatione

laborantibus conueniant: quod tamen efficiunt
viridia, frigida enim & humida sunt ob
aqueæ humiditatis admistionem.

Arte

Artemisia, Latinis, Græcis, Italis, & Hispanis : Germanis, Beyfuosfz, &, S. Iohans gurtel: Gallis, Armoyse, siue, Herbe de la saint Iehan.



Locus. Dios. li. 3.
Magna ex cap. 110.
parte in ma- & 111.
ritimis nasci-
tur: sed & gan-
det sepibus,
cultis, & ri-
guis.

Qualitates. Gale. li. 6.
sim. me.

Vtraq; Ar-
temisia excal-
facit, & mo-
dicè desiccatur:
calefaciuntq;
excessu secun-
do, desiccantq;
primo intenso,
aut secundo in-

cipiente. Sant autem & modicè tenuium
partium.

Ambro

Pli. li. 27. cap. 4. Ambrosia Latinis, & Græcis. Vagi nominis est Ambrosia, & circa multas herbas fluctuans. Hæc tamen vera Dioscoridis est Ambrosia.

Locus ex Matthiolo.

Saxosis oritur: Et si Dioscoridi germana sit Cappadocia.

Qualitates.

Cataplasmate imposita vim habet adstringentem, ac repellentem.

Ex Plinio.

Vsus eius ad ea quæ disuti opus sit.

Gal. li. 6. sim. me.

Pli. li. 27. cap. 4.



Bot

Botrys Latinis, & Græcis: Italis, Botry:
Germanis, Trauben Kraut, seu krotten
kraut: Gallis, Migraine, Millegraine, Patien
ce, seu, Piiment.



Locus. Dios. li. 3.
cap. 113.

Inuenitur in
torrentium re
pis, & conual
libus: sed &
in hortis seri
tur ad vteri
affectus.

Qualitates
ex Diosc.

Pota, Or
thopnæas mul
cet. Idem sen
tiunt Plinius
& Aegineta.
Ex Fuchlio.

Ex amari
tudine, calida Plin. libr.
27. cap. 8.

& sicca censetur. Incidit prater ea ob calidi
tatem, & subtilitatem partium.

Gera

Geranium primum, Rostrum Gruis, Rostrum Ciconiæ: Græcis, γεράνιον: Germanis, Storcken schnabel: Hispanis, Pico de Ciguenha: Gallis, Bec de Grue, siue, Bec de Cigogne.

Locus ex Marthiolo.



Dio. li. 3.
cap. 114.

Gerania pas-
sim ferè visun-
tur in campe-
stribus, secus
vias, & iuxta
sepes.

Qualitates.

Vulua infla-
tiones discu-
tit potum, ex
vino, drach-
ma pondere.

Ex Fuchio,
& Matthiol.

Radix dul-
cedinem quā-
dam obtinet:
digerendiq;

Vim possidet: reficientibusque se ab imbecilli-
tate & utilissima est, pota bis in die, Drachma
pondere, in vini cyathis tribus, valet & ad
inflationes.

Gera

Geranium Secundum, Geranium Latinorum, Acus muscata, Pes Columbinus, siue, Ruberta, aut herba Roberti.

Locus ex Matthiolo.



Passim nascitur in campestribus, secus vias, & iuxta sepes.

Qualitates. Dio. li. 3. cap. 114. Nullius in medicina & sus.

Ex recentiorum placitis.

Internis vulneribus, & fistulis sanandis potum mirifice prodest. Sed hic adhibenda est cautio, ne pro Pe-

de Columbino (qui Serapioni Amomum est) secundum Geranium & serpent.

Geran

Geranium tertiū, seu Balsamina, quibus-
dam verò Momordica, quanquam sit secun-
dum Dioscoridis Geranium, Matthiolo, &
Fuchfio.



Locus ex Fuchfio.

Clinosis gan det.

Qualitates Geraniorum ex Fuchfio.

Radices & Folia Geraniorum desiccant
& adstringunt, excepto primo.

Gosipp

Gossipium, Xylon: Officinis & Barbaris,
Cotum, Bombax, Bombasum, siue Cottona-
ria: Italis, Bambagia: Germanis, Bañ vvoll:
Gallis, Herbe du Cotton.

Locus ex Matthiolo.



Hac etate se-
ritur in Cy-
pro, Creta, &
Sicilia Insulis:
quin & in
Apulia aliis-
que Regioni-
bus nascitur.

Qualitates
ex eodem.

Huius la-
nugo manife-
ste excalfacit,
ac siccatur: qua-
si comburatur
mirum in mo-
dum manan-
tem è Vulneri-

bus sanguinem sistit. Seminis medullatus &
difficiliter spirantibus auxiliatur, & genita-
le semen auget. Oleum, quod ex ea exprimitur
Lentigines in facie, & omnes maculas delet.
Arabibus tamen Lanugo eius calefacit &
humectat.

B

Typha

Typha Latinis, & Græcis: Italis, Mazza
Sorda: Germanis, Moszkolben, seu Narren
kolben: Hispanis, Bohordo, seu Iunco Ama
corocado: Gallis, Masse de Ionc.

Locus.

*Gignitur in
palustribus,
& aquis sta-
gnantibus.*

*Qualitates
ex Matthio-
lo.*

*Typha pappis
additis Beto-
nica folijs &
Gladioli, ac
Bistingua ra-
dicibus, omni-
bus in pulue-
rem tenuissi-
mum reda-
ctis, & assa-
tis ouorum*

*luteis exceptis, utuntur feliciter ad Enterocel-
las etiam atate consistentium. Ieiunis exhi-
bent quotidie Drachma pondere, triginta die-
rum spatio: sed interim præstanti ligatura, &
Emplastris glutinantibus ima pubis pars pro-
bè munitur.*

Filip

Dios. li. 3.
cap. 53.



Filipendula.

Locus ex Fuchfio.



Montibus, a-
 speris, & sa-
 xosis gaudet.
 Inuenitur e-
 tiam in pra-
 tis non admo-
 dum letis.

Qualitates
 ex eodem.

Valde ama-
 ra est: Et fit
 calida & sic-
 ca tertio ordi-
 ne.

Ex Matthio-
 lo.

Vrina remo-
 ratui. & stil-

licidio auxiliatur, renūque calculis, & dolo-
 ribus. Suspiriosis, anhelentibus, omnibusque,
 in vniuersum, morbis frigidis opitulatur: ma-
 ximēque Comitibus, insperso cibus radicū
 puluere.


B 2

Cony

Conyza maior, seu Pulicaria, aut Conyza mascula, Latinis, & Italis: Græcis, νόμισα: Germanis, Geelmuntz, seu, Dur vvurtz: Hispanis, Attadegua: Gallis, Herbe aux puces.

Locus ex Matthiolo.

Gal. li. 7.
sim. me.



Passim ferè
prouenit.

Qualitates.

Conyza maior & minor
ad similes sunt
tum tempera-
tura, tum fa-
cultatis. Gu-
stui amara, et
acres appa-
rent. Excalfa-
ciunt admo-
dum luculen-
ter folia, &
germina illi-
ta, per se, aut
in oleo cocta.

Flores eandem vim habent. Itaque, cum fo-
lijs tritos, in Vino bibendos exhibet ad menses
fortiter educendos, ciendumque foetum. Tertij
sunt ordinis in excalfaciendo, & exiccando.

Conyza

Conyza minor, seu Conyza foemina.

Theoph.
de natu.
plan.li.6
cap.2.



Locus, Qualitates.

*Per omnia adsimilis est Conyza mascula, &
in iisdem locis nascitur.*

B 3

Cony

Conyza media.



Locus ex Matthiolo.

Dio. li. 3.
cap. 119.

Nascitur humentibus praesertim locis, & secus vias, ubi ex agrorum marginibus, aqueus humor, stillicidio quodam in proximos defluit Canales.

Qualitates.

Gal. li. 7.
si m. me.

Tertium Conyza genus, humidis proveniens, & trisque tum graueolentius, tum imbecillius: minus ergo calefacit & exiccat quam priores.

Heme

Hemerocallis, siue Lilium syluestre : Italis, Giglio, saluatico : Germanis, Heydnisch lilien, seu Goldt lilien: Hispanis, Lilio amarillo: Gallis, Lis iaune.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in
Aruis inter
segetes, in
Pratis, in
Montibus, et
in Vallibus.
Seritur ta-
men in hortis
ad spectaculum.

Qualitates.

Radice habet
Lilij similem, non figuram tantum,
sed & viribus. Prodest
arborescentibus: le-

Gale. li. 6.
simp. medica.

uiter enim digerentem facultatem habet: &
cum hoc repulsorium quiddam.

B 4

Heme

Hemerocallis altera: Germanis, Gold-
vvurtz, seu Iunckerlilien.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus Iapidia.

Qualitates.

Facit ad omnia quae prior Hemerocallis.

Lilium

Lilium conuallium, Latinis, & Italis:
Germanis, Meybluomlim: Gallis, Muguet.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
Nemorosiss,
Frutetis, &
opacis.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Ex floribus
Germani A-
quam stillati-
ciam, quam
vocat Au-
ream eliciunt,
ad cordis &
cerebri affe-
ctus. Imò ani-
mam expiran-
tibus propi-

nant, existimantes eos posse in vita retineri
aliquot horas. Falluntur tamen opinione. Qui
plura vult, consulat Matthiolum.

B 5

Leuco

Leucoium, siue Viola alba : Græcis, λευκόνιον: Arabibus, Keiri, Cheiri, seu Alcheiri: Germanis, Gelb violen, seu Vveysz vveyl: Hispanis, Violetas amarillas, seu Violetas blancas: Gallis, Violiers rouges, blancs, jaunes, & violetz.

Locus ex Matthiolo.

Gale. li. 7.
simpl. me-
dica.



Frequentissimum Visitur in hortis, Viridarijs, ad iun- que fenestris, & parietibus. Vbi fouetur diligentissime ad Corona- menta.

Qualitates.

Extergen- di facultatem possidet. ac te- nuum est par- tium: plus ta- men flore. & inter hos qui

sunt sicciores magis quam Virides. Semen & radix eiusdem sunt facultatis: nisi quod radix crassioris est essentia, et magis terrena.

Testi

Testiculus Canis foemina: Græcis, *ὄρχις*,
κυνὸς ὄρχις: Arabibus, Chasi alcheb, seu Cha
 si alcheib: Italis, Testicolo di Cane: Germa
 nis, Knaben kraut: Hispanis, Coyon de per
 ro: Gallis, Couillon de Chien.

Locus.

Nascitur in petrosi & sabuletis, & in pratis & ligiosis. Dios. li. 3. cap. 124.

Qualitates.

Radici vis inest calida et humida, ac gustu dulcis est. Gale. li. 8. simp. medica.
 Maior radix multam habere videtur humiditatem excrementitiam & flatuosam, quapropter e-

pot a Venerem excitat. Temperamentum vero minoris ad calidius & siccius vergit: unde cohibet ac reprimat Venerem.

Testicu



Testiculus fœmina, minor.



Locus & Qualitates.

*Huc refer omnem prioris Orchidis
historiam.*

Orchis

Orchis Serapias minor, siue Testiculus
 enas, minor: Germanis, Vvolriechend Mer-
 entrehen: Gallis, Couillon de chien masse.



Locus.
Nascitur in Dios. li. 3.
petrosis, sabu- cap. 125.
letis, & pra-
tis & liginosi.

Qualitates
 ex Diosco-
 ride.

De hac ea-
dem qua de
Testiculo canis
produuntur.

Ex Galeno:

Orchis Se- Gal. lib. 8.
rapias sicciorē simp. me.

facultatem obtinet, quàm Et primi sit ordi-
 nis exiccantium. Quocirca ad Venerem non
 similiter accommodus, atque prior Orchis. Sic-
 catus multò etiam magis desiccat. Habet etiã
 quidpiam sub adstringens: proinde Ventrem,
 ex Vino potus, sistit.

Orchis

HISTORIA
Orchis serapias maior.



Locus, & Qualitates.

Huc Serapiadis minoris historiam refer.

Palma

Palma Christi, seu, verus Hermodactylus, Auicennæ, Digiti citrini: Germanis, Vobstendel Vvurtz Vveyblin.

Locus, ex Matthiolo.

Nascuntur
ambe in mon-
tibus.

Qualitates
ex Auicenna.

Excalfaciunt
vtraque, sic-
cantque scun-
do recessu. Cras-
sa corporis ex-
crementa pel-
lunt. Stillati-
cia earum a-
qua Dysente-
ricis auxilio
est. Radicum
decoctum, Si-

no diutius commistum, sumptumque tam in
prandio quam in cæna. Comitiales adiuuat.
Idem facit pulvis Seminis.

Hor



Horminum satium, Latinis,
& Græcis.



Locus, ex Matthiolo.

Rara admodum planta est.


Diosc. li. 3.
cap. 128.

Qualitates.

*Valet ad Venerem stimulandam. Abstergit
etiamnum, extrahit, & discutit.*

Hormi

Horminum falsum, Geminalis, Matri-
salua, seu Herba Sancti Ioannis: Italis,
Sclarea: Germanis, Scharlach: Gallis, Or-
tual, seu, Toutebonne.



Locus ex Fuchfio.

Seritur in hortis frequentissime.

Qualitates ex eodem.

Amaritudo & gustus adstrictio indicant
siccum & moderate calidum.

C

Hedy

Hedysarum, aut Securidaca
Græcis, ἡδύσαρον.



Locus.

Nascitur in segetibus & hordeis.

Qualitates.

Diosc. li. 3.
cap. 129.

Gal. li. 6.
simp. med.

Semen acerbum & amarum apparet:
quamobrem, potum gratum est stomacho, &
viscerum obstructions expurgat. Idem præ-
stant totius fructus ramuli.

Onosma

Onosma, Osma, Phlonitis, vel Ononis,
Latinis, & Græcis.



Locus ex Matthiolo.

Colles amat: gigniturque in asperis.

Qualitates.

Diosc. li. 3.
cap. 130.


*Ex acri & amara constat substantia: pro-
inde quoque creditur fetus necare, & ejcere,
folijs eius in vino potis.*

Gale. li. 8.
simpl. me-
dica.

C 2

Nym

Nymphæa, seu, Nenuphar: Græcis, Νύμφη
 φαία: Arabibus, Nilofar, Ninofan, seu, Nilu-
 far: Italis, Nymphaea: Germanis, Galb, & d. l. u.
 Vveyfz see bluomen, seu, Haar vvurtz: Hi-
 spanis, Escudetes del Rio, & Higos de
 Rio: Gallis, Lis d'estang, Blanc d'eau, seu
 Jaune d'eau.



Locus.


Dio. libr. *Nascitur in paludibus & stagnantibus*
 3. ca. 131. *aquis, & Amnes amat.*
 & 132.

Qualitates.

Gal. li. 8. *Radix & semen desiccant citra morsum.*
 simp. me. *Radix candida potentioris est facultatis. No-*
nullam etiam abstergerendi vim obtinet: sed
magis abstergit radix nigra. Muliebre proflu-
uium, Ventrisque, & seminis, cohibent &
reprimunt.

Andro

PLANTARVM. 405.
Androsaces, Latinis, & Græcis.



Locus.

Cignitur in maritimis.

Dio. li. 3.
cap. 133.

Qualitates.

Humida & acris herba est. Exiccata, exhibitaque tum ipsa, tum fructus eius magnopere Urinam mouet: & nimirum discutit, & desiccatur.

Gale. li. 6.
simp. me.

C 3

Sco

Scolopendrium, Splenium, Seu, Hemionium : Græcis, ἄσπληνον: Arabibus, Scolofendrion, seu, Sculufendrion : Officinis, Italis, & Gallis, Ceterach, seu Scolopendre: Germanis, Hirtz zung: Hispanis, Doradilla.

Locus.

*Nascitur in
parietibus, sa-
xisque siliceis,
& opacis.*


Qualitates.

*Tenuium
quidem par-
tium, nec ta-
men calida
herba est: ead-
que ratione
lapides fran-
git, & lienes
liquat.*

Hemio

Dios. li. 3.
cap. 134.

Gale. li. 6.
simp. me.



Hemionitis, siue, Splenium: Græcis, *ἡμιονίτις*.

Locus.

In petrosis nascitur.

Qualitates.

Dio. li. 3.

cap. 135.

*Amritudinem & adstrictionem simul Gal. li. 6.
possidet: quamobrem, cum aceto pota, lienosis sim. nie.
auxilio est.*

C 4 Luna

Lunaria minor: Germanis, Monrauten.

Locus ex Fuchfio.

*Nascitur in montibus, in-
dissolubili so-
cietate iun-
cta cū Ophry.
Qualitates.
ex eodem.*


*Gustum ter-
restrem habet
Et adstringē-
tem: proinde
frigida Et sic-
ca censetur.*

Ex Matthiol.

*Mirificè ef-
fuax est Vul-
neribus gluti-
nalis, itemq;*

*intrinsecis atque extrinsecis corporis fractu-
ris sanandis: celebraturque ad puerorum En-
terocelas. Tota planta in puluerem conteritur.
Dysentericis item prodest.*

Anthe



Anthemis, Chamæmelum, seu, Chamomilla: Græcis, *αὐθενίς*: Arabibus, Debonigi, seu Babunegi: Italis, Camamilla: Germanis, Camillen: Hispanis, Manzanilla: Gallis, Camomille.



Locus.

Nascitur in Diof. li. 3.
asperis, & in cap. 137.
xta semitas.

Qualitates.

Gal. li. 3.
Chamæme- & 6. sim.
lum tenuita- medi.

te quidem, Ro
sa persimile:
calore Verò ad
Olei faculta-
tes magis ac-
cedēs, anima-
li tum fami-
liares, tum tē-
peratas. In
summa, cale-
facit & desic-

cat primo ordine, tenuiumq; est partium: ac
proinde digerendi, rarefaciendi, & laxandi
facultatem obtinet.

C 5 Part

Hypecoüm Latinis, & Græcis.



Locus.

Nascitur in segetibus, arvisq.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 63.


*Vim refrigerandi habet, ex tertio ferè re-
fin. me. frigerantium ordine, adeò ut parum absit à
Papanere.*

Gal. li. 8.

Tana

Tanacetum, siue Athanasia: Italis, Athanasia, seu Daneta: Germanis, Reynfarn: Gal-
lis, Tannée, seu, Tanaisie.

Locus, ex Fuchfio.




Nascitur ad
decursus a-
quarum, &
in vinearum
scrobibus. Seri-
tur etiam in
hortis.

Qualitates.
ex Matthiol.

Valet ad vē-
triculi et alui
flatus discu-
tiendos, & lū-
bricos ex ven-
tre pellendos.
Vtuntur etiā
ad frangēdos
renum calcu-
los, & ad ciendam Urinam. Sed id Viris ma-
gis quā mulieribus commendant: contra ve-
rò Matricariam fœminis solis exhibent.

Buph

Buphthalmum, siue, Oculus Bouis: Græcis, βύφθαλμος: Italis, Occhio di Bue: Germanis, Rinds aug: Gallis, Oeil de Beuf.



Dio. li. 3.
cap. 179.

Locus.

Circa oppida nascitur, & in campestribus.

Qualitates.

Gal. li. 6.
sim. mæ.

Flores habet Anthemide acriores: proinde & vehementius discutiunt, adeò ut duritias sanent Cerato misti.

Bellis,

Bellis, seu Belluis: Italis, Primo fiore, &
Fior di prima vera: Germanis, Maszlieben:
Gallis, Marguerites, seu, Pasquettes.

Locus, ex Matthiolo.

Seritur in
hortis: & spon-
te nascitur in
pratibus et cam-
pestribus.

Qualitates.
ex Matthiol.

Valent ad
strumas, capi-
tis fracturas,
& Vulnera
Thoracis, quæ
in Pectoris ca-
uitatem & q̃
penetrarunt:
in quæ & sum-
ptionibus in-
serunt.



Ex Fuchfio.

Calida sunt & sicca. Ex acetoso tamen sa-
pore, nonnihil frigiditatis subesse censendum
est. Desiccant tamen manifestè.

Pæonia

Pæonia fœmina: Græcis, γλυκυσίνη, παιονία: Arabib⁹, Feonia: Italis, Peonia: Germanis, Peonien: Hispanis, Rosa del Monte, seu Rosa albardeira: Gallis, Pyuoine, seu, Pynoine.

Dio. li. 3.
cap. 140.

Gale. li. 8.
sim. mc.



Locus.

Nascitur in altissimis Montibus, & præruptis.

Qualitates.

Radix gustu habet adstringentem, cum quadam dulcedine: & si plusculum dentibus madas, acrimoniam & quãdam amaritudinem subesse percipies.

Tenuium est partium, & exiccatoria: non tamen est insigniter calida: sed aut symmetra, aut paulò calidior. Efficacissima est ad puerorum Epilepsias.

Lith

Lithospermum maius, siue Milium folis:
 Græcis, λιθόσπερμον: Arabibus Kulb, Cūlb,
 Calt, seu, Calab: Italis, Milium folis: Germa
 nis, Meerhirs, & strinsomen: Gallis, grand
 Gremil, seu, Herbe aux Perles.



Locus.

Nascitur in asperis & editis locis.

Qualitates ex Fuchfio.

Semen Urinas mouet: est ergo calidum &
 siccum ex Galeni sententia.

Diosc. li. 3.
 cap. 141.

Gale. li. 5.
 sim. me.
 cap. 12.

Lith

Lithospermū minus: Gallis, petit Gremil.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Lithospermi maioris historiam.

Rubia

Rubia fatiua, seu Rubea tinctorum: Græ-
 cis, ῥυβία: Arabibus, Pane, seu Fue alfa
 magin: Italis, Rubbia: Germanis, Ferber-
 oet: Hispanis, Ruuia: Gallis, Garance.

Locus.

Seritur ma- Diof. li. 3.
 gno. quæstu. cap. 143.

Qualitates.

Radix acer Gale. li. 6.
 ba est, & gu- simpl. me
 stu amara. dica.

Lienem & Ie-
 cur expurgat:
 Urinas cras-
 sas, multas-
 que, ac non-
 nunquam e-
 tiam sangui-
 nolentas. Va-
 cuat. Modicè
 extergit.

Ex Fuchfio.

Excalfacit se-
 cundo ordine, & desiccatur tertio.

D

Rubia



Rubia sylvestris: Gallis, Garance sauuage.



Locus.


Nascitur in petrosis, & locis insolatis.

Qualitates.

*Eiusdem facultatis est, cuius
Rubia maior.*

Lonchi

Lonchitis altera, Latinis & Græ-
cis: Germanis, Spicant.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in sitientibus, & asperis.

Qualitates.

Folia Viridia ad glutinanda vulnere sunt Gale. li. 7.
idonea: sed sicca, cum aceto pota, lienes indu- simp. mc.
ratos sanant.

D 2

Althæa,

*officinis
Bismalia,
Maluanif-
cus,*

Althæa, Ibiscus, seu Ebiscus: Græcis, ἀλ-
θαία: Arabibus, Chitini, Chathmi, Chath-
mie, seu Rosa Zaueni: Italis, Maluauisco.
Germanis, Ibisch, seu, Heyl vvurtz: Hispa-
nis, Yerua Cannamera, & Marmaie: Gallis,
Guymauue.

Locus ex Fuchfio.

Letis, &
Viginosis gan-
det.

Qualitates.

Facultatem
habet digeren-
di, laxandi,
phlegmone le-
uandi, miti-
gandi, & con-
coquendi, diffi-
cilia coctu tu-
bercula. Ra-
dix & semen
idem agunt.
Sed tenuiorū
partium, ma-
gisque exicca-

toriam & magis extersoriam quàm illa fa-
cultatem ostendunt. Radicis decoctum ad-
stringit.

Ex Fuchfio.

Folia & flores excalfaciunt & siccant pri-
mo ordine: radix verò secundo incipiente.


Alcea

Gale. li. 6.
Simp. mc.



Alcea, siue Bismalua: Italis, Bismalua,
Malua saluatica, & buonvischio: Germanis,
Bigmars kraut: Hispanis, Malua de Vngria,
& Malua montesima: Gallis, Bismalua.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in
incultis, cam-
pestribus, &
agrorum, scro-
biūque mar-
ginibus, iuxta
sepes, vias, ac
semitas.

Qualitates
ex Paulo.

Radix in Agi. li. 7.

Vino pota, dy-
senteria & e-
rosionibus me-
detur.

Ex Galeno. Gal. li. 7.
sim. me.

Malua syl-
uestris dige-

rentis paululum & emollientis leuiter est fa-
cultatis. Fructus eius tanto validior, quanto
& siccior.

D 3

Canna

Cannabis, Latinis, & Græcis: Arabibus,
Scehedenegi, seu Canab: Italis, Canapo
Germanis, Zamer hauff: Hispanis, Canha
mo: Gallis, Chanure.

Locus.

Dio. li. 3.
cap. 148.

Gale. li. 7.
simp. me.
& li. 2. de
alim. fac.



Seritur semine.

Qualitates

Semen flatus discutit, adeoque desiccatur, & si plusculum edatur, genituram extinguat. Concoctum est difficile stomachoque & capiti nocet, prurique est succi. Multum calefacit: ideoque largius sumptum

Vaporem emittit calidum & medicamentosum.

Ex Fuchio.

Semen calidum est & siccum.

Ex Matthiolo.

Cannabis recentis decoctum, expressa fortiter herba, terrestrium Lumbricorum cauer-nulis inspersum statim eos euocat. Ouiferiores gallinas facit.

Anagy

Anagyris Latinis, & Græcis:
Gallis, Bois puant.




Locus ex Matthiolo.
Maris Littoribus gaudet.
Qualitates.

Acris, digerentis, excalfacientisque est facultatis. Folia & irentia minus sunt acris, idcirco tumentia reprimunt. Sicca incidētis sunt exiccantisque valenter facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis eius cortex. Semen autem magis subtilium est partium: sed & vomitum provocat. D 4 Anagy

Gal. li. 6.
simp. me
dica.

Anagyris minor: Plinio, Laburnum sed falso: Italis, Eghelo.



Locus ex Matthiolo.

Floret in montibus.

Qualitates ex eodem.

*Viribus & odoris gravitate omnino priori
Anagyridi similis.*

Cepæa



Locus ex Plinio.

Nascitur in littoribus arenosis.

Pli. li. 26.
cap. 8.

Qualitates.

Cepæa Portulacæ similis est. Folia ipsius contra Vesicæ scabies stiliter bibuntur. Radix, cum Asparago sylvestri pota, Urinæ stillicidia, quæ ex obstructione fiunt, abigit.

Aegi. li. 7.

D 5

Alisma

Alisma seu Damasonium, Latinis,
& Græcis.



Locus.

Diosc. li. 3.
ca. 151.

Aquosos amat tractus.


Qualitates.

Gale. li. 6. *Constitutos in renibus calculos, aqua in qua
simp. mc. decoctum fuerit, pota, committit. idque casu
expertum sumus. Ex quo liquet abstergeriam
quandam facultatem illi inesse.*

Hyperic

Hypericum Latinis, & Græcis, seu Perfo-
rata: Arabibus autem, Reiofricon, seu Keio-
noofaricon: Italis, Hyperico: Germanis, S.
Johans kraut: Hispanis, Coraioncillo: Gal-
lis, Millepertuys, seu Trucheran.

Locus ex Fuchfio.



*Nascitur in
incultis, aspe-
ris, & Cam-
pestribus.*

Qualitates.

*Calefacit, &
desiccatur, te-
nuisque sub-
stantia est, a-
deo & Urinas
& menses pro-
uocet. Sed ad
hæc totus su-
mendus fru-
ctus, non tan-
tum semen.*

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

*Fructus Viri-
dis, ad cicatri-*

*cem ducit cum alia, tum etiam ambusta. Si
sicco contuso inspergas, sanabis humida & pu-
trida Ulcera. Sunt qui Ischiadicis, semen bi-
bendum propinant quadraginta diebus.*

Afcy

Afcyrum, siue Afcyroïdes, Hyperici
Species: Arabibus, Asbirach.



Locus.


Gale. li. 6. *Nascitur in incultis, asperis, & Campestribus.*
Simp. me.

Qualitates.

*Semen eius est purgatorium: foliorum Verò
facultas modicè extergens & desiccans, Et &
ambusta sanare credantur. In Vino austero
decocta, glutinatoria sunt, præsertimque ma-
gnorum Vulnerum.*

Andro

A Androsæmum, siue, Dyonisias : Arabi-
 zus, Androsēman, Androsion, seu, An-
 drosifagian. *Gail. souueraine.*



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in cultis, asperis, & Campestribus.

Qualitates.

Huc refer omnem Ascyri historiam.

Coris,



Locus ex Matthiolo.

Pli. li. 26. *Nascitur passim in Italia, maximeque*
cap. 8. *sub Tamarica.*

Qualitates ex eodem.

Sup. cod.

Odore suavi est & grato.

Ex Plinio.

Vis semini excafactoria: & ideo in flatu-
nem facit Enterocelis, Sed & stomacho non
inutile: precipuum ad stranguriam si exulce-
rata non sit Vesica.

Chamae

Chamæpytis, Aiuga, Abiga, siue, Ibiga:
 Græcis, χαμαίπυτος: Arabibus, Hamefitheos,
 seu, Chamathius: Italis, Iua: Germanis,
 Yelenger, Yelyeber: Hispanis, Pinillo, &
 Iua arctica: Gallis, Iue muscate, seu, Cha-
 mæpyteos: Officinis, Iua Arthritica.

Locus.

Nascitur in
 Campestribus
 passim.

Qualitates.

Gustu ama- Gale. li 8.
 rum saporem simpl. me-
 acri validio- dica,
 rem obtinet.

Effectu vero
 expurgat ab-
 stergitque vi-
 scera plus quā
 calefacit. Her-
 ba viridis ma-
 gna vulnera
 cōglutinat, &
 Ulcera putre-

centia sanat, mammarūque durities di-
 cutit: est enim, in siccando, ordinis tertij, in
 calefaciendo vero secundi.

Cha



HISTORIA
Chamæpytis altera.

Locus ex Matthiolo.

Non admodum vulgaris est Planta.

Qualitates.

*Huc refer omnem prioris Chamæpytis hi-
storiam.*

Betoni

Betonica, seu, Vetonica: Græcis, νέτρον.
 ἡ ὑπότροπον: Arabibus, Chastara: Italis,
 Betonica: Germanis, Betonien: Hispanis,
 Bretonica: Gallis, Betoïne.

Locus ex Fuchfio.

Gaudet Mon-
 tosis, Pratis,
 Syluosis, Fri-
 gidis, & opa-
 cis locis.

Qualitates.

Vim habet Gal.li. 7.
 incidendi, & simpl. me-
 gustus indicat: dica.

amarior enim
 & subacris est
 herba. Consi-
 stentes in reni-
 bus calculos di-
 uidit, & Pul-
 monem, tho-
 racem, & Ie-

cur expurgat, abstergitque.

Ex Fuchfio.

Excalfacit & desiccant primo ordine com-
 pleto, aut secundo medio.

E

Bi

Bistorta, quibusdam, Britannica.



Locus ex Fuchsio.

Opacis & humidis gaudet.

Qualitates ex eodem.

Radix Valde adstringit: Et Videatur frigida & sicca. Botanicon, manu scriptum frigida & siccam censet tertio ordine. Iisdem pollet viribus, quibus Tormentilla.

Tormentilla

Tormentilla, aut, Septifolia: Græcis,
ἐντάφυλλον: Gallis, Tormentille: Germanis,
 Tormentill.

Locus.

*Nascitur pas-
 sim in locis sic-
 cis, & Campe-
 stribus.*

Qualitates,
 ex Fuchfio.

*Radix de-
 siccatur tertio or-
 dine, absque
 manifesto ca-
 lore.*

Ex Matthio-
 lo.

*Iisdem pollet
 facultatibus, quibus Bistorta. Vtriusque Radi-
 ces abortum prohibent bibita, aut Ventri, re-
 nibusque ex aceto illita: Urinaq, incontinen-
 tiam supprimunt cum succo Plantaginis pota.
 Stillatitia earum aqua, aut earum decoctum
 Venenis omnibus remedio est. Adstringunt, &
 Vulnere, maximè interna glutinant.*

E 2

Lyfi



Lyfimachia, siue Salicaria: Græcis, λυσιμαχία: Germanis, Vveyderich rott: Gal-
lis, Corneille, seu, Soucy d'eau.

Locus.

Gignitur in
aquosis, & palu-
stribus.

Qualitates.

Superantem
habet qualita-
tem adstricto-
riam, per quā
& vulnera
glutinat, erū-
pentemque ex
naribus san-
guinem, adhi-
bita, compe-
scit. Pota, Dy-
senterias, san-
guinis reiectio

nes, ac muliebre profluvium sanat.

Ex Fuchsio.

Vincentem habet qualitatem adstricto-
riam, & desiccatoriam.

Lyfima

Dio. li. 4.
cap. 3.

Gale. li. 7.
simp. mc.



Lysimachia secunda: Gallis, Chasse-bosse:
Germanis, Geel Vveyderich.



Locus.

*Nascitur in aquosis & palustribus, maxi-
mè in Salicetis.*

Dio. li. 4.
cap. 3.

Qualitates.

*Eiusdem est facultatis cuius Lysimachia
prior: Ruellio tamen efficax est ad Pestilen-
tes tumores, adhibita.*

E 3

9oly

Polygonum mas, Sanguinaria, Sanguinalis, Proserpinaca, Seminalis, Corrigiola, & Centinodia: Græcis, *πολύγωνον*: Arabibus, *Baf alrahagi*: Italis, Corrigiola, aut Centinodia: Germanis, Vveygrasz: Hispanis, Corriola: Gallis, Renouëe, seu Corrigiole.

Dio. li. 4.
cap. 4.

Gal. li. 5.
fm. me.



Locus.


Repit humi, in campis, adificiorum areis, & in viis publicis: estque frequentissima.

Qualitates.

Polygonum uti adstrictiorem quandam obtinet, ita sane vincit in eo aquam frigidum: ut sit secundi ordinis refrigerantium, aut etiam quodammodo in initio tertij. Videtur etiam desiccatorium esse. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium. Mas validior est femina.

Poly

Polygonum foemina.



Locus.

Nascitur in riguis.

Dio. li. 4.
cap. 4.

Qualitates.

Imbecillioris est ad omnia facultatis Poly- Gal. li. 3.
gono masculino: cetera illi simile. sim. me.

E 4 Poly

Polygonatum, siue, Sigillum Salomonis: Græcis, πολυγόνατον: Italis, Frassinella, Gi-
nocchietto &, Sigillo di santa Maria: Germani-
nis, Vveysz Vvurtz: Hispanis, Frassinella:
Gallis, Genoillet, Genoilliere, &, Sigillum
Salomonis.

Dio. li. 4.
cap. 5.

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Matthio.



Locus.

Nascitur in
Montibus.

Qualitates.

Mistam ha-
bet tum facul-
tatē, tum qua-
litate: obti-
net enim ad-
strictionis pa-
riter & acri-
monia, & a-
maritudinis
quidpiā, &
indicibilis cu-
iusdā insua-
uitatis. Radix
ce tantum fe-

rè & timur. Sunt qui ex ea stillaticiam eliciāt
aquam, ad faciem detergendam.

Clem

Clematis, siue, Vinca peruinca: Græcis,
κλήματος ἀαρβοιδής: Italis, Prouenca: Ger-
 manis. Singruen: Hispanis, Peruinqua: Gal-
 lis, Peruenche.



Locus.

Humi ser- Dio. li. 4.
pit, Lato. pin- cap. 6.
guig, solo pro
uenit.

Qualitates.

Profluuijs Gal. li. 7.
& dysente- simp. me.
rijs cum vino
pota prodest,
detiumq, do-
lores mansa
mitigat. Vte-
ri quoq, dolo-
ribus in Pessō
admota, & sui
est.

Ex Aegineta

Gustu adstringenti est, et amaro, desiccaturq,
absque mordicatione: Vincentem tamen habet
desiccatoriam facultatem.

E s Clema

Clematis altera Dioscoridis : Germanis,
Leinen: Gallis, Liseron: Italis, Vitalba.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 7.

Repit per Arbores, Et Smilax.

Qualitates.

Gale. li. 7.
sim. mc. *Folia acrem siue causticam facultatem ob-
tinent, adeo Et lepras excoriant. Fuerit itaque
quarti ordinis excalfacientium initio.*

Flamm

Flammula: Italis, Flammola: Gallis, espe-
de Liferon: Hispanis, Vitalba recta.



Locus.

*Nascitur in
Sepibus.*

*Qualitates
ex Plateario.*

*Excalfacit
desiccaturq; or-
dine tertio,
aut potius
quarto.*

Ex Matthiol.

*Efficacissima
est in morbis
frigidissimis.*

*Editur in
quartanis,
magno iuva-
mento. Oleum*

*ius Ischiadicis, articulorum, Iliumq; dolori-
bus, Urinae angustijs, & renum calculis cali-
dum inungunt, aut Clysteribus infundunt
magno successu.*

Symp

Symphitum petræū, Latinis, & Græcis.

Dio. li. 4.
cap. 9.

Gal. li. 8.
simp. mc.



Locus.

Nascitur in
petris, & Mō-
tibus petrosis.

Qualitates.

Ex contra-
rijs constat fa-
cultatibus: ha-
bet enim inci-
dēdi vim quā
piam, & con-
trahēdi. Inest,
illi præterea
humiditas
quedam non
immodicè ca-
lida, per quā
gustatibus dul-

ce apparet, & odoratu iucundum. Comman-
dum sitim extinguit. Secundum igitur
omnium supradictorum mixturem, simul
abundè digerere potest: simulq; corpora con-
trahere & constringere: Unde enterocelis im-
ponitur.

Symp

Symphytum alterum, Solidago, siue Con-
solida maior, quibusdam falsò, Alum, seu
Alus: Italis, Consolida maggiore: Germa-
nis, Vvalvvurtz: Hispanis, Suelda maiore, &
Consuelda maior: Gallis, Consyre, Oreille
d'Asne, seu, Consolida maior.

Locus ex Matthiolo.

Frequentis-
sima nascitur
in pratis Gli-
ginosis,
Qualitates.

Similem Pe Gal. li. 8.
trao Symphi- sim. me.
to Sim obti-
net: nō tamen
gustantibus
dulce est, nec
odorantibus,
odoratum: us-
que qualitate
bus à Petrao
diuersum est.
Caterum qua
tenus viscosi-

tatem quandam & mordacitatem obtinet,
Scylla simile. Ad omnia facit, quæ Symphy-
tum petraum.

Conso



Consolida, aut Solidago minor: Gallis,
Herbe au Charpentier.



Locus.

Nascitur te-
merè in pra-
tis & liginosis

Qualitates
ex Matthiol.

Vulneraria
est: maxime q̃
expetitur & b
glutinare, ad
stringere, &
reprimere su
opus. Mirum
etiam in mo-
dum prodest
disruptis, fra-
ctisq̃ internis
& externis

corporis partibus, illita, & intus sumpta. Folia
illita vel eorum succus Valde prodest Ulceribus
manantibus & excedentibus tum oris, tum
testium, pudendorumq̃ Virilium & mulie-
brium,

Con

Consolida media: Italis, Laurentina, seu,
Morandola: Germanis, Guldin gunsel: Gal-
lis, Herbe au Charpentier, Moyenne con-
syre, seu, Bugle.



Ex Fuchſio.

Gustu adstringens est & amara: indeq;
calida & sicca cenſetur.

Sani

Locus.
Nascitur in
Pratis & ligi-
noſis.

Qualitates
ex Matthiol.
Iſdem pollet
facultatibus
quibus minor
Coſolida. Spe-
cialim tamen
pota, ſangu-
nis grumos in
Ventriculo, & el
in alia corpo-
ris parte con-
cretos, diſſicit
& diſſoluit.

Sanicula, siue, Vrsi Auricula: Gallis, Oreil
le d'Ours.



Locus ex Matthiolo.

Copiosè nascitur in quibusdam Montibus.

Qualitates ex eodem.

*Pota quotidie mirificè prodest ad Entero-
celas, & Thoracis Vulnera: quin & ad alia
Vulnera tam intus sumptum, quàm exterius
allitum.*

Pilo

Pilosella maior: Italis, Auricula di Topo:
Germanis, Meufzohr: Gallis, Piloselle, seu
Dreille de Rat.



Locus ex matthiolo.

Nascitur in Montibus inter saxa. Plerumque tamen inuenitur in Sabuletis clinosis.

Qualitates ex eodem.

Mirifica est ad Vulnera interna et externa
lutinanda: quinetiam ad Enterocelas, tam
lit aquam pota. Tota enim planta vehementer
adstringit: Unde dysentericis, celiacis,
teris profluuijs, biliosis Vomitionibus, cruentis
utis, Et omnibus in vniuersum, fracturis,
hem fert, sed precipue caluaria.

Ex Fuchfio.

Gustu acris est, Et adstringens: proinde de
ccare Et calefacere censetur.

F

Scabio

Scabiosa, quibusdam Aetij Psora: Italis,
Scabiosa: Germanis, Apostemen kraut: Gal-
lis, Scabieuse.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
pratib; eligi-
nosis.

Qualitates
ex eodem.

Amaritudo
indicat cali-
dam esse &
siccam, eius-
demque tem-
peratura, cuius
Morsus
Diaboli.

Ex Matthio-
lo.

Decoctum
illius potum
quotidie,

aut succus herbae, per se, aut Unguentis addi-
tus & illitus mirifice prodest aduersus sca-
biem. Anthracibus pestiferis & tiliter illinitur:
adeo ut lethales abscessus trium horarum
spatio prorsus abolere existimetur. Potus, pro-
dest omnibus pectoris vitis.

Pery

Periclymenum, Syluæ Mater, Volucrum
maius, Matriflylua, Lilium inter spinas, seu
Caprifolium: Græcis, περικλυμένον: Italis,
Vinci bosco, Matrifelua, seu Caprifoglio:
Germanis, Geyszblatt: Hispanis, Madresyl-
ua: Gallis, Cheureueil.

Locus.

Nascitur in Diof. li. 4.
aruis ac Se- cap. 13.
pibus, conuol-
uens se admi-
niculis pro-
pter asiden-
tibus.


Qualitates.

Fructus & Gale. li. 8.
fo'ia adeò ve simpl. me-
hementer in dica.
cidētis, simul
& excalsa-
cientis facul-
tatis sunt, & t
si plusculum
bibatur & ri-
nam sangui-

noletiam efficiant: quanquam principio & ri-
nam tantum moueant. Illita cum oleo excal-
faciunt. Semen quoque desiccat. Dosis est
drachma pondus cum vino, si tamen copio-
sus bibatur sterilitatem adfert.

F 2

Trib



Tribulus terrestris: Græcis, τριβον & χερσαίος: Arabibus, Hasach, seu Haserk: Italis, Triboloterrestre: Germanis, Vvaltek letlin: Gallis, Chauffetrappes, seu Saligotz terrestres.

Theoph.
libr. 6. de
nat. plan.
cap. 5.

Locus ex Theophrasto.

Apud septa
villarum e-
rumpit: & iu-
xta Amnes
& rudera na-
scitur.

Qualitates.

Tribulus ex
humida essen-
tia modicè fri-
gida, & sicca
non mediocri-
ter, & ipsa fri-
gida, componi-
tur. In terre-
stri tamen su-
perat terrenū
frigidū, quod

& adstringens ostendimus: in aquatico verò
aqueum. Fructus terrestris, cum sit tenuium
partium, potus, lapides in renibus comminuit.
Congruunt autem & trique contra omnes in-
fluxus.

Tri



Dio. li. 4.
cap. 13.
Gal. li. 7.
sim. nic.

Tribulus aquaticus: Græcis, *τρίβολος ἑνὶ-
 ἄλγος*: Italis, Tribolo aquatico: Germanis,
 Vvaßernusz, Seck nusz, aut Kern nusz: Hi-
 spanis, Abroyos, & Abrollos: Gallis, Sali-
 gotz, Escharbotz, Chastaignes d'eau, seu
 Truffles d'eau.



Locus.

Aquis & fluminibus familiare.

Qualitates.

*Huc refer omnem Tribuli terre-
 stris historiam.*

Dio. li. 4.
 cap. 13.

F 3

axi

Saxifraga: Grecis, σαξίφαγον, καὶ σαξίφραγον: Italis, Saffifragia: Germanis, Steyn brech Gallis, Perce-pierre.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 15.

In petris nascitur & asperis locis : maximéque in maritimis , & ad fluviorum ripas asperas.

Qualitates ex Matthiolo.

Expetitur ad renum & Vesica calculos comminuendos , & ad Urinam remoratam ciendam.

Limo

Limonium, Pyrola, Beta syluestris, Tintinnabulū terræ, officinisque, Behen rubrum: Græcis, λειμώνιον: Italis, Behen rosso: Germanis, Glid vveych: Gallis, Bete des Prez.

Locus.



Nascitur in Dio. ll. 4. pratis, & palustribus. cap. 16.

Qualitates.

Semen, & potestate austerum, Gal. li. 7. simp. me. cæliacis, dysentericis, sanguinem spuentibus, et ad profusum muliebrem exhibet acetabuli mensura.

Ex Fuchio.

Folia & semen valde adstringunt: semen autem desiccatur tertio ordine.

F 4

Limo

Limonium alterum.



Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in pratis & liginosis, & in palu-
stribus.*

Qualitates.

Eandem vim habet quam Limonium prius.
Cario

Cariophyllata. Herba benedicta, aut Sa-
na munda. Italis, Gariofillata : Germanis,
Benedictē vyurtz: Gallis, Benoisfe, Galliot,
aut Resfize.

Locus ex Fucio,



Seritur in hor-
tis ad intin-
ctus: & spon-
te nascitur in
montibus, lo-
cisque opacis
& iuxta se-
pes.

Qualitates
ex eodem.

Desiccat &
calefacit secū
do ordine. Fo-
lia & radix
gustu valde
adstringunt.
Ex Matthio-
lo.

Bibitur ad interna thoracis vulnera, ad
Enterocelas, & ad dysentericos & celiacos
affectus, Radix attenuat, discutit, adstringit,
& roborat.

F 5 Glad

Gladiolus segetalis, aut Machæronion:
 Græcis, ξιφίον: Arabibus, kassiflon: Italis, Gla-
 diolo, seu Monacuccie: Germanis, Schvver-
 tel: Gallis, petit Glayeul de marais.



Locus.

Nascitur in Arvis, & Pratis.

Qualitates.

Dio. li. 4.
 cap. 20.
 Gal. li. 8.
 simpl. me-
 dica.

*Radix superior attrahentem, digerentem,
 & exiccantem facultatem possidet.*

Spa

Sparganium, seu Carex: Græcis, σπάργαν-
ιον: Arabibus, Safarheramon: Germanis,
Riedtgrasz.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montium radicibus.

Qualitates.

Desiccantis est facultatis.

Gal. li. 8.
simp. me-
dica.

Spatu

Spatula foetida, aut, Sphatuda foetida
Græcis, ξυρίς: Gallis, Glayeul puant.

Locus ex Matthiolo

Nascitur in
aquosis.

Qualitates

Gal. li. 3.
sim. mc.



Xyris te
nuium par
tium, attra
etoria, dige
rendi, ac ni
mirum etiam
desiccandi ej
facultatis, c
radix, tum
multò etiam
magis eius fr
ctus: qui qui
dem & Uri
nam ciet, &

lienes induratos sanare potest.

Ex Fuchfio.

Insignis est acrimonia, Vehementer enim
linguam vellicat & incendit: ex quo conjici-
citur calidam & siccam esse.

Anchu

Anchusa, Onoclaea, seu Calyx: Græcis,
 ὄχθρα: Italis, Ancusa: Germanis; Rott-
 schen zung: Hispanis, Soagem: Gallis, Or-
 anette.

Locus.

Leto solo Dio. li. 4.
 nascitur. cap. 23.

Qualitates.

Radicem ha-
 bet admodum Gale. li. 6.
 refrigerantem, simp. me.
 & desiccantem, tum ad-
 stringentem,
 & subama-
 ram, tum quæ
 sufficiat exte-
 nuandis, &
 extergendis hæ-
 moribus bilio-
 sis, corpori-
 busque con-
 densandis. Folia imbecilliora sunt radice: ad-
 stringunt tamen & ipsa, & desiccant.

Anchu



Anchusa altera, Alcibiadion, seu Ono-
chelos: Gallis, Seconde Orcanette.



Locus.

In sabulosis nascitur.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 23.

Gal. li. 6

simp. me.

Onochelos calidior est Lycopside, & magis medicata: nam plusculum & gustu ipso protinus acrimonia. Porro Lycopsis refrigerat & desiccatur: magisque radix eius quam Onoclea adstringit.

An

Anchusa tertia, siue Anchusa parua.



Locus.

In sabulosis nascitur.

Qualitates.

*Alcibiadio persimilis est: Verum calidior
 & amarior, magisque medicata: ac proin
 e ad latos lumbricos peridonea.*

Gale. li. 6.
 simp. me.

Ex Dioscoride.

*Si manducatum semen in serpentis fauces
 inspuatur, eam interficiet.*

Dio. li. 4.
 cap. 3.

Echium

Echium, Dorias, Alcibium, seu, Buglossum agreste: Græcis, ἐχίον: Italis, Buglosa saluatica: Germanis, Vvild ochsenzung: Hispanis, Yerua della biuora: Gal-
lis, Buglose sauuage.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur vbi-
que ferè in
viis, & semi-
tis, locisque a-
spersis & in-
cultis.

Qualitates
ex Paulo.

Herba non
modo à serpen-
te demorsis, cū
vino pota, au-
xiliatur: sed
presumentes
quoq; ex ictu
nihil molestiæ

pati sinit. Semen idem præstat munus.

Ex Fuchfio.

Gale. li. 5.
simp. mc.
cap. 20.

Lac generat. Ex Galeno ergo calefacit, nec
tamen valde desiccatur.

Ocuma



Agi. li. 7.

Ocimastrum, seu, Ocimoïdes: Græcis, *οκμοειδής*, ἢ, *φιδισαίριον*: Italis, Basilico salua-
 co. Germanis, Vvild Basilien: Hispanis, Al-
 lahaqua montefina: Gallis, Basilic sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Passim nascitur inter segetes, prope septa,
 Et in agrorum marginibus.

Qualitates.

Radix supernacanea est: semen autem te- Gal. li. s.
 nuum partium, Et desiccantis citra morda- sim. me.
 citatem facultatis est.

G

Ocimum

Ocimum aquaticum, seu Echinus: Græcis, ἔγυϑ: Italis, Basilico aquatico: Hispanis, Basilgo de agoa: Gallis, Basilic d'eau.



Locus.

Nascitur apud fontes & fluuios.

Qualitates.

*Semen acerbum est: ac proinde repellentis
& exiccatoria facultatis.*

Dio. li. 4.
cap. 27.
Gale. li. 6.
simpl. me
dica.

Gra

Gramen: Græcis, ἀγρωγις: Arabibus, Van-
n, Negen, Negien, Thel, Kel, seu, Ne-
Italio, Gramigna: Germanis, Grafs: Hi-
anis, Grama, & Gramenha: Gallis, Dent
Chien.



Locus.

Iuxta Vias Dio. libr.
nascitur. 4. ca. 28.

Qualitates.

Radix me- Gale. li. 6.
diocriter frigi- simp. me.
da est & sic-
ca, mordaci-
tatem quan-
dam exiguam
& partium te-
nitatem ob-
tinens. Herba
primo quidem
excessu refrige-
rat: in humi-
ditate & sic-
citare modera-

Semen imbecillum est. Radix esculenta est
ridis: dulcis enim est instar aquæ: sed ta-
men acre quiddam exiguum, & subacer-
um obtinet.

G 2 Si

Sideritis prima, aut Sideritis Heraclea
seu Herculea : Arabibus, Sidrichis.



Locus.

Nascitur in petrosis.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 29.

Gal. li. 8.
simp. me.

*Sideritis habet quidem etiam abstergendam
quandam facultatem. sed plurima eius pars
humida est, & mediocriter frigida. Paucula
Verò inest adstrictio: quare phlegmonem se-
dat & glutinat.*

Sideri

Sideritis altera.



Locus, ex Matthiolo.

Non admodum frequens est planta.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 30.

Huius vis, foliorumque ad vulnera pra-
pua est: cetera priori Sideriti similis.

G 3

Sid

Sideritis tertia, quibusdam,
Heraclea.



Locus.

Nascitur in maceris, & vineis.

Dio. li. 4.
cap. 31.

Qualitates ex Diosco.

*Huius ea vis est, ut quamvis recenti Vul-
neri imposita, sanguinem supprimat: cetera
Sideriti prima similis.*

Achillea

Achillea Sideritis: Græcis, ἀχιλλεύς: Arabibus, Sichritis, & Egilos.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in incultis & campestribus.

Qualitates.

Achillea Sideritin Viribus emulatur: ceterum adstrictione exuperat: quare ad sanguinis eruptiones, Dysenterias, & muliebrem profluvium congruit.

G 4 Rubus

Rubus, aut Sentis: Græcis, βάρβ: Arabi-
bus, Buléich, & Haleich: Italis, Rouo: Ge-
manis, Bramen, aut, Katzen: Hispanis, Ca-
za: Gallis, Ronce.

Locu

Theo. de
na. plan.
li. 3. c. 18.

Gal. li. 6.
sim. me.



Sepibus, fr
tetiſq; impl
catur, aut h
mi ſerpit, au
in altum toll
tur, arboris i
ſtar crasseſcēs
Qualitates.

Folia, ger
mina, flos, fru
ctus, & radi
qualitate ad
stringente pa
ticipant, eaq;
non obſcura
Sed folia mol
lia & recen
nata plurimi

in ſe habent ſubſtātia aquea, parum verò ad-
ſtrictionis: eadem ratione & germina: qua
constant ex terrea & frigida eſſentia, & a-
quea, tepida. Fructus maturus nō parū habet
ſucci calidi tēperati, modiceq; adſtringit. Im-
maturus ſalde exiccatorius eſt, ob terrea qua
abūdat ſubſtātia. Flos fructui imaturo par eſt.
Radix autē adſtringit, & tenuiū eſt partiū.

Helxine cissampelos, Conuoluulus minor, Volubilis media, siue Vitealis: Græcis, *ἡλξίνη κισσάμπελος*: Arabibus, Acfin: Italis, Vilucchio minore, seu, Minutola: Germanis, Mittel Vvind: Hispanis, Campanella Yerua: Gallis, Campanette, Clochette, Viereole, seu petit Liset.


Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
sepibus, Vine- cap. 35.
tis, & segeti-
bis.

Qualitates.

Digerendi Gal. li. 6.
facultatem ha sim. me.
bet.

Ex Fuchfio.
Calefacit.



G 5 Num

Nummularia, Centummorbia, quibusdam, species Lunariae minoris: Italis, Nummularia: Germanis, Pfenningkraut.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in
scrobium mar-
ginibus, praesertim
Oligine
madentibus.

Qualitates.
ex Fuchio.

Valde ad-
stringit gustu:
ex quo desicca-
re videtur se-
cundo aut ter-
tio ordine.

Ex Matthio-
lo.

Glutinandi & cohibendi facultate prae-
ta est.

Eupa

Eupatorium Græcorum, Hepatorium,
 Busue, Agrimonia: Græcis, Ἀπατῶρον: Arabi-
 bus, Cafat, Cifit, seu, Gafet: Italis, Agrimo-
 nia: Germanis, Odermenig: Hispanis, Agra-
 monia: Gallis, Agrimoine.

Locus ex Fuchfio.

Nāscitur in
 Montibus, cam-
 pestribus, pra-
 tisq³, & secus
 vias.

Qualitates.

Eupatoriū Gale. li.
 herba tenuium s. simpl.
 partium, inci- med.

dendi, exter-
 gendique facul-
 tatē citra ma-
 nifestam cali-
 ditatem obti-
 net. Quocirca
 obstructions

iocinoris expurgat. Inest ei & adstrictio mo-
 dica, per quam robur visceri addit.

Eupa



Eupatorium Auicennæ, siue, Eupatorium Officinarum, Ruellio autem falsò Hydropiperis secunda species.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in vliginosis locis, & in scrobium marginibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Ex amaritudine & odoris præstantia qua pollet tota planta, percipi potest id & obstructions aperire, & crassos lentosq; humores mirificè incidere posse.

Poten

Potentilla, Protentilla, seu Agrimonia
sylvestris, aut Tanacetum sylvestre: Germa-
nis, Gren sing: Italis, Potentilla: Gallis,
Agrimoine sauuage.

Locus ex Matthiolo.

Nascitur in
Oliginosis lo-
cis, & propter
semitas.

Qualitates
ex eodem.

Vniuersa
planta adstri-
ctoria et exic-
catoria facul-
tate pollet. Id-
circo mulierū
profluvia, &
dysenterias co-
hibet, & Vul-
nera recentia
glutinat. Pro-
dest item &

sanguinem reijcientibus. Pudendorum & oris
Vlcera sanat. Firmat commotos dentes. strin-
gitq; gingiuas, & dentium dolorem mulcet,
si eius decocto os saepius colluatur.

Quinq



Quinque folium: Græcis, πεντάφυλλον: Ita-
lis Cinquefoglio: Germanis, Vveisz funff,
seu, Fingerkraut: Hispani, Cinco en rama:
Gallis, Quintefueille.

Locus.

Diofc. li.
4. ca. 38.

Gal. li. 8.
sim. mc.



Nascitur in
rignis, & a-
quarijs ducti-
bus.

Qualitates.

Radix de-
siccatur vehemē-
ter: minimum
verò acris est:
quare in mul-
to est & su, ve-
lut alia quo-
que omnia,
que cum sint
tenuium par-
tium, citra
morsum desiccant. Est enim hæc radix desicca-
toria ex tertio quodammodo ordine, mini-
mum habens evidentis qualitatis.

Diapen

Diapensia, siue, Sanicula: Germanis, Sannickel: Gallis, Saniclet.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
Syluis opacis,
in campestribus, & prope
aqueductus.

Qualitates
ex eodem.

Amaritudinem & ad-
strictionem gu-
stus praese fert:
proinde vide-
tur calefacere
& siccare se-
cundo ordine.

Ex Matthiolo.

Chirurgici maximè vtuntur ad intrinseca
Vulnera, enterocelas, & fistulas, eius puluerē,
vel decoctum potui exhibentis: quin etiam ea
vtuntur ad morbos omnes vbi adstringenti
solidantique medicamine sit opus.

Fra

Fragaria: Græcis, *νύμφη* & : Italis, Fraghe:
Germanis, Erdt berkraut: Gallis, Fraifier.

Locus ex Fuchfio.



Sponte na-
scitur in syl-
uis, dumetis,
montibus opa-
cis, & secus
vias: seritur
etiamnum in
hortis.

Qualitates
ex Matthiol.

Fragaria
refrigerat or-
dine primo, sic-
catq; secūdo.
Ex Serapione.

Calefacit &
siccat secundo
ordine.

Ex Fuchfio.

Folia, gustu, amara sunt & adstringen-
tia: Unde conijcere licet desiccatoria esse, non
autem humida.

Euph

Euphrasia, Euphrasia, siue Ocularia:
Græcis, εὐφρωσίη, ἢ οὐφθαλμική: Italis, Eufra-
sia: Germanis, Augentrost: Gallis, Eufraise.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur te-
merè in Pra-
tis, & Clivo-
sis insolatis.

Qualitates
ex eodem.

Desiccat &
calefacit ma-
nifestè.

Ex Matthio-
lo.

Sicca & re-
cens in cibis
diutius sum-
pta, vel in me-
dicamentis,
præstat Valen-
ter ad omnia

impedimenta quæ oculorum claritati officiunt.
Vinum quod ex ea fit senum oculos inuenescere facit.

H Lolium

Lolium murinum, siue Hordeum murinum: Græcis, *φοίνιξ*: Italis, Gioglio saluatico: Germanis, Vvaldt trohr, seu Bintzenheimer: Gallis, Yuraye sauuage.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 39.

Nascitur in aruis, teclis-
que recenter
illitis.

Qualitates
ex Plinio.

Trita, è vino
pota herba,
preclarè ciet
menses.

Ex Dioscori-
de.

Pli. li. 21.
cap. 25.

Pota in vino
austero alui

profluuium, & emanantem Vulua sangui-
nem sistit, Vrinaq; impetus inframit.

Rhodia



Rhodia radix : Græcis, *podia piza*: Italis,
Radice Rhodia: Germanis, Rosen vvurtz.



Locus ex Matthiolo.

Non adeò vulgaris est planta : etsi ea facili-
tè in Apennino & Gargano montibus nasci-
tur.

Qualitates.

Tenuium partium, & discutientis est facul-
tatis. Calefacit autem secundo ordine, aut
tertio incipiente.

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

H 2

Equi

Equisetum, seu Cauda Equina: Græcis, *ἵππυγίς*: Arabibus, Dhenben alchail, Dhenib alchi, seu Daneb alchail: Italis, Asperella, seu Coda di Cauallo: Germanis, Rosz schvantz: Hispanis, Coda de Mula, seu Rabo de Mula: Gallis, Queue de Cheual, Prelle, seu Cheualine.

Locus.


In riguis
 & scrobibus
 nascitur.

Qualitates.
 Adstringen-
 tem cū ama-
 ritudine facul-
 tatem possi-
 det: ac proin-
 de Valenter,
 simulque ci-
 tra mordaci-
 tatē exiccat.
 Vulnera ma-
 xima, cata-
 plasmate im-
 posita, conglu-
 tinat, etiam

si praefectos esse nervos contingat: Præterea
 Enterocelas mirificè conglutinat.

Coc

Diosc. li. 4.
 cap. 42.



Coccum infectorium, Granum infecto-
rium, siue Coccus Baphica, Græcis, νόκκος
βαφικῆ: Arabibus, Charmé, Kermes, & Cher-
mes: Italis, Grana de Tintori: Germanis,
Scharlach ber: Hispanis, Grana para tennir,
& Grana en Grano: Gallis, Graine d'escar-
latte.

Locus.

Optimum gi Dio. li. 4.
gnitur in Ga cap. 43.
latia, & Ar-
menia: dein-
de Asia, &
Cilicia: Ulti-
mum ex omni-
bus Hispani-
cum.

Qualitates.

Granum tin Gale. li. 7.
ctorium ad simpl. me
stringentem dica.
simulque ama-
ram faculta-
tem possidet.
Et raque sine
morsu desic-

cat: proinde ad ingentia vulnera congruit,
praesertimque neruorum, tritum cum aceto,
aut Oxymelite.


H 3

Pimpi



Pimpinella saxifragia, Saxifragia hircina,
sive Sanguisorba : Germanis , Hergots
baertlin.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur in
Campestri-
bus, incultis,
siccis, & locis
insolatis.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Radix in
qua vis tota
consistit excal-
facit, siccit-
que ordine se-
cundo com-
pleto, aut sa-
nè tertio inci-
piente. Præ-
stat ad renū

& Vesicæ calculos: expedit enim renes & Vesi-
cam calculis, & Urinam remorata pellit.
Succus radicum ex Vino haustus deleterijs me-
dicamentis & Venenosorum animalium mor-
sibus prodest: qua ratione ad pestilentiam ra-
dices has laudibus miris efferunt.

Pimpi

Pimpinella, Pampinula, seu Bipennula:
 Italis, Pimpinella, aut Solbastrella: Germa-
 nis, Bibenell: Gallis, Pimpenelle.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur fre-
 quentissima
 in Frutetis,
 et locis opacis:
 seriturque in
 hortis ad ace-
 tarias.

Qualitates
 ex eodem.

Calefacit
 & desiccatur se-
 cundo ordine
 intenso, aut
 tertio inci-
 piente.

Ex Matthio-
 lo.

Gustata non
 leuiter adstringit, & lentoris copiam prabet:
 Unde facile conijcitur eam esse adstrictoriae
 facultatis. Vulnere igitur & Ulcera sanat.
 Contagiosis, pestilentibusque febribus maxi-
 me commendatur.

H 4

Tra

Tragum, siue Scorpio, aut Traganos: Græ-
cis, τράγος ἢ σκῆνος οὐροῦ.



Locus.

Nascitur in maritimis.

Qualitates ex Diosco.

Dio. li. 4. Racemorum acini decem ex Vino poti, cælia
cap. 46. cis & fæminis fluxione Vulua laborantibus
auxiliantur.

Iuncus

Iuncus: Græcis, *ονύκας*: Arabibus, Dis: Ita-
lis, Giunco: Germanis, Bintzen Schmelen:
Hispanis, Ionco: Gallis, Ionc.

Locus ex Matthiolo.



Propter sta-
gnantes a-
guas nasci-
tur.

Qualitates.

Iuncus steri- Gal. li. 8.
lis nullius in simp. me.
medicina & sus
est, Semen fer-
tilis constat
ex temperie
terrena, essen-
tiâque leuiter
frigida. & a-
quea leuiter
calida: Et &
inferna desic-
care possit, &

sensim frigidos ad caput vapores submittere,
quibus somnum conciliet.

H 5

Hepa

Hepatica, siue Lichen: Græcis, λειχήν: Arabibus, Azez alsacher: Italis, Lichene: Germanis, Stein laberkraut, seu Brunnen leberkraut: Hispanis, Epatica, seu Figadella: Gallicis, Epatique, seu Porcorau.

Locus.

Diosc. li. 4.
cap. 48.

Gale. li. 6.
amp. mc.



Aspergine
sis petris ad-
heret, Et Mu-
scus.

Qualitates.

Extergen-
tem ac modi-
cè refrigeran-
tem faculta-
tem habet, &
tramque se-
rò resiccantem. Porro
quod ex tali-
bus substan-
tijs componi-

tur, aduersum esse inflammationi nil mi-
rum est.

Pul

Pulmonaria: Gallis. Herbe aux Poulmons.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in opacis.

Qualitates ex eodem.

Mirificè confert ad Pulmonis Ulcera sananda, & ad sanguinis reiectionem. Qua in re decoquitur ad dimidias, datúrque decoctum potandum addito saccharo: Vel succus ex ea expressus serapj modo cum saccharo paratus.

Saxi

Saxifragia, Ruta parietum, seu Paronychia: Græcis, *παρονυχία*: Gallis, Percepierr

Locus ex Matthiolo

Dio. li. 4.
cap. 49.

Gal. lib. 8.
simp. mac.



Nascitur
petris, & si
cis arborum
truncis, &
Sylvis opacis
inter saxa.

Qualitates

Paronychia
ab effectu no
minata est: s
nat enim Pa
ronychias, fa
uōsque. V
eius est tenui
partium, &
exiccatoria
morsu vacās

Digerit etiam: estque calida & sicca tertio
ordine: tenuiūmque partium.

Heli

Helichrysum Latinis, & Græcis: Galeno,
maranthum croceum.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
asperis, & tor cap. 52.
rentium al- Pli. li. 21.
ueis, & se- cap. 25.
cundum Pli-
nium, in fru-
tetis.

Qualitates.

Facultatis
est incidentis, Gale. li. 6.
& extenuan- simpl. me
tis. Coma igitur dica.
eius men-
ses cum vino
potæ educit, et
grumos san-
guinis liqua-

re creditur, non solum in Ventre, sed & in
Vesica, potæ cum mulso: desiccaturque, simplici-
ter potæ, omnes fluxiones, quanquam sit sto-
macho infesta.

Ama.



Amarantum purpureum : Italis, Fio
velluto: Germanis, Samat bluom, seu, Flo
ramor : Gallis, Passé-velours.

Locus, ex Fuchfio



Seritur in
hortis, ad co
ronamēta, &
Scliginosis so
lōque tenac
gandet.

Qualitates
ex Matthio
lo.

Huic facul
tas inest fri
gida & sicca.
proinde flos e
ius potus, cœ
liacos & dy
sentericos in
uat, mensūq;
abundantiam cohibet, & albas ſteri fluxio
nes. Quinetiam cruenta expuentibus prodest.
præsertim si in pulmone vel pectore ſas ali
quod fractum fuerit.

Chry

Chrysanthemum, Caltha, seu Buphthalmos Latinis, & Græcis.



Locus.

Propter Oppida nascitur,
Qualitates, ex Dioscoride.

Dio. li. 4.
cap. 53.

Flores cum cerato triti Steatomata discu-
tere produntur. Regio morbo correptis colo-
rem bonum breui reddunt, si sequente longo
balnei & su, post exitum ebibantur.

Agera

Ageratum : Italis , Herba Giulia : Offi-
cinis, Eupatorium Mesue.



Locus ex Matthiolo.

Passim nascitur.

Qualitates.

Calc. li. 7. Digerit, & inflammationes leuiter quo-
simp. meo dammodo resoluit.

Ageratum

Verbenaca recta, Verbenam, Columbi-
a, siue, Columbaris: Græcis, *ωει τερεν*
bos: Italis, Verminacola, Berbena, & Ber-
renaca: Germanis, Eisen kraut: Gallis, Ver-
maine masle.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
aquosis. cap. 55.

Qualitates.

Vim habet Gale. li. 8.
adeo exiccantem, & vul- & li. 2. de
nera glutinet cōp. me-
Verbenaca re dica. sec-
cta maximè loc.
discutit, &
perfectè corro-
borat, præser-
tim viridis,
imò & arida
cum radici-
bus & simul
cum Serpyllo
oleo incocta.

1 Astraga



Astragalus Latinis, & Græcis: Gallis
Chiches de Montaigne.



Locus.

Diosc. li. 4.
cap. 57.

Nascitur in Ventosis, opacis, & nivalibus.
Qualitates.

Gale. li. 6.
simpl. me-
dica.

*Radices habet adstringentias: estque in nu-
mero non instrenuè exiccantium. Nam Ulce-
ra Vetera cicatrice obducit, & alium fluxu
tentatam sistit, si quis in vino decoctam ra-
dicem bibat.*

Hiacin

Hyacinthus Latinis, & Græcis: Italis, Ci-
bolle Canine, seu, Hiacyntho: Germanis,
Mertzen bluomen: Hispanis, Mayos flores:
Gallis, Iacinthe, seu Vaciet.

Locus, ex Matthiolo.

Nascitur ubi-
que in Campe-
stribus inter
segetes, & in
Sylvis proue-
nit.



Qualitates.

Radix pri- Gale. li. 8.
mi est ordinis sim. mc.
in desiccando,
secundi Verò
completi, aut
certè tertij in-
cipientis in re-
frigerando.

Itaque pueros
diutissime ser-

uare impuberes illi cum Vino creditur. Se-
men leuiter extergit & adstringit: ordine
tertio quadamtenus desiccans: ceterum in me-
dio consistens caliditatis & frigiditatis.

1 2

Papa

Papauer erraticum, seu Papauer Rhoëas
Græcis, *μῆκων πόας*: Italis, Papauero salua-
tico: Germanis, Klapper rosen: Hispanis,
Amapollia, seu Papoulla: Gallis, Pauot sau-
uage, Confanons, Ponceau, seu Coquelicot.

Locus.

*Vere in Ara-
uis cum hor-
deo nascitur.*

Qualitates.

*Semen & a-
lidè refrige-
rat: ita & ne-
quaquam eo
quis innoxie
solo & ti possit,
sicut satiuo si-
ue domestico,
melli admi-
scens. Admo-
dum verò, si
ita sumptum
sit, somnum
conciliat.*

Papa

Dio. li. 4.
cap. 59.



Papauer hortense, siue Satiuum: Græcis, *κνίωρ ήμερος*: Arābibus, Thaxthax, seu Chas-
has: Italis, Papauero domestico: Germa-
nis, Mag somen: Hispanis, Dormidera: Gal-
lis, Pauot blanc, seu Pauot priué.

Locus.
Hortense est.

Qualitates.

Papauerum Dio.li.4.
facultas refri cap.60.
generatoria est.
Semen me-
diocriter som-
num conci-
liat: proinde
pani ipsum in
spergunt, ac
melle macera-
tum edunt.

Ex Fuchſio.

Refrigerat
quarto ordine, sicut cetera Papauerum ge-
nera.

1 3

Papa



Papauer corniculatum, siue cornutum:
Græcis, *μίνων κερὰ τῆς*: Arabibus, Alma-
charam: Italis, Papauero cornuto: Germa-
nis, Gelbolmagen, Moen, &, Bcel magfa-
men: Hispanis, Dormidera marina: Gallis,
Pauot cornu.

Dio. li. 4.
cap. 61.
Gal. li. 7.
sim. me.



Locus.

Nascitur in
maritimis &
asperis,

Qualitates.

Vim habet
incidendi &
abstergendi.
Radix herba,
in aqua deco-
cta, ad dimi-
dium, hepati-
cos affectus ad-
iuuat. Folia,
& flores sor-
dida admodū
& maligna

Ulceri inuuant. Sed ab his abstinere oportet Ul-
ceribus iam expurgatis: adeo enim absterge-
re valent, Et puræ quoque carnis nonnihil eli-
quent.

Hype

Parthenium, seu, Matricaria: Græcis, *wag-*
vlop: Arabibus, Achuen, Vchuen, Achuan,
 ue, Alachuan: Italis, Matricaria, & Ama-
 ella: Germanis, Muotter kraut, seu Mertrâ:
 Gallis, Matricaire, Maronne, seu, Herbe
 le la Mere.

Locus ex Matthiolo.

*Seritur in
 hortis, & spon-
 te prouenit in
 locis calidis.*

Qualitates.

*Bilē & pi- Dios. li. 3.
 tuitam extra cap. 138.
 hit non secus
 atque Epithy-
 mum, siccata,
 & pota cum
 Aceto mulso.
 Decoctum in-
 sessionibus ac-
 commodatur
 ad inflamma-
 tiones, et duri-
 tiē Vuluarū.*



Ex Fuchſio.

Calefacit & desiccatur moderatē.

1 4 Hyo

Hyosciamus, Apollinaris, Altercum, si-
ne, Faba Suilla: Græcis, Ὑοσνύαμος: Arabibus
Bengi: Italis, Iusquiamo: Hispanis, Velenho
Gallis, Iusquame, seu, Hanebane: Germa-
nis, Bilsomen, seu, Bilsen.

Locus ex Fuchfio,

Nascitur in
Agrorum &
scrobium mar-
ginibus, & in
ter ruderibus.

Qualitates.

Hyosciamus,
cui semen a-
trum est, insa-
niam ac sopo-
rem adfert.
Hinc autem,
is cui semē me-
diocriter fla-
uum est, pro-
pinquam fa-

cultatē obtinet. Vtrique fugiendi sunt, & inu-
tiles, Venenosi & deleteri. Caterum cui semē
ac flos candidus est, ex tertio quodammodo
est ordine refrigerantium. Oleum, quod ex se-
mine elicatur psilothrum est.

Psyl

Gale. lib.
8. simpl.
medica.



Psyllium, siue herba pulicaris: Græcis, *ψύλλιον*: Arabibus, Bazona chathona, seu, Bezzer cothume: Italis, Psillio: Germanis, Psyllien kraut: Hispanis, Zargatona: Gallis, Herbe à puces.

Locus

In aruis Dios. lib.
 & incultis na 4. cap. 55
 scitur.

Qualitate.

Semen ad Galen. li.
 modum stile 8. simpl.
 est, ex secundo medica.
 refrigerantiū
 ordine: in de
 siccando Verò
 & humectan-
 do medium
 quodammo-
 do est, & sym-
 metrum.

I 5 Sola



Solanum hortense, Solatrum, siue Morella : Græcis, *σπύχνος κηπάριος*: Arabibus, Hamethanaleb, Hameb alchahai ch: seu, Hanaalalthaleb: Italis, Solatro: Germanis, Nachtschadt Hispanis, Yerua mora: Gallis, Solatrum, seu, Morelle.

Locus ex Fuchfio.

Nascitur
passim in opa-
cis, & secus
vias.

Qualitates.

Vtimur eo
ad omnia qua
refrigerari, ad-
stringique po-
stulant: potest
enim hæc duo
ordine secun-
do: in gradu
verò siccitatis
& humidita-
tis ferè symme-

Sola



trum est.

Galen. li.
5. & 8.
Sim. me.

Solanum halicacabum, Vesicaria, Halica-
cabus, siue Alkakēgi: Græcis, σπύγρος ἀλινά-
καβος, ἢ φισαλῖς: Arabibus, kekengi, Alkekē-
gi, & Kekenegi: Italis, Halicacabo: Ger-
manis, Iuden Kirschen, seu, Boberellen:
Hispanis, Bexiga di perro: Gallis, Bague-
naudes.

Locus, ex Fuchfio.

Nascitur in
Vinetiis:

Qualitates.

Halicaca- Gal. li. 8.
bum in foliorū sim. me.
facultate hor-
tensi Solano si-
mile est, fru-
ctum habens
cienda Urina
idoneum: pro-
inde multis cō-
positis facul-
tatibus, quæ
ad iecur, ad
Vesicā, & re-

nes accommodantur, miscetur.


Solan



Solanum somniferum, siue, Solatrum
foporiferum: Græcis, *σπύχρος*: ὑπνωσινός: Gal-
lis, Solatrū dormitif: Germanis, Dollkraut,
aut, Schlaffkraut.

Dios. lib.
4. ca. 68.

Gal. lib. 8.
sim. med.



Locus

Nascitur in
saxis, non pro-
cul à Mari.

Qualitates.

Papaueris
sacco persimi-
lis est, cortex ra-
dicis, nisi quod
eiusque imbe-
cillius est, Et
tertij habea-
tur ordinis re-
frigerantium,
cū Opium sit
quarti. Semen
Urinam ciendi
vim habet, Ve-
rū si plus duo-

decim Corymbis hauseris, dementiam furiam
ve asciscet. Radicis cortex desiccat secundo
ordine completo, Et tertio incipiente: refrige-
rat verò secundo incipiente. Quatuor drach-
ma sumpta mortem inferunt, pauciores insa-
niam. Vna innoxie sumitur.

Solan

Solanum somniferum alterum.



Locus.

Nascitur inter saxa.

Qualitates.

*Huc refert omnem Solani soporiferi histo-
riam.*

Sola

Solanum quintum, siue Solatrum ma-
ius: Gallis, Solatrum dormitif communis
Italys, Herba bella Donna: Quibusdam
censetur tertia Theophrasti Mandragora.

Locus.

Theo. li.
6. de na.
plan. c. 2.



Nascitur in
Montibus in-
ter saxa, &
seritur in hor-
tis.

Qualitates
ex Matthiolo.

Eandem
Sim habet
quam Solanum
somniaficum.
Eius bacca, lar-
gius sumpta,
interficiunt,
facto in expu-
gnabili som-
no.

Stra

Stramonia: Germanis, Rauchpfeffel, aut
 Stechoepffel: Gallis, Pome espineuse: Italis,
 Pomo spinoso.



Locus ex Fuchſio.

Seritur in hortis.

Qualitates ex Matthiolo.

*Plerique exiſtimant hanc Viribus Solano
 non diſſimilibus pradiſtam eſſe.*

Man

Mandragoras mas siue candidus, Antime-
lus, aut Circea: Græcis, *μανδραγόρας*: Arabi-
bus, Iabora, & yabroach: Italis, Mādragora:
Germanis, Alraun: Hispanis, Mandracola:
Gallis, Mandragore, seu, Mandegloire.

Locus ex Matthiolo.

*Nascitur in
Montibus, ma-
ximè in Gar-
gano Mote A-
pulia: & seri-
tur in hortis,
foueturque in
fictilibus, spe-
ctaculi gratia
Qualitates.*

*Vincentem
habet faculta-
tem refrigera-
toriam, adeo
ut tertij sit or-
dinis refrige-
rantium. Ve-
runtamen &*

*caliditatis cuiusdam particeps est, & in pri-
mis humiditatis: proinde soporem conciliandi
vim ea habent. Radicis cortex, cum sit Valen-
tissimus, non tantum refrigerat, sed & desic-
cat. Reliquū, quod intus est, imbecillū existit.*

Man



Gale. lib.
7. simpl.
medic.

Mandragoras niger, seu foemina : Gallis,
Mandegloire femelle.



Locus, Qualitates.

Huc refer omnem Mandragora
candidi historiam.

K

Mala

Mala infana : Italis, Melanzana, seu Pe-
tranciani : Germanis, Melantzan : Gallis,
Pommes d'Amours.

Locus ex Fuchfio.



Seruntur et
Meloepones,
et Cucume-
res.

Qualitates
ex eodem.

Frigida sunt,
et humida.
Ex Matthio-
lo.

Sunt qui
stantur ad
Venerem exci-
tadam, quod
flatuosa sunt
et concoctis
difficilia. Fre-
quentius ta-

men mansa biliosos generant humores, pa-
Aulcen-riuntque viscerum obstructions: unde postea
na. diuturna proueniunt febres, et habitus
malus.

Aconit

Aconitum Pardalianches, Scorpio Plinio, Cammoren, Thelyphonon, seu Myotonon Latinis, & Græcis: Italis, Aconito: Germanis, Vvolffs beer, seu Doll vvurtz: Hispanis, Centella: Gallis, Aconit, la Tore, seu Estrangle Lyepard.

Locus.


Nascitur in Pli. li. 27.
Montibus, & cap 3.
nudis Cautibus, nullo iuxta, ne pulvere quidem nutriente.

Qualitates.
Putrefacient Gale. li. 6.
disfacultatem simp. medica.
obtinet, & lethale est: itaque in cibo, potuque fugiendum. At tamen ad putrefaciendum externas corporis partes, aut circa sedem idoneum est.

Herba verò radix ad hæc utilis est.

K 2

Aconit



Aconitum cynoctonum, Lycoctonon, seu
Luparia: Græcis ἀκόνιτον κυνόντων: Italis, A-
conito per amazzar Lupi e Cani: Germanis,
Vvolffs vurtz: Hispanis, Yerua matta Louo,
seu Yerua de Ballesteros.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in omnibus ferè montibus.

Qualitates.

*Lycoctonon similem priori Aconito faculta-
tem habet: sed peculiariter lupos, sicut illud
Pardos interficere consuevit.*

Gale. li. 6.
simp. me-
dica.

Aconi

Aconitum tertium, siue Luparia: Gallis,
La Tore a fleurs iaunes: Italis, Vulparia.



Locus.

Nascitur in omnibus ferè montibus.

Qualitates.

Deleterium est vt cetera Aconita.

K 3

Aconi

Aconitum quartum, seu Luparia aut Vu-
paria altera : Gallis , Aconit aux fleurs
jaunes.



Locus ex Matthiolo.


Nascitur in omnibus fere montibus.

Qualitates.

*Deleterica facultatis est, Et ca-
etera Aconita*

Herba

Herba Paris, Vua versa, siue Vua vlpina.
aut Aconitum Pardalianches falsum : Gal-
lis, Raifin de Renard.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur in omnibus fere syluis, & Mona-
zibus.

Qualitates ex Matthiolo.

Semen contra Veneficia, & morbos dis-
turnos praeantissimum est medicamentum.
In quē & sum sumet illius puluerem, drachma
pondere, in vigesimum & quē diem.

K †

Napel

Napellus.



Locus.

Nascitur in Montibus.

Qualitates ex Matthiolo.

*Napelli vis in necandis hominibus adeo
 immanis sanāque existit, Et nullis ferè anti-
 do is occurri possit, nisi quā primum & sta-
 tim succuratur.*

Napel

Napellus secundus.



Locus, Qualitates.

Idem cum priore Napello est.

K 5

Cicuta

Cicuta: Græcis, *κίκον*: Arabibus, *Suca-*
ran: Italis, *Cicuta*: Germanis, *Ziger kraut*,
Schirling, seu *Vveterich*: Hispanis, *Ceguda*,
 Gallis, *Ciguë*, *Cocuë*, aut *Seguë*.

Locus ex Matthiolo

Gal. li. 7.
 simp. me.

Hæc est ea
 blanda cuius
 loco Atheni-
 enses in inter-
 minando sapi-
 entis sumo
 philo sopho
 quoniam falso
 dixit & Ma-
 gistrus quasi
 parum recte de
 his sentiret, accensurum) socrate vbi sunt.



Passim prop-
 erbum &
 Oppidorum
 mænta proxi-
 mit.

Qualitates
 Extrema r-
 frigerantis e-
 facultatis.

Ex Matthio-
 lo.

Cicuta ra-
 dix mansa, e-
 in cibum sum-
 pta, aut pota-
 eam amen-
 tiam facit,
 quam Græci

ab ipsa Cicuta, novior appellant.

Taxu

Taxus: Græcis, *quindax*: Italis, Taffo; Germanis, Eidenbaum: Hispanis, Texo: Galles, If.

Locus ex Matthiolo.



Nascitur in montibus, saxosis ac præruptis locis, & inter Abietes & Piceas.

Qualitates.

Venenosa est facultatis. Gale. li. 8. sim. mc.

Ex Plinio.

*Vasa Vicia-
toria ex ea, Vinis, in Gallia
facta, mortifera fuisse com-
pertum est, &c.* Pli. li. 18. cap. 10.
Apocry

Apocynum, Cynocrambe, Cynomorū,
siue, Brassica Canina: Græcis, ἀνόνυον: Sy-
ris, Periploca repens.

Locus ex Matthiolo.



Rara &
exotica plan-
ta est, Syris-
que familia-
ris: pergulis,
& Scanis in-
umbrandis a-
ptissima, to-
piarioque ope-
ri.

Qualitates.

Canes celer-
rimè interi-
mit, homini-
busque est ve-
nenum. Mul-
tūm grauius

olet. Proinde calida omnino est non instre-
nue: non tamen proportionē desiccāt. Illita
admodum digerētis est facultatis.

Nerium

Gale. li. 6.
simp. me.

Nerium, Rhododendrū, Rhododaphne,
ine, Oleander: Græcis, *νιόλον*, ἢ *ροδοδένδρο*:
italis, Oleandro: Germanis, Olander: Hi-
spanis, Adelfa, seu, Eloendro: Gallis, Olean-
dre, Rosage, seu Rosagine.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
amænis, ma- ca. 77.
ritimis, & se-
cus amnes.

Qualitates.

Illitum di- Gal. li. 8.
scutiendi vim sim. mc.
obtinet: intus
sumptum, sa-
nis homini-
bus pernicio-
sum ac vene-
nosum, ple-
risque etiam
pecudibus.

Fungi



Fungi: Græcis, *μυκήτες*: Arabibus, *Ha*
 thar, seu, Father: Italis, Fonghi: Germanis
 Pfifferling, Schyvemm, aut Keysekem: Hi
 spanis, Hongos, Cogomelos, & Cyllen
 quas: Gallis, Potirons, Champignons, seu
 Moucerons.



Locus.

*Siccos & nemorosos tractus amant: Et
 nascuntur ubique.*

Qualitates.

Gal. li. 8.
 sim. me.

*Fungus frigida humidaque admodum pla
 ta est: quamobrem etiam proximè ad deleter
 riam enecantemve facultatem accedit. Et sa
 nè inter eos sunt qui interficiant: potissimum
 qui ex natura mistam habent qualitatem pe
 tredinosam.*

Col

Colchicum ephemerum, Bulbus agrestis,
 Officinis falsò, Hermodactylus: Græcis,
 κολχινόν: Arabibus, Surugen: Italis, Col-
 chico: Germanis, Zeittlosz, aut Vvild saf-
 ran: Gallis, Mort au chien, seu Chiennée.

Locus.

Nascitur ubi-
 que in Pratis
 virginosis.

Qualitates.

Strangulan Gal. li. 6.
 do enecat, est simp. me.
 enim deletera
 facultatis.

Ex Matthio-
 lo.

Turca, cum
 inebriari vo-
 lunt flores vi-
 no macerant:
 dilutoque co-

rum poto adeo stupidi redduntur, ut in Ecsta-
 si abeant.

Epheme



Ephemerum, seu Iris sylvestris: Græcis, *ἰρις*; Gallis, Flambe blanche sauvage; Italis, Giglio matto.

Locus ex Fuchio

Frequentissimum nascitur in montibus, pratis, & sylvis.

Qualitates.

Radix adstringens est & boni odoris: ex quibus palā fit, quod mista sit facultatis, temperaturaque nempe repellentis, & halitu digerens.

In dentium doloribus colluitur efficaciter folia autem tuberculorum tum augmento, tum vigori congruunt. Oportet autem ea vino decocta, priusquam pus moveas, illinere.

Helxine

Calc. li. 6.
simp. mc.



Helxine, Parietaria, Vitriola, siue Per-
dicium: Græcis, ἐλξίν: Italis, Parietaria,
aut Vitriola: Germanis, Tag vnd nachr: Hi-
spanis, Yerua del muro: Gallis, Paritoire,
Parietaire, seu Vitriol.

Locus.

Nascitur in Dio, libr.
parietinis, sc- 4. ca. 81.
pibus, & ma-
ceris.

Qualitates.

Vis ei inest Gale. li. 6.
abstergendi & simp. me.
leniter constrin-
gendi cum hu-
miditate sub
frigida, Phle-
gmonas omnes
in initio & au-
gmento sanat
vsque ad sta-
tum, maximè
si calide fue-
rint. Diutina tussi Vexatis quidam exhibent.

Alfine



Alfene: Græcis, ἀλσίνη: Italis, Centone,
Panarina, seu Pizza gallina: Germanis, Hue
nerdorm, seu Vogel Kraut: Gallis, Mouron.



Locus.

Lucis opacisque gaudet.

Qualitates.

Dio. li. 4.

cap. 82.

Gale. li.

6. simpl.

med.

Similem Helxinæ facultatem obtinet, nempe refrigerantem & humectantem: est enim essentia aquea & frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas, & mediocria Erysipelata competit.

Lens

Lens Palustris, siue Lenticularia: Græcis, φακὸς ὁ ἐπὶ τῶν τελευάτων: Arabibus, Tahaleb, seu Thaleb: Italis, Lente de gli paludi: Germanis, Vvasser linsen: Hispanis, Lenteya dellagoa: Gallis, Lentille de marais, seu de Mer.



Locus.

Inuenitur in aqua non fluente.

Qualitates.

Humida frigidaq; temperatura est, & trinitate ex secundo quodammodo ordine.

Dio. li. 4.
cap. 83.

Gal. li. 8.
simp. nre
dica.

L 2

Sedum

Sedum maius, aut Semperuiuum maius:
Græcis, ἀείσωον μέγα: Arabibus, Peia hala-
len, seu, Hai alhalez: Italis, Sempreuiuo
maggiore: Germanis, Grosz haufz Vvurtz:
Hispanis, Sempreuiua, & Yerua puntera:
Gallis, Grande Ioubarbe, & Oüye.

Locus.

Nascitur in
montibus &
testaceis, &
supra domi-
cilia feritur.

Qualitates.

Aizoon ma-
ius & minus
desiccat qui-
dem leuiter
quandoqui-
dem & me-
diocriter ad-
stringit, om-
nis alterius
vehementis

qualitatis expers: quare in eo plus ceteris a-
bundat essentia aquea. Caterum non medio-
criter refrigerat: est enim ex tertio ordine re-
frigerantium.

Se dum

Dio.li.4.
cap.84.

Gal.li.6
simp.me.



Sedum minus foemina, Semperuiuum
 minus, aut Vermicularis: Græcis, ἀειπνον mi-
 nor: Italis, Sempreiuua minore, seu Pigno-
 ra: Germanis, Kleyn haufz Vvurtz: Gallis,
 petite Ioubarbe, seu Couille au Loup.



Locus.

Nascitur in petris, parietinis, & maceris, Dio. li. 4.
 necnon in scrobibus opacis. cap. 85.

Qualitates.

Eiusdem est temperamenti, cuius Semper-
 uiuum minus.

L 3

Semper

Semperuium tertium, seu Illecebra:
 Græcis, ἀειβίον ἢ ἀλφειόβιον: Arabibus, Alse-
 bram, Handrachabara, seu, Tilafon: Ilalis,
 Sempreuiuo terzo.



Locus ex Matthiolo.

Diosc. li. 4. ca. 86. *Nascitur in saxis, antiquisque edificio-
 rum parietibus, & saxorum rimis.*

Qualitates, ex Dioscoride.

*Visei excalfactoria, acris & exulcerans.
 Illita cum axungia strumas discutit.*

Vmbi

Vmbilicus Veneris, siue Acetabulum:
Græcis, κορυμβός: Italis, Cope, triuole: His-
panis, Scudetes: Gallis, Escuelles.

Locus ex Matthiolo.



Frequens
nascitur in sa-
xis, & vetu-
stis adificio-
rum parieti-
bus.

Qualitates.

Cotyledon Gale. lib.
facultatis mi 7 simpl.
sta est, nempe medic.
humida, sub-
frigida, & cu-
iusdam obscu-
re adstringē-
tis, & cum ea
leniter ama-

ra: Unde refrigerat, repercutit, abstergit, &
discutit. Putantur folia cum radice mandu-
cata calculos confringere, & Urinam mo-
uere.

L 4 Vmbilicus

Vmbilicus Veneris alter, quibusdā Cym-
baliū, seu, Cotyledum alterum.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montibus, saxisq; inharet.

Qualitates.

Facit eadem quæ Semperuium.

Diot. lib.
4. ca. 88.

Vertica

Urtica prima: Græcis, ἀναλύφη: Arabibus.
 Urtica, Vraithlatun, seu, Angiara: Italis,
 Urtica: Germanis, Nessel: Hispanis, Ortiga:
 Gallis, Ortiè.

Locus.

Solo tactu,
 Vel etiam no-
 ctu, ab omni-
 bus facile di-
 gnoscitur.

Qualitates.

Semen & Gal. li. 6.
 folia (nam sim. mc.
 hac potissimū
 in sum ve-
 niūt) digeren-
 tis sunt facul-
 tatis. Sed &
 quiddam fla-
 tuosum obti-
 nent, quo &
 Venere exti-
 mulat: maxi-



neq; ubi cū Musto semē bibitur. Porro Vehemē-
 ter calfacit, estque admodū tenuiū partiū: pro-
 indeq; crassos, viscososq; humores educit ex
 ectore, & pulmone. Actū tamen flatuosa est,
 nō potestate: flatus enim generat dū cōcoqui-
 ur. In summa, subtiliū est partiū, & tēpera-
 tura sicca, nō tamē tātū habet caliditatis ut e-
 iā mordicare possit.

L 5 Vr

**Vrtica secunda: Gallis, Seconde espece
d'Ortie.**



Locus, Qualitates.

*Eadem nimirum qua & superior est: nisi
quod minus aspera est priore.*

Vrtica

Vrtica Græca, seu, Vrtica sylvestris: Gal-
los, Ortie sauvage, seu, Ortie gringette.



Locus.

Nascitur Ubique temere.

Qualitates.

Acrior est & mordacior ceteris Vrticis.

Car

Cardiaca, siue Agria Palma: Italis, Cardica: Germanis, Hertz gespan: Gallis, Gripaume, seu, Cheneueule.

Locus ex Matthiolo



Prouenit
Ubique iuxta
semitas, circa
sepes, & pos
Urbium mæ
nia.

Qualitates
ex eodem.

Gustu adeo
amarefcit &
facile existi
mari possit ac
secundum ex
calfacientium
ordinem, &
tertium succu
tium accede
re. Præstat ad

Cordis affectus: medeturq; cōuulsis ac resolu
tis. Pectus à pituita detergit: Lūbricos necat:
obstructionesq; frigidas aperit, & menses Uri
nāq; ciet. In puluere contrita, & cochlearis
mensura ex vino hausta difficile parientibus
mirum in modum opitulatur.

Galienus

Galiopsis, urtica Labeo, urtica fortida siue
 tica mortua: Græcis γανιόψις. Italis Ortica
 tida: Germanis, Vvelfschneffel: Hispanis,
 ortiga muerta: Gallis, Ortie puante.

Locus.


Nascitur Dios. lib.
 circa sepes, & 4. ca. 90.
 dificiorum a-
 reas, ac semi-
 tas ubique.

Qualitates
ex Diosc.

Folia, cau-
 les, semen, suc-
 cusque duri-
 ties & carcino-
 mata dissi-
 pant, strumas
 que panos, &
 parotidas dis-

utiunt. Oportet, bis die, tepidum ex aceto
 ataplasma imponere, & eius decocto fo-
 uere.

Saro



Scrophularia maior, Millemorbia, Fica-
ria, Ferraria, siue, Castrangula: Germanis
Braun Vvurtz: Gallis, Grande scrofu-
laire.

Locus ex Matthiolo



Nascitur
in scrobium
marginibus
riguis, & vli-
ginosis locis.

Qualitates
ex eodem.

Radix stru-
mas & ha-
morrhoidas si-
nat. In quen-
sum radix
effoditur Au-
tumno, repur-
gatâque tun-
ditur cum re-
centi butyro: operculatâque fictili in vliginoso
loco reponitur, vbi dimittitur per quindecim
dies. Deinde lento igne butyrum illud lique-
fit, & percolatum asservatur, quo prædicti
morbi vtilissimè illinuntur.

Galien

Galion Latinis, & Græcis: Italis, Galio:
Germanis, Megerkraut, Vnser frayvê, V veg-
ro: Hispanis, Coaia leche yerua: Gallis, Pe-
Mt Muguet.

Locus.

Nascitur in Diof. lib.
palustribus. 4. cap. 98

Qualitates.

Galium i-
deo nomē ser-
titum est su-
um, quod lac
coagulet. Ad-
simile autem
est Aparina,
facultatem ob-
tinens exicca-
toriam, &
subacrē. Flos
eius sanguis
nis profluens

Gal. li. 5.
sim. me.



competere videtur, & combustis mederi.

Sene

Senecio: Græcis κριγέρον: Italis, Cardon-
cello, aut, Spelliciosa: Germanis, Creutz-
Vvurtz: Hispanis, Buon varon.



Locus.

Dio. li. 4. *Nascitur maxime in macerijs, & circum*
cap. 92. *oppida.*

Gale. lib.
6. simpl.
medica.

Qualitates:

*Facultatem mistam obtinet simul refrige-
ratoriam & modicè digerentem.*

Mu

Muscus marinus, siue Corallina: Græcis,
 ὀσμύνη θαλάσσιος: Arabibus, Thahaleb, seu Tha-
 lel, sicut Lens Palustris: Germanis, Meermi-
 usz seu, Mermoezf: Hispanis, Mallorquiana
 Interua: Gallis, Coralline.

Locus.

Nascitur in Diöf. li. 4.
 scopulis, testa- cap. 94.
 ceisque haud
 procul à Ma-
 ri.

Qualitates.

Constat ex Gale. li. 6
 terrena et a- simp. mc.
 quea essen ia,
 & traque frigi-
 da: siquidem
 & gustum ad-
 stringit: & ca-
 lidis quibus-
 vis illitus, ea
 euidenter re-
 frigerat, &
 adiuuat.

M

Pora



Potamogeton, Stachytes, siue Fontalis:
 Græcis, ποταμογέτωπ: Germanis, Sam kraut,
 aut Sechalden kraut: Italis, Potamogeto:
 Gallis, Herbe des Estangs.



Locus.

Dio. li. 4. *Nascitur in palustribus, lacubus, & aquis*
 cap. 96. *stagnantibus.*

Qualitates.

Gal. li. 8. *Adstringit & refrigerat similiter Poly-*
 simp. inc. *gono: sed essentia eius crassior quàm Poly-*
goni est.

Strac

Stratiotes Millefolium, seu Millefolium
maius: Græcis, *στρατιώτης χιλιόφυλλον*: Italis,
Millefoglio: Germanis, Garben: Hispanis,
Milloyas yerua: Gallis, Millefeuille, Cu-
min, ou Aneth sauvage.

Locus ex Matthiolo.

Non admo-
dum vulgaris
est planta.
Nascitur in
saxosis.


Qualitates.

Adstrictio Gal. li. 8.
nis nonnihil simpl. me-
dica
habet: proin-
de & vulne-
ra glutinare
potest, & Ulce-
ribus esse sti-
lis. Sunt qui
eo & ad san-
guinis eru-
ptiones stantur, & ad fistulas.

M 2

Mille



HISTORIA
Millefolium minus.

Locus.

*Nascitur passim in asperis agris, præcipuè
circa semitas.*

Qualitates.

Huc refer prioris Millefolij historiam.

Verba

Verbascum album foemina, Officinis, Ta-
 psus barbatus: Græcis, φλόμῳ: Italis, Ver-
 basco: Germanis, Vveyfz vvullkraut: Gal-
 lis, Bouillon blanc femelle.

Locus ex Fuchfio.

*Nascitur pas-
 sim in Cam-
 pestribus, &
 syluosis.*

Qualitates.

*Radix gu Gal. li. 3.
 stu acerba est simpl. me
 & fluxionis dica.
 affectibus pro
 dest: sed &
 ad dentium
 dolorem eam
 quidam col-
 luunt. Atta-
 men folia mo-
 deratè dige-*

rendi vim habent, & desiccandi.

M 3

Ver



Verbascum album mas: Gallis, Bouillon
blanc masle.



Locus.

Nascitur passim in Campestribus.

Qualitates.

*Eandem temperaturam & vim habet
quam Verbascum famina.*

Ver

Verbascum nigrum: Gallis,
Bouillon noir.



Locus.

*Nascitur passim in Campestribus
& Syluosis.*

Qualitates.

*Easdem Vires obtinet quas Verbascum
primum.*

M 4

Verba

Verbascum Lychnitis, Lanaria, Tryallis,
Candelaria, Candela Regis, seu Tapsus bar-
batus: Græcis, φλόμϙ: Germanis, Kunigs-
kertz.



Locus, Qualitates.

*Hæc refer omnem Verbasorum
historiam.*

Verba

Verbascum sylvestre, Gallis Bouillon sau-
nage, seu Bouillon à fleurs jaunes.



Locus.

Nascitur in Campestribus.

Qualitates.

*Huc refer omnem Verbasorum historiam.
Folia tamen ambustis sunt cataplasmata.*

M

5

Prim

Primula veris, Verbasculum, Herba Paralyfis, Arthetica, Arthritica, Brachæ cuculi, siue Verbascum odoratum: Italis, Fior di Prima vera, aut Brache di Cuculo: Germanas, Schlüsselbluomen: Gallis, Prime vere, seu Brayes de Cocu.

Locus.

Nascitur passim, Vere in-
eunte in prae-
tis.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Efficacem
Sim tribuunt
ad articulo-
rum dolores.
Decoctum ra-
dicis ad re-
num & Ves-
ica calculos co-
fert. Succus
potus, & illi-
tus, fractis, lu-



natifque ossibus Valde prodest. Eodem expres-
so ex floribus, mulieres utuntur ad erugan-
dam faciem, eiusque maculas detergendas.

Primu

Primula veris altera.



Locus, Qualitates.

Hæc refer omnem Verbasculi historiam.

Blat

Blattaria, Dioscoridi, Verbascum aureos
flores emittens: Gallis, Herbe aux Mittes.



Locus ex Matthiolo.

Pli. li. 25.
cap. 9.

Nascitur passim in Campestribus.

Qualitates ex eodem.

*Ex amaritudine colligere licet, eam abster-
gere, & aperire posse.*

Aethio

PLANTARVM.
Aethiopis Latinis, & Græcis.

557



Locus.

Nascitur in montibus, & plurima in Ida monte Troadis, & in Messenia Sicilia.

Dio. li. 4.
cap. 10.

Qualitates, ex Paulo.

*Radicis decoctum potum auxiliatur ischia Aegin. li. 2.
dicis, pleuriticis, & sanguinem reijcientibus. bro 7.
Arteria etiam asperitates cum melle lenit.*

Perfo

Personata, Prosopis, Prosopion, siue,
Lappa maior, aut Bardana: Græcis, ἀρνησον:
Italīs, Lappola maggiore: Germanis, Groß
Kletten: Hispanis, Bardana, aut Pagamacera
maior: Gallis, Gletteron, seu Glouteron.

Locus ex Fuchsio.

Nascitur
passim, maxi-
meq; in pra-
torum & a-
grorum mar-
ginibus.

Qualitates.

Discutit si-
mul & desic-
cat, sed &
adstringit me-
diocriter.

Quamobrem
folia eius ve-
teribus Ulce-
ribus mederi
possunt.

Perfo

Calc. li. 6.
simpl. me-
dica.



Personata altera, Plinio, Persolata,
 salsò dicta Petasites: Germanis, Pestilentz
 Wurtz. Pli. li. 25.
 cap. 9.



Locus ex Fuchſio.


Nascitur in pratis ſliginoſis, & riguis.

Qualitates, ex eodem.

Ex amaritudine, quam poſidet, deſiccare
 tertio ordine videtur. Pulvis radicis ex vino
 ſumptus efficaciffimus eſt aduerſus febres pe-
 ſilentes, tormina, & ſteri ſtrangulatus. Su-
 perem maxime ciet.

Epipa

Epipactis, seu Elleborine: Græ-
cis, ἐπιπᾶκτις.



Locus.

Nascitur in locis vliginosis.

Dio. li. 4.
cap. 104.

Qualitates.

*Locineris Vitii Stilis est, & contra Venena
bibitur.*

Fumz

Fumaria, siue, Fumus Terræ: Græcis,
 καπνός: Arabibus, Sechiterig, aut, Sabete-
 gegi: Italis, Fumus terræ: Germanis, Erdt
 rauch: Hispanis, Palomilla: Gallis, Fume-
 rre, seu Pié de Geline.

Locus.

Nascitur in Pli. li. 25.
 parietinis, et cap. 13.
 sepibus, &
 passim in hor-
 tis.

Qualitates.

Acris si- Gale. li. 7.
 mul & ama simp. me.
 ra qualitatis
 est particeps,
 nec tamē pla-
 nē expers est
 acerbæ. Quā-
 obrem Uri-
 nam bilio-
 sam multam

renocat. Herba exiccata subductionis gratia
 melicrato inspergitur: Volenti autem roborare
 stomachum, vino diluto inspergat.

N

Fuma

Fumaria altera Plinij, Fuchſio Piſtolo-
 Pli. li. 25. chia falſò dicta.
 cap. 13.



Locus, ex Plinio.

*Nascitur in hortis & segetibus hordeaceis,
 Fuchſio tamen fructicat in sylvis, & locis
 opacis.*

Vires ex eodem.

*Claritatem facit inunctis oculis, de lachry-
 mationeque, ceu fumus, unde illi nomen.*

Lotus

Lotus urbana, Officinis, Melilotus: Græ-
cis, λωτός ἡμερῶν: Italis, Meliloto: Germanis,
Edler Steyn klee: Gallis, Melilot.



Locus.

Nascitur in hortis, pratisque, & inter Dio. li. 4.
segetes. cap. 106.

Qualitates.

Vt mediocriter concoquendi vim possidet, sic Gal. lib. 7.
etiam exiccandi in caliditatis frigiditatisque simp. m. c.
coniugatione media quodammodo est, & tem-
perata.

N 2

Lotus

Lotus sylvestris: Græcis, λωτός ἀγρίος: Arabibus, Handachocha, Garch, & Thusf: Germanis, Stein klee: Italis, Loto saluatico: Gallis, Grand Treffle des pierres.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in incultis & pratis.

Qualitates.

Gale. li. 7.
simpl. me
dica.

Semen eius secundi est ordinis calefacientium: habetque nonnihil absterforium.

Millefo

PLANTARVM.
Millefolium palustre: Græcis,
μυριόφυλλον.

565



Locus.

Nascitur in palustribus.

Qualitates.

Dio. li. 4.
cap. 110.

Myriophyllum adeò desiccatur, et vulnera
glutinet.

Gale. li. 7
simp. me

N 3 Mille

Millefolium palustre alterum.




Locus, & Qualitates.

*Hinc refer que dicta sunt de Millefolio
priore.*

Myrrhis,

Myrrhis Myrrha, aut, Cicutaria.



Locus ex Fuchſio.

Nascitur in hortis, in pratis: & inter ſegetes.

Qualitates.

Radicē habet odoris incūdi, & dulcē, quae Gale. lib. menses mouet & ea quae in thorace ac Pul. 7. ſimpl. mone ſunt expurga. Itaque ex ſecundo ordi- medica. ne fuerit excalefacientium, adiuncta quadā partium tenuitate.

N 4

Ange

Angelica: Germanis, Angelic: Gallis,
Angelique.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur
in Montibus,
& feritur in
hortis.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Radix gu-
stu acris est
& spauiter
odorata. Ex-
calfacit pari-
terque desic-
cat ordine se-
cundo comple-
to, aut tertio

incipiente. Proinde aperit, attenuat, & dis-
cutit. Venenis mirificè aduersatur: quare pe-
ssilentiam arcet hausta, aut frequenter com-
mansa. Ipsa per se sumpta pituitosos lentos-
que humores digerit. Radix in puluerem tri-
ta animi deliquijs & cæteris cordis affecti-
bus opem vnicè præstat.

Cirs

Cirium, quibusdam falso, Buglossum:
Græcis *νιποπ*.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in & liginosis locis.

Vires.

Radix, ad alligata loco laboranti, dolores Dio. li. 4.
varicum sedat. cap. 114.

N 5 Aster

After Atticus, Bubonium, siue Inguinalis: Græcis, ἀστὴρ ἀττίνος: Arabibus, Astaraticon: Italis, After Attico: Germanis, Sternkraut: Gallis, Petite espargoutte, seu, Petit Muguet.

Locus ex Matthiolo.



Gal. li. 6.
sim. me.

Nascitur
in asperis, in-
cultis, & con-
uallibus.

Qualitates.

Aster Atti-
cus Buboniū
dictum est, nō
ob id tantum
quod illitum,
sed etiā quod
suspensum Bu-
bonas sanare
creditur. Ha-
bet quiddam
etiā dige-
rens: habet ve-
rò non mini-

mè & refrigerans quiddam ac reprimens,
adeo ut mista sit facultatis ut Rosa: Verum
non adstringit.

Alchē

Alchimilla, Stellaria, siue, Patta Leonis: *pes Leonis*
 Italis, Piè di Leone, seu Alchimilla: Germa-
 nis, Synnavv; Gallis, Piè de Lyon.

Locus ex Matthiolo.

Plurima
 in montibus
 prouenit, &
 in pratis cli-
 uosis.

Qualitates
 ex Fuchio.

Folia, ra-
 dice, que vali-
 de adstrin-
 gunt & desic-
 cant: Vnde po-
 tionibus vul-
 nerarijs perop-
 portuna est.
 & desiccant-

dis adstringendis, que fœminarum locis. In
 quem & sum stillatitia eius aqua, aut decocto,
 aut puluere vtuntur. Vide Matthiolum.

Vio



Viola purpurea: Græcis, ἰὸν μέλαν, καὶ ἰὸν πορφυρῶν: Arabibus, Seneffige, Sonofrig, seu, Benefefegi: Italis, Viola mammola: Germanis, Mertzen violen: Hispanis, Violeta: Gal-
lis, Violette de Mars.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 117.

Gal. li. 6.
sim. me.



Opacis & asperis nascitur. Seritur etiam in hortis ad coronamēta.

Qualitates.
Viola folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident: proinde tum per se, tum cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant.

Ex recentioribus.

Viola, citra noxam, deiectionia facultate prædita sunt.

Iacea

Iacea, seu, herba Trinitatis, Italis, Iacea:
Germanis, Ireyslam kraut: Gallis, Penseés,
aut, Menues penseés.

Locus ex Fuchſio,



Nascitur
sponte in cul-
tis: seriturq;
in hortis ad
Coronamēta.

Qualitates
ex Matthio-
lo.

Quibusdā
ad intestino-
rum ramices
mirificè com-
mēdatur: cen-
seturque eo-
dē ordine quo
Symphitum.

Sunt etiam qui eandem agrè spirantibus,
& pulmonum inflammationibus non obscu-
rè opem ferre tradant: quin & scabiem sana-
re, & cetera cutis vitia delere.

Bugl

Buglossum verum, Borrago, siue, *Lingua*
 Bouis: Græcis, βύλλιστος: Arabibus. *Lifan*
 althaur, seu, *Lefan* althaur: Italis, *Borragi*
 ne: Germanis, *Burretsch*: Hispanis, *Borraia*
 & *Borraienes*: Gallis, *Borrache*.

Locust

Dios. lib.
 4. ca. 123

Gal. li. 7.
 sm. me.



Nascitur
 in campestribus & sabu-
 losis: seritur
 que in hortis

Qualitates

Humida
 calidaque tem-
 peratura est
 itaque Sim-
 iniectum lac-
 tia ac hilarita-
 tis causa est
 creditum est
 Sod & y
 qui ob fauci-

asperitatem tussunt, coctum in melicrato co-
 uenit.

B

Buglossum vulgare: Gallis, Buglose.



Locus.

Nascitur in Campestribus & sabulosiss.

Qualitates ex Matthiolo.

Eisdem pollet facultatibus quibus Borago.

Cyne



Locus.

Prouenit in sabuletis.

Vires ex Dioscoride.

Dio. li. 4.
cap. 124.

*Folia cum suillo adipe Veteri, medentur
morsibus canum, alopecijs, & ambustis. Emo-
lit alium decoctum herba cum vino potum.*

Co

Cynoglossum vulgare, seu Lingua Canis
officinarum: Plinio, alterum Cynoglossum.



Locus.

Nascitur passim secus Vias.

Vires ex Plinio.

Radix eius pota ex aqua ranis & serpenti Pli. li. 25.
bus aduersatur. cap. 8.

Ex Fuchſio.

Recentioribus censetur frigida & sicca se-
cundo ordine.

O

Hippo

Hippoglossum, Lingua Equina, Lingua
pagana, Bislingua, seu Bonifacia: Græcis,
ἵππογλωσσον: Italis, Bislingua, seu Bonifacia:
Germanis, Zæpfflin kraut: Hispanis, Lengoa
de Cauallo: Gallis, Bislingua.

Locus ex Matthiolo.



*Nascitur
frequentissi-
ma in Ligu-
ria Alpibus,
Et syluosis
montibus.*

*Qualitates
ex recentio-
ribus.*

*In Steri affe-
ctibus, ma-
gno datur in-
uamento, ra-
dicis aut her-
ba puluis co-
chlearis men-
sura, ex vino
vel iure. Est*

*Et ad puerorum Enterocelas praestantissi-
mum medicamentum: si diutius diluculo haue-
riatur puluis idem sesquidrachma, pondere
ex Symphiti decocto. Vide Matthiolum.*

Anthi

Antirrhinon: Plinio, Anarrhinon, seu Lichnis sylvestris: Græcis, ἀντίρρινον: Italis, Antirrhino: Germanis, Orant, Sterck kraut, aut Steick kraut: Hispanis, Cabezza de Terne-
 ra: Gallis, Oeil de chat, seu Mouron violet.

Pli li. 25.
 cap. 10.

Locus.

Nascitur pas-
 sim in Aruis.

Qualitates.

Semen est Gale. li. 6
 ad sanatio- simp. mc.
 nes inutile.

Herba au-
 tem similis
 est cum Bubo-
 nio faculta-
 tis sed mino-
 ris multò. Ita
 que ex illo de
 hoc conijcitur.



O 2

Adian

Adiantum, Capillus Veneris, seu Polytrichon: Græcis, ἀδίαντρον: Arabibus, Berscegua scen, Bersaufan, & Chulbare albir: Italis, Capel venere: Germanis, Fravvenhar: Hispanis, Culantrillo de pozzo: Gallis, Capilli Veneris, aut Salua via.

Dio. li. 4.
cap. 137.

Gale. li. 6.
simp. me
dica.



Locus.

Vmbrosis,
& palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

Qualitates.

Adiantum in caliditate quidem & frigiditate symmetrum est: Verum de siccatur, extenuatur, & discutitur, non tamen ullam

manifestam caliditatem adfert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quispiam, secundum hanc oppositionem & temperiem, in ordine medio.

Tri

Trichomanes, Polityrion, seu Callitry-
 chon: Græcis, τριχόμανες: Italis, Politrigo:
 Germanis, Steinbrech: Hispanis, Politrigo:
 Gallis, Politricum, seu Capilli veneris.



Locus.

Nascitur in eisdem locis quibus Adianton.

Qualitates.

*Trichomanes eadem præstat qua Adian-
 tum: ex hoc ergo de illo conijcitur.*

Dio. li. 4.

cap. 132.

Gale. li. 3.

simpl. me-

dica.

O 3

X an

Xanthium, Lappa minor, siue Lappa in
uersa: Græcis, ξάνθιον καὶ πασιγάνιον: Italis,
Lappola minore: Germanis, Bettlersfleijsz,
aut Spitzkletten: Hispanis, Lappa menor:
Gallis, Petit Gloutteron, petite Bardane,
seu Grappelles.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 133.

Gal. li. 8.
simpl. me
dica.



Nascitur la
to, & pingui
solo, & lacu-
bus exiccatis.

Qualitates.

Fructus di-
scutiēdi vim
obtinet.

Ex Fuchſio.

Calidum
& siccum cer-
setur ex ama-
ritudine &
acrimonia
quam gustus
præ se fert.

Aegi

Aegilops, siue Festuca: Græcis, ἀγίλωψ: Arabibus, Dausir, Dalifit, Dosana, Daufer, seu Duffer: Italis, Squala: Gallis, Coquirole.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur frequens inter segetes: sed frequentissima inter hordeum & Zeam.

Qualitates.

Digerendi & impossibile: id quod ex gustu Gal. li. 6. patet, leuiter enim est acris. Verum & ex eo simp. me. liquet quod phlegmonas induratas, & aegilopas sanat.

O 4

Gale

Galega, siue Ruta capraria, quibusdam
falsò Glaux dicta: Italis, Lauanese, aut La-
uamani.

Locus ex Matthiolo.



Prope riuos
aquarum na-
scitur, & in
Siginosis lo-
cis, scrobium-
que aggeribus
& passim in
montibus.

Vires ex eo-
dem.

Præstat mi-
rificè contra
pestilentiam,
& Venenoso-
rum anima-
lium morsus.

In quem & sum herba, per se estur, atque illi-
nitur. Succus eius, drachmis quatuor han-
stus, comitiales Valde inuat.

Osy

Osyris, seu Linaria: Græcis, ὄσυρις: Italis,
& Hispanis, Linaria: Germanis, Harn kraut:
Gallis, Linaire.



Locus ex Fuchfio.

Nascitur passim & ubique, maximè in Cam-
pestribus.

Qualitates.

Osyridi amara inest qualitas, & obstru- Gale. li. 8
etiones expediendi facultas: quare & in Ieci simp. me-
nore consistentes obstructions adiuvat. dica.

O 5

Smilax

Smilax aspera, Rubus Ceruinus, Hedera spinosa, siue Hedera ciliffa: Græcis, σμίλαξ τραχέα: Italis, Rouo Ceruino: Germanis, Scharpfte vvinden: Gallis, Tan, siue Smilax aspre.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 139.


Nascitur in palustribus & asperis.

Qualitates.

Gal. li. 7.
sim. mc. Folia gustata aliquid habent acrimonia
& alioqui si illis & tarris, calefaciunt.

Smil

Smilax Læuis, Campanella, Funis arborum, siue Volubilis maior: Græcis, *μίλαξ ἢ σμίλαξ λεία*: Italis, Vilucchio maggiore: Germanis, Vvinden, aut Zaungloeklin: Hispanis, Correguela mayor: Gallis, Lifet, seu Campanette.



Locus.

Conuoluitur arboribus.

Qualitates,

*Facultate quodammodo Smilaci asperæ
parest.*

Dio.li.4.

cap.140.

Gale.li.7.


simpl.me

dica.

Lupus

Lupus salictarius, Lupulus, Lupus repti-
tius, siue Hinnulus: Græcis, *βρῦον*: Italis, Lu-
polo, seu Bruscaudela: Germanis, Hopffen:
Gallis, Houblon.

Locus ex Fuchsio.



*Nascitur fe-
rè & ubique in
sepibus. Seri-
tur tamen in
Germania stu-
diosè ab ijs
qui Zythum
conficiunt.*

*Qualitates,
ex Fuchsio.*

*Calefacit &
desiccatur se-
cundo ordine, ma-
ximè radix.*

Ex Mesue.

*Flauam bi-
lem detrahit,
sanguinem ab ea expurgat, & eius inflamma-
tiones extinguit. Syrupus ex saccharo & eius
succo paratus vtilissimè exhibetur in febribus
à bile & sanguine excitatis.*

Ruscus

Ruscus, Murina spina, siue, Myrtus syl-
uestris: Græcis, *μυρτίνη ἀγρία*, *νεκὶ ὀξύμυρτι-
νη*: Arabibus, Cubebe: Italis, Rusco, &
Pongi topi: Germanis, Bruosch, aut Meusz
dorn: Hispanis, Ius barba, & Gilbarbera:
Gallis, Brusc: Officinis, Bruscus.

Locus.

In asperis Dio.li. 4.
Et præcipiti- cap. 141.
bus locis na-
scitur.

Qualitates,
ex Dioscori-
de.

Folia Et
bacca, in vino
pota Urinam
ciunt, menses
pellunt, Vesi-
ca calculos frā
gunt, stillici-
dio Urina me
dentur, dolo-
res capitis sa
nant, Et regium morbum.

Laurus



Laurus Alexandrina, siue Laurus Idæa:
 Græcis, δάφνη ἀλεξάνδρεια, καὶ ἐπιφύλλοναρον
 πρ: Arabibus, Gar Alexandria: Italis,
 Lauro Alexandrino: Germanis, Zæpfilin-
 kraut: Gallis, Laurier Alexandrin.

Locus.

Inuenitur
 in montosis.

Qualitates.

Lauri her-
 ba tempera-
 tura eviden-
 ter est calida,
 & gustanti-
 bus acris si-
 mul & suba-
 mara est: po-
 tãq, tum vri-
 nam, tũ men-
 ses prolicit.

Laurus

Dio.li.4.
 cap.142.

Cale.li.6.
 simp.mc.



PLANTARVM.
Laurus Alexandrina altera.

591



Locus, Qualitates.

De hac ex priore conycto.

Daphnoi

Daphnoides, siue, Laureola : Græcis,
Δαφνοειδής : Arabibus, Daphnides : Italis,
 Laureola: Gallis, Laureole.



Locus.

Nascitur in montosis.

Qualitates.

Dio.li.4.

cap.143.

Gale.li.6.

simp.mc.

Est persimilis viribus Lauro Alexandri-

na, sicut & Chamadaphne.

Ex Fuchio.

Validè calida est, & sicca.

Chaman

Chamædaphne, siue Laureola mas: Græ-
cis, χαμαιδάφνη: Arabibus, Chamedaphnes:
Officinis, Laureola: Gallis, Laureole masle.



Locus.

Nascitur in montosis.

Qualitates.

Gal. li. 6.
simp. me.

*Est persimilis viribus Daphnoidi, & Lau-
ro Alexandrina.*

P

Vera

Veratrum album, siue Elleborus albus: Græcis, ἐλλέβορος λευκός: Arabibus, Cherbachem, seu Charbech abaid: Italis, Elleboro biāco: Germanis, Vveisz niesz vvurtz: Hispanis, Verde gambré blanquo, & Yerva de Balleste: Gallis, Ellebore blanc, seu Verare blanc.

Locus.

Nascitur in montibus & asperis.

Qualitates.

Elleborus & terque tum albus, tum niger extergentis simul & excalfacientis est facultatis: Et sint tertij ordinis excalfaciētium & desiccantium. Porro, niger

gustu calidior est: candidus subamarus.

Elle

Dio. li. 4.
cap. 145.

Gale. li.
6. simpl.
med.



Elleborus niger, seu Veratrum nigrum:
Græcis, ἐμβόρον μέλαν: Arabibus, Cher-
bachen, seu Charbech asued: Italis, Elle-
boro nero: Germanis, Christvurtz: Hispani-
nis, Verde gambre negro, & Elleboro:
Gallis, Ellebore noir, Verare noir, seu
Obre.

Locus.

In collibus, Dio. li. 4.
asperis, & si- cap. 146.
tientibus lo-
cis enascitur.

Qualitates.

In fistulam, Gal. li. 6.
callo indura- simp. me-
tam demis- dica.
sus, duobus,
tribusve die-
bus callū de-
trahit. Den-
tibus prodest
cum aceto col-
luentibus: cæ-
tera Elleboro
albo persimilis.

P a Con





Locus, ex eodem.

*Plurima nascitur in Bohemia, praesertim
in agro Pragensi.*

Vires ex eodem.

*Radices per auriculam perforatam inser-
ta, pecorum pulmonariam atque etiam alios
morbos curant, Ellebori nigri modo.*

Ophris,

Ophris, quibusdam, Elleborus albus, sed
falsò: Germanis, Zvveyblatt.

Locus, ex Fuchfio.



Nascitur fre-
quentissima
in montibus,
& in mon-
tium radici-
bus.

Qualitates,
ex eodem.

Gustulen-
torem quen-
dam emittit,
non sine dul-
cedine: Unde
videtur cali-
da esse & sic-
ca.

Ex Matthiolo.

Præfertur vniuersa planta ad denigran-
dos capillos fracturas sanandas, & vulnera
glutinanda.

P 3

Cucu

Cucumer sylvestris, anguinus, erraticus, siue, Asininus: Græcis, σίνυς ἄγριος: Arabibus, Chese allimar, Khate allhenei, seu Chetha alhamar: Italis, Cocomero saluatico: Germanis, Vvilder cucumer, seu, Esels cucumer: Hispanis, Cocombrillos amargos: Gallis, Cocombre sauuage.

Dios. lib.
4. ca. 149

Gal. li. 8.
sim. me.



Locus.
Nascitur
in sabuletis,
& rudibus.

Qualitates.

Vniuersa
planta in & sis
est. Succus su-
mè quidem a-
marus est, le-
uiterque cali-
dus: Et ex se-
cundo sit ordi-
ne excalfaciē-
tium. Digerē-
di etiam vim
possidet: &
subtilium est partium. Radix similem succo
facultatē obtinet: abstergit namque, digerit
& emollit. Porro cortex ea potentius desiccāt
Sta

Staphis agria, Vua syluestris, Herba pedicularis, & pituitaria: Græcis, σταφίς ἀγρία, ἡ ἀσταφίς ἀγρία: Arabibus, Alberas, Habelras, Muibazagi, siue Miubezegi: Italis, Stafusaria: Germanis, Bisimiintz: Hispanis, Fabarraz, Paparraz: Gallis, Stafis agria, seu Herbe aux poux.

Locus.

Nascitur in opacis. Plin. li. 23. cap. 1.

Qualitates.

Vehementer acrem obtinet facultatem, abstergitque valenter. Sed & vrendi vim aliquam habet.

Gal. li. 6. sim. me.



P 4 Thap

Thapsia Latinis & Græcis: Arabibus, Hiā
tum, & Drix: Gallis, Turbit blanc.



Locus ex Matthiolo.


*Plurima nascitur in Apulia, praesertim
Cargano monte.*

Qualitates.

*Acre habet ac vehemēter excalfaciētē fa-
cultatē cū humiditate. Quamobrē ex alto Via-
lēter extrahit: Et ipsū quod extrahit, digerit.*
Spar

Gale. lib.
6. simpl.
medic.

Spartium sine, Spartum: Græcis, σπάρτιον:
Italīs, Spartio: Germanis, Pfrimmen: Gal-
lis, Genest d'Espagne.



Locus ex Fuchfio.

Siccis & aridis gaudet, iuncusque est pro-
pria aridi soli.

Plin. libr.
29. cap. 2.

Qualitates.

Semen, & Virgarum succus non instrenue
trahentis est facultatis.

Gal. li. 8.
simp. me.

P 5 Geni

Genista, Genesta, Genistella, seu Gene-
stra: Italis, Genestra: Germanis, Ginſt: Hispa-
nis, Genestra, Giesta, & Giesteira: Gallis,
Geneste. Locus ex Fuchſio.



Nascitur
in Sabuletis,
aridisque lo-
cis, in colli-
bus, & secus
vias.

Qualitates
ex Meſue.

Planta to-
ta perturbat,
prouocat, inci-
dit & atte-
nuat, obestq;
cordi & Ven-
triculo. Epo-
tum semen pi-
tuitam & tringue Valentissimè purgat, & ab
articulis quoque humores trahit. Renum &
Vesicae excrementa & calculos pellit. Fit ex
floribus oxymel, cuius & su indurati lienes re-
soluuntur. Dosis florū à drachmis duabus ad
quinq; seminis Verò, à drachmis duabus ad
quattuor.

Nar

Narcissus: Græcis, *νάρκισσος* & : Arabibus,
Narces, seu Nargies: Italis, Narcisso: Germa-
nis, Vethbluomen, Hornungs bluomen,
aut, Zeit lossen: Gallis, Narcisse, Campa-
nette, seu, Iannette.

Locus.

Nascitur Dio. li. 4.
in montibus, cap. 155.
seriturque in
hortis ad coro-
namenta.

Qualitates.

Gale. lib.
8. simpl.
medica.

Narcissus ra-
dix adeo exic-
candi faculta-
te pollet, & &
maxima Vul-
nera congluti-
net, & ad in-
cisiones & que
circa ten-
dones acci-

dunt. Habet etiam quiddam abstersorium
& attractorium.

Ricin



Ricinus, Palma Christi, Cataputia maior, Regium granum, Pentadactylon, siue Croton, Græcis, *κρότων*, ἡ κρότων: Arabibus, officinis, Cherua: Italis, Girasole, Mirasole seu, Faggiuolo turchesco: Germanis, Vunder bau, seu, Kreutz baum: Hispanis, Figueira de l'inferno: Gallis, Palma Christi.

Plin. libr. 15. ca. 7.

Locus

Germania
est Aegypti
Hispania: se
ritur tamen
hodie in hor
tis.

Qualitates

Ricini se
men quema
modum expu
gat, detergi
ac digerit, s
quoque foli
sed Undequ
que debiliu
Oleum quo

ex semine conficitur, calidius, & tenuiorum e
partium quam oleum commune: ac proinde
etiam discutit.

Tith



Galen. li. 7. simpl. medica.

Tithymalus masculus, Characias, Amygdaloides, siue lactaria herba. Græcis, τιβυμάς & χαπανίας: Arabibus, Xauser, seu, Ethula: Germanis, Vvollffs milch: Hispanis, Leche trefna, seu, Leche tregna: Gallis, Tithymale de Montaigne.

Locus.

Nascitur in asperis, & montibus. Dio. li. 4. cap. 159.

Qualitates.

Tithymali omnes Vincen- Gal. lib. 8. sim. ræd. te habet acre, calidæque facultate. Inest vero & amaritas: Validissimus itaq; est eorū liquor. Se- cūq; locū tenet semen & folia. Sed & radix dictarū facultatū



articeps est, sed non ex aquo. Valentissimus amen omnium est Characias: deinde Myrsites: post, qui in petris nascitur: deinceps qui serbasco adsimilis est, & Cyparissias: deinde parinus: post, emò Helioscopius.

Tithyma

Tithymalus foemina, siue Myrsinites, My
tites, Cariytes, siue candida Lactaria.



Locus.

Dio. li. 4.
cap. 159.

Nascitur in asperis.

Qualitates.

Vide historiam Tithymali Characia.

Thi

Tithymalus paralius, Tithymalis, Lactur Dio. li. 4.
ca marina, siue, Lactuca Caprina. cap. 159.



Locus.

Nascitur in maritimis.

Qualitates.

De hoc ex Tithymalo Characia conijcitur.

Tithy

Diosc. li.
4. ca. 159

Tithymalus Helioscopius.



Locus.


Circa oppida nascitur, potissimum in ruderibus.

Qualitates.

Eandem habet vim quàm cetera Tithymalorum genera,

Tithy

Tithymalus Cyparissias, siue Esula mi-
nor: Arabibus, Scebram minus.



Locus.

Nascitur vbiq; ferè circa oppida, & se-
cus vias.


Qualitates.

Huius pro omni Tithymalo inualuit & suo:
ex alijs ergo de hoc conycito.

Q

Tithy

HISTORIA
Tithymalus Dendroides.



Locus.

Dlo. H. 4.
cap. 159.

Nascitur in petris.

Qualitates.

*Imbecillior est ceteris Tithymalis, quan-
quam sit eiusdem facultatis.*

Pytia

Pytiusa, siue Esula maior: Græcis, *πυτίσσα*:
 Arabibus, Scebram maius, Alsebram ma-
 ius, Mehezcheregi, siue Phthias: Italis, Esu-
 la maggiore: Gallis, Turbit noir.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in Montibus, maximeque in
 Gargano Monte Apulia,

Qualitates:

Species est Tithymalorum, quod succum
 habeat Et illi, quodque similiter illis purget,
 ceteraque omnia viribus illis sit adsimilis.

Gale. li. 8
 simp. me-
 dica.

Q 2

Lathy

Lathyris, siue Cataputia minor: Græcis,
 λαβυγίς: Arabibus, Mendana: seu Mahendane:
 Italis, Cacapuzza, seu Cataputia minore:
 Germanis, Springkraut, Spring koerner, seu
 Tereib koerner: Hispanis, Tartago: Gallis,
 Espurge.

Locus ex Fuchfio.

Gale. li. 7.
 simp. me-
 dica.



Nascitur ubi
 que in hortis,
 locisque cul-
 tis & sabulo-
 sis gaudet.

Qualitates.

Succum ha-
 bet ut Tithy-
 malis, eodem
 que modo pur-
 gat totaque
 illis faculta-
 te similis est:
 nisi quod se-
 men gustanti-
 bus videatur
 dulce, quod
 sanè etiam

maximè purgatoriam vim obtinet.

Peplus

Peplus, siue Esula rotunda: Græcis, *ωι-
πλος*: Gallis, Reueille matin des vignes.



Locus.

Nascitur inter Vites, & in hortu.

Dio. li. 4.
cap. 162.

Qualitates.

*Succum habet similem Tithymali, cum in
alijs, tum quia purgat cum alijs.*

Gal. li. 8.
simpl. me-
dica.

Q 3

Cha

Chamelæa, Oleastellum, Leo terræ, siue
Herba viduifica: Græcis, χαμελαία: Arabi-
bus, Mezerion, seu Alemezerion: Germanis,
Zylandt: Gallis, Boys Gentil.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus.

Qualitates.

Gale. li. 8.
simpl. me-
dica.

Vincentem habet qualitatem amaram:
proinde sordida admodum Ulcera, & qua ma-
ximas habent crustas, cum melle purgare potest.

Thy

Thymelæa, Piper Montanum, seu Leo
terræ:Arabibus, Mezereon.



Locus.

Nascitur in montibus & asperis:

Qualitates ex Diosc.

Semen per inferna, bilem, pituitam, aquas Dio.li.4.
que detrahit, si viginti granorum pars in- cap. 167.
terna bibatur. Verum fauces adurit: proinde
temperandum est, & adhibenda hic cautio.
Vide Mesuen in Mezerio.

Q 4

Sambu

Sambucus: Græcis, ἀνθή: Arabibus, Iaf
 &ti: Italis, Sambuco: Germanis, Holder, fe
 Holler, Hispanis, Sabugo, & Caninero
 Gallis, Sureau, Suseau, Suyer, aut Seu.



Locus ex Fuchſio.

*Nascitur in opacis, & asperis: gaudetque
 fluviorum ripis.*

Qualitates.

*Vtraque Sambucus desiccandi, congluti-
 nandi, modicęque digerendi facultatem ob-
 tinent.*

Ebu

Ebulus: Græcis, χαμαϊάνη: Arabibus, Cha-
meactis: Italis, Ebulo: Germanis, Attich, seu
Niderel holdel: Hispanis, Hiezugso, aut Sa-
ugo pequegno: Gallis, Yeble.



Locus, Qualitates.

Eisdem locis gaudet quibus Sambucus,
Idemque vires habet.

Q 5

Apios



Locus.

*Nascitur in montibus. E Creta tamen
Apulia adfertur ad nos.*

Qualitates ex Theophrasto.

Theoph.
de natu.
plāt. li. 9.
cap. 10.

*Datur ad expurgandum corpus: quod a
ra radice parte superius, altera inferius
purget.*

Co

Colocynthis, siue, Cucurbita syluestris:
 ræcis, *κολοκυνθίς*: Arabibus, Chandel, Han-
 dæl, seu Handal: Italis. & Hispanis, Colo-
 quintida: Germanis, Coloquint, & Vvil-
 der Kurbisz: Gallis, Coloquinte, aut Cour-
 quinte sauuage.

Locus ex Fuchfio.

Seritur se-
 mine, in hor-
 tis.

Qualitates.

Colocynthis Gale. li. 6.
 gustu amara simpl. me-
 est: sed qua dica.
 amarissimo
 medicamen-
 to epoto ad-
 sunt opera, ea
 euidenter ef-
 ficere nequit,
 ob purgato-
 riam facul-
 tatem, quam

olidam in sese continet: nimirum cum ijs
 ea expurgat, antè & ipsa per aluum excer-
 prauertens. Viridis ipsius succus intritus Is-
 iadici prodest.

Epithy

Epithymum, Latinis, & Græcis: Arabicis, Epitimo, & Efichemo: Italis, Epitimo: Hispanis, Cabellos, & flores de Thymillo: Gallis, Epitimum, seu Teigne de Thym.

Locus.

Dio. li. 4.
cap. 172.

Calc. li. 6.
simp. mc.



Flos est ad-
nascens Thy-
mo, seu Po-
dagra Thy-
mi est.

Qualitates.

Epithymum
Thymi facul-
tatem habet:
ad omnia ta-
men efficacius
est: desiccatur
enim & ex-
calfacit ordi-
ne tertio.

Cassutha

Cassutha, Cassytha, Cuscuta, siue Podala Lini: Italis, Cuscuta: Germanis, Flachs iden: Gallis: Couche m'icy.


Locus.

In frutices
 & herbas Epithymi modo profilit: & in-
 uitq; earum
 adminiculo
 fulta, nulla
 radice nixa:
 sed velut ab
 alarum sinu
 prodeuntibus
 cirris, capilla-
 mentisue lon-
 gissimis.

Qualitates,
 ex Matthio-
 lo.

Eadem illi
 & facultas, qua & plantis in quibus na-
 tur. Excalfacit tamen ordine primo, siccât-
 secundo. Abstergit, & quadam cum ad-
 tione corroborat. Consule Matthiolum su-
 per Viribus.

Alypum



Alypum, siue Alypia, Latinis & Græcis
Gallis, Turbit blanc.



Locus.

Gignitur in maritimis.

Qualitates, ex Paulo.

Dio. li. 4.
cap. 173.
Aegin. li-
bro 7.

*Alypi semen inferius purgat bilem, pa-
Epithymo mensura, cum sale, & aceto: in-
stina verò leniter exulcerat. Caterum ad n-
sola adfertur radix, quæ vicem Turpeti a-
supplet.*

Vi

Vitis sylvestris, Atragena Theophrasto:
 ἀμπελὶς ἁγρία: Italis, Vite saluati-
 llis: Gallis, Vigne sauvage, aut Tam.



Locus.

Nascitur in Dumetis, Sepibus, & monti-
 bus syluosis.

Qualitates.

racemi extergendi vim habent: sed & ad Galen.
 Etionem quandam extrema germina ob-
 tent, qua & sale condiri assolent.

Vitis

Vitis alba, Bryonia, siue Psyllothrūm:
 Græcis, ἀμπέλ & λόννη: Arabibus, Fesire,
 Alfesire, Fesslera, siue Alfescera, Nezargie-
 san, aut Nezarchasen: Italis, Vite bianca,
 aut Zucca saluatica: Germanis, Stick vvurtz
 & Teufel Kirbsz: Hispanis, Nuexa, & Anor-
 ca: Gallis, Coleuurée, aut Feu ardent.

Locus ex Matthiolo.

Passim se-
 cus vias, &
 propter sepes
 prouenit.

Qualitates.

Prima ger-
 mina adstrin-
 gunt modice
 cum quadam
 acrimonia et
 subamarore.
 Radix abster-
 gentem, desic-
 cantē, & te-
 nuum par-
 tium, ac mo-
 deratē cali-
 dam vim obtinet. Corymbi depilatorij sunt.

Vitis

Gale. li. 6.
 simpl. me-
 dica.



dam vim obtinet. Corymbi depilatorij sunt.

Vitis nigra, siue Vua Taminia : Græcis,
 ὑπέλα & μέλαινα : Arabibus, Fesire senta-
 sim, Fesi resim, Alfesi resim, & Fasersim:
 Italica, Vite nera, seu Tamaro : Hispanis,
 Congorca : Gallis, Tam, aut Coleuuree
 Nere, & Achaïre.



Locus.

Nascitur in apricis.

Qualitates.

Fiti alba ad omnia similis, nisi quod im-
 pillior.

R

Balsa

Plin.li.23

cap.1.

Gale.li.6.

simp.me.

Balsamina, Viticella, seu Momordica.
 Italis, Viticella, Caranza, Balsamina, seu
 Pomodi Ierusalē: Germanis, Balsam Kraut,
 seu Mænnlin: Gallis, Merueilles.



Locus ex Matthiolo.

Nusquam nisi satz provenit.

Vires ex Matthiolo.

*Folia Vulnera recentia glutinant. Oleum
 ramicosis pueris efficax remedium est, si eo lo-
 cus saepius perungatur. Vide Matthiolum.*

Filix

Filix mas: Græcis, *wikis*: Arabibus, Sa-
 rax, aut Sarachs: Italis, Felce: Germanis,
 Vvalde farn: Hispanis, Helecho yerua: Gal-
 lis, Feugiere malle.

Locus.

Nascitur in Dio. R. 4.
 montibus & cap. 178.
 saxosis.


Qualitates.

Latum Lum-
 bricum radix Gal. li. 8.
 iterficat, quat sim. me.
 tuor drachma
 rum pondere
 ex aqua mul-
 sa. pota. Ad
 eundem mo-
 dum sumpta,
 foetum viuum
 necat: mor-
 tuum autem
 eicit: est enim

amarapaulum habens adstrictionis. Vlceri-
 bus imposita desiccata: non tamen mordax
 est.

R 2

Filix



Filix foemina : Græcis, *θηλυπέρης* : Italis,
 Felce femina : Gallis, Feugiere femelle.



Locus.

Nascitur ubique, sed maximè frigido solo.

Pli. li. 17.

cap. 9.

Qualitates.

Gale. li. 8.

fm. mc.

*Similem Vim priori Filici sortita est: quan-
 quam & hac sterilitatem adferre credatur.*

Filicu


Filicula, siue Polypodium : Græcis, *ὑπόδιον*: Arabibus, Bisberg, Aibeig, & Bef-
faigi : Italis, Polipodio : Germanis, Engel-
suesz, Baumffarr, & Dropffavvertz: Hispa-
nis, Filipodio : Gallis, Polipode.

Locus.

Nascitur in Dio. li. 4.
muscosis pe- ca. 180.
tris, & vetu-
stis arborum
caudicib. pra
sertim quer-
cuum.

Qualitates.


Dulcem si- Gal. li. 8.
mul & an- sim. me.
stiam habet
vincentē qua-
litatem: Et fa-
cultatis sit ad
modum desic-
cantis, citra
morsum ta-
men.



R 3

Poly

HISTORIA
Polipodium alterum.



Locus ex Matthiolo.

Nascitur in montibus.

Qualitates.

Eiusdem est temperatura cuius prius.

Dryo

Dryopteris, siue Filix quercus: Græcis.
Alpovó wíepis: Italis. Felce quercina: Germanis,
 Baum farn, seu, Eychel farn: Gallis, Fuchie-
 re des Chesnes.



Locus.

Nascitur in Veterum quercuum musco.

Dios. lib.
 4. ca. 181.

Qualitates.

*Gustu mistam facultatē præfert, dulcem,
 acram, amaram: in radice vero item acerbā.
 Facultatem habet septicam: proinde etiam pi-
 lis glabrā cutem efficit.*

Gale. lib.
 6. simpl.
 medica.

R + Cni

Cnicus, Cnecus, Carthamus, Crocus horten-
 tensis, siue Crocus Sarracenicus: Græcis
 κνίνος: Arabibus, Kartham, seu, Chartham,
 Italis, Saffarano Sarracinesco: Germanis,
 Vvilder Saffran: Hispanis, Alacor, & Semer-
 re de Papaïos: Gallis, Saffran bastard.

Locus

Seritur in
 hortis,

Qualitates

Cnici semi-
 ne duntaxat
 ad purgatio-
 nes stimu-
 Tertij est ordi-
 nis exalfaci-
 tium si quis fa-
 ris eo & i co-
 let.

Gal. li. 7.
 sim. mc.



Mercu

Mercurialis mas: Græcis, λινόξωτος: Italis,
Mercorella: Germanis, Bingelkraut: Hispani-
nis, Mercuriale, & Ortiga muerta: Gallis,
Vignoble, seu Mercuriale.



Locus.

Nascitur in campestribus cultis.

Qualitates.

Pli. li. 23.
cap. 5.

Mercuriali stantur omnes ad Ventris pur-
gationes dūtaxat. Verū enimvero si quis eius
facere periculū solet in Cataplasmate. sanè eā
digerētis admodū facultatis esse experietur.

Gal. li. 7.
sim. me.

R s Mercur

Mercurialis foemina : Italis, Mercorella
femina : Gallis, Mercuriale femelle.



Locus, Qualitates.

Eisdem natalibus gaudet eandemque facultatem obtine- quam & superior: nisi quod hac pota à purgatione menstrua & genitalibus admota facit ut femina gignantur, superior verò masculis.

Cyno

Cynocrambe, Brassica Canina, siue Mer-
curialis sylvestris: Græcis, κυνοκράμβη: Italis
Mercorella bastarda: Germanis, Vvild bin-
gel kraut: Gallis, Mercuriale sauuage.



Locus ex Matthiolo.

Omnibus ferè locis provenit, in campis, in
villis, & in vineis.

Qualitates ex Dioscoride.

Folia cū caulibus pota; a' uñ ciēt. Ius decocta Dio. li. 4.
& pituitam, & bilem, aquamque detrahīt. cap. 184.

Helio

Heliotropium maius, Officinis Verrucaria: Græcis, ἡλιοτροπιον μέγα.

Locus

Dios. lib.
4. ca. 185



Nascitur
in asperis, in
campis, secus
vias, circa a-
dificiorū pla-
teas, aridis i-
tem & sabu-
losis locis.

Vires ex
Dioscoride.

Decoctum
potum pitui-
tam bilemque
per aluum ex-
trahit. Adal-

ligatur herba ad conceptus impediendos.
Qui plura volet, consulat Dioscoridem.

Helio

Officinalis. *Heliotropium minus* Latinis & Græcis,
 Ballis, Soucy de Marais.



Locus.

Nascitur in palustribus, & iuxta Lacus. Dio. li. 4
 Vires ex Diosc. cap. 186.

*Herba cum suo semine pota, adiecto nitro,
 Topo, Nasturtio, & aqua, latas tineas, tere-
 & excutit. Pensiles verrucas, quæ acrochor-
 nes & vocantur, cum sale illita, tollit.*

Caltha,

Caltha, Calendula, siue Calthula: Italis,
Fior Rancio: Germanis, Ringelbluom: Gal-
lis, Souffy.

Locus ex Fuchfio.



Nascitur
in cultis, &
seritur in hor-
tis.

Qualitates
ex eodem.

Mediocri-
ter dulcis est
& aliquate-
nus amara.
Vnde conij e-
re licet illam
esse calidam
& siccam.

Ex Matthiolo.

Gustu est adstringenti, cum leuisscula a-
maritudine. Ex quo non video quomodo me-
scere possit, nisi id fiat occulta quadam fa-
cultate. Siccat & puluis, cauis dentium immis-
sus dolorem lenat.

Scor

Scorpioides, Latinis, & Græcis.



Locus ex Matthiolo.

Rara admodum planta est.

Qualitates.

*Excalfacit quidem ordine tertio, desiccatur
secundo.*

Ex Plinio.

Valet aduersus animal nominis sui.

Gal. lib. 8.
sim. med.

Pli. li. 22.
cap. 15.

Vitis

Vitis vinifera: Græcis, ἄμπελος οἰνόφορος: Arabibus, Harin, seu Karm: Italis, Vite domestica: Germanis, Vveinreb: Gallis, Vigne.

Diosc. li.
1. cap. 1.

Locus.
Nota, notis
simaque.



Qualitates.

Folia refrigerant & adstringunt, idē efficiunt Capreoli. Lacryma caudicum Vitis, qua velut gummi concrevit, calculos pellit. Vna Omphacina frigida & sic ea est: matura autem calefacit & humectat primo ordine, ex Symeone Sethi.

Historiæ Plantarum

FINIS.

**SIMPLICIUM
MEDICAMENTO-**

RVM FACULTATES

secundum locos ex
Dioscoride.

**AD CAPITIS DOLOREM
EX FRIGIDITATE GE-
NITVM.**



RIS Illyrica cum aceto, &
rosaceo illita.

Oleū syluestris oliua inunctū.

Oleum amygdalinum illitum
per se.

Viticis semen emplastri modo adhibitum.

Amygdala amara cum aceto vel rosaceo fron-
ti vel temporibus illita.

Torpedo marina viua per se tantum ad-
mota.

Lana succida cum aceto, & rosaceo im-
posita.

Sisymbrium fronti, & temporibus illitum.

Hedera corymborum, vel foliorum succus cum
aceto

aceto, & rosaceo perfusus.

Aloë temporibus, & fronti ex aceto, & rosaceo illita.

Mentha fronti per se illita.

Serpyllum coctum, adiecto rosaceo, acetoque madefactum, & appositum.

Melilotus rosaceo, aut aceto madefacta, & imposita.

Baccharis folia illita per se.

Ruta cum rosaceo, & aceto illita.

Anisum potum per se.

Sphondylium cum ruta illitum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo illitum.

Melanthium fronti per se illitum.

Conyza minor per se illita.

Anagyris tenera folia drachma pondere ex vino pota.

Rhodia radix recens cum rosacei momento imposita.

Hippoglossum pro seroto capiti impositum.

Chamaedaphne folia trita, & imposita.

Elaterium ex lacte naribus insusum.

Rusci folia, & bacca in vino pota.

Scammonia ex aceto, & rosaceo perfusa.

Aqua marina vapor operto capite receptus.

AD

AD CAPITIS DOLORES

A CALIDA CAUSA

EXORTOS.

*Oleum sive stris olivae inunctum.**Unguentum rosaceum diuturnum modo impositum.**Ligustri flores fronti ex aceto illiti.**Rosarum aridarum ex vino mixtae et expressus liquor appositus.**Vitici semen appositum.**Portulaca per se imposita.**Melilothus cum aceto aut rosaceo aspersa.**Nymphaea radice pura, & per se naribus indita.**Rhodia radix cum rosaceo fronti temporibusque adhibita.**Papaveris liquor fronti cum rosaceo illitus.**Psyllium ex rosaceo, acetoque, aut aqua impositum.**Hippoglossi serum appositum.**Sedum maius cum rosaceo illitum.**Solani hortulani folia adhibita.**Vinifera vitis folia, & capreoli imposita.**Ophites lapis adalligatus.*

Ad expurgandum caput.

*Brassica succus naribus infusus.**Anamonis succus naribus infusus.*

aa 2

Beta

Beta succus naribus infusus.

Chelidoni ma. succus naribus infusus.

Cyclamini ma. succus naribus infusus.

Cepa succus naribus infusus.

Pyrethrum diu mansum.

Staphis agria diu mansa.

Colocynthis in catapotys deuorata.

Vua passa cum pipere commanducata.

Atramentum sutoriū lanis naribus inditū.

Capitis dolores excitant.

Styracinum oleum olfactum.

Olinæ flauæ in cibis acceptæ.

Glandes in cibis acceptæ.

Palmule Pheniciæ in cibis acceptæ.

Iuglandes nuces in cibis acceptæ.

Arbuti fructus deuorati.

Ferula caules deuorati.

Mei radices largius sumptæ.

Absinthij liquamentum haustum.

Ad veterinosos.

Viticis semen cum rosaceo et aceto perfusum.

Castoreum ex aceto, & rosaceo naribus infusum.

Cepa decocta, & in cibum sumptæ.

Sinapi derafo capiti appositum.

Sphondylium suffitū, & ex oleo capiti illitū.

Peucedanū cum aceto, & rosaceo inunctum.

Ad somnum conciliandum.

Iris Illyrica pota.

Amomum

Amomum fronti illitum.

Amygdala amara deuorata.

Vitis semen potum.

Lactuca in cibum sumpta.

Aloe illita per sese, & ex rosaceo.

Baccharis odorata.

Iunci Aethiopici semen potum.

*Papaueris erratici quinque, sex & capita in
Vini cyathis tribus ad dimidium decocta.*

& potui data.

*Papaueris foliorum, et Vascularum decoctum,
tum bibitum tam perfusum.*

Hyoscyami semen potum, ac appisum.

*Solani somnifici radicū cortex drachma pon-
dere in Vino potus.*

*Mandragora radicis ex Vino decoctum cyathi
Vnius mensura potum.*

Mandragora pomia olfacta naribus.

Mandragora liquor sedi pro balano subditus.

*Somnia terribilia tumultuosaque
representant.*

Faba in cibum accepta.

Lentes in cibum accepta.

Picnocomi semen drachma pondere potum.

*Smilacis lewis semen cum dorycnio potum ter-
nis singulorum obolis.*

Ad sternutamenta cienda.

Sinapi semen tritum, & naribus admotum.

aa 3 Ptar

Ptarmica flores admodi.

Struthij radix trita, & admoda.

*Ranunculi radix sicca, & in puluerem trita,
naribus indita.*

Daphnoides naribus indita.

Veratri albi radix trita & imposita.

Ad vertiginosos.

Balsami semen per se potum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo uilitum.

Galbanum olfactum.

*Brionie radix pota per continuum annum
quotidie drachma pondere.*

*Vitis nigra & viticula prima recentes decocta,
& in cibis accepta.*

Vinum Scillinum potum.

Acetum Scillinum potum.

Ad apoplexiam.

*Vitis alba radix continuo anno quotidie drach-
ma pondere hausta.*

Ad comitiales.

Cardamomum ex aqua potum.

Cancamum per se potum.

Balsami semen haustum.

*Bitumen Naptha suffitum comitiales depre-
hendit.*

Populi nigra semen ex aceto.

Ficus sicca in cibum accepta.

Concu

Concula Indica suffica excitant.

Coagulum leporinum potum.

Mustela Ventrículo coriandro infarctus, in-
ueteratūque deuoratus.

Mustela eiusdem sanguis potus.

Asinum secur restum in ieiunio sumptum.

Vngula asini combusta epota.

Equorum lichenes triti, & ex aceto hausti.

Lapis in hyrundinum pullorum prima fetu-
ra Ventrículo inuentus pro amuleto in cer-
ui alutā suspensus.

Serum lactis potum quousque alium citet.

Phocæ coagulum bibitum.

Vrsinum fel ad lingendum datum.

Testudinis fel naribus inditum.

Testudinis terrestris sanguis potus.

Ciconiæ finum ex aqua potum.

Plātago cum lēticula decocta, in cibis sumpta.

Sinapi tritum naribus inditum.

Piper diu mansum.

Scilla hausta.

Agaricus drachma pondere cum oxymelite
haustus.

Eryngii radix ex dulci aqua ebibita.

Rutæ syluestris semen potum.

Seselis Masiliensis radix, & semen potum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo capiti inun-
ctum.

Sagapenum potum.

aa 4

Lafer

Laserpitij liquor cum aceto mulso bibitus.

Ladanum olfactum:

Ammoniacum in eclegmate cum melle datū.

Trifolij semen, & folia pota.

Conyza cum aceto bibita.

Anthyllis altera ex oxymelite pota.

Betonica folia hausta.

Quinquefolium triginta diebus haustum.

Papaveris Spumei Semen cum mulsa aqua potum.

Veratrum nigrum potum.

Hippophaesti succus trium obolorum pondere haustus.

Vitis alba drachma pondere anno toto quotidie hausta.

Vitis nigra Viticula prima Virentes cocta, & in cibis sumpta.

Acetum mulsum potum.

Vinum, & acetum Scillinum potum.

Selenites lapis tritus ebibitus.

Aetites lapis cū cyprino Vnguento, aut glencino, vel alio excalfaciente illitus.

Cotes naxia pota.

Ad phrenesim.

Vnguentum crocinum perfusum, aut naribus admotum, vel illitum.

Vitex cum aceto, & oleo instillatus.

Asparagus in vino albo potus.

Serpillum

pillum cum aceto & rosaceo impositum.
condylium suffitum impositum, et capiti ex
oleo inunctum.

ucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

Ad cerebri inflammationes, quas sy-
riasin vocant.

curbita ramenta sincipiti apposita.

ponis ramenta sincipiti adhibita.

eliotropij folia fronti adhibita.

etum fronti illitum.

Ad melancholiam.

mi semen potum.

atrum nigrum potum.

onica folia pota.

thymum potum.

Ad crapulam & ebrietatem arcendam.

um ex passo presumptum.

icorum malorum succus haustus.

rti baccarum succus haustus.

sica summo cibo sumpta.

inthium presumptum.

Ad capitis defluxiones.

uentum irinum naribus illitum.

rax illita suffit aque.

umen naphtha suffitum.

namomum potum.

a a s Mei

*Meiradices trita cum melle in eclegmate de-
uorata. Sibi fluxio pectus afficiat.*

*Nuces anellanae tosta, & cum exiguo piperis
potu.*

*Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa de-
uorata.*

Tragacantha in eclegmate cum melle sumpta.

*Hyssopum cum fico, ruta, melléque ex aqua
decoctum potum.*

*Helicrysy coma trium obolerum pondere in vi-
no diluto pota.*

*Hyoscyami semen oboli pondere, addito pap-
ueris semine haustum.*

Ad cerebrum roborandum.

Agallochum potum.

Ad capitis manantia vlcera.

Thus cum Nitro confricatum.

*Fici & caprisici lacteus succus cum polenta
appositus.*

Vrina inueterata apposita.

Fœnum grecum appositum.

Cicer adhibitum.

Malua ex Urina humana emplastrata.

Allij cinis ex melle inunctus.

Cyclamini decoctum fomenti modo adhibiti.

Bulbi cum cremato Nitro adhibiti.

*Melilotus ex aqua cum creta chia, Cinôque
aut galla inuncta.*

Re

Rubi folia imposita.

Illy cremata radix ex melle adhibita.

Adiantum in lixivio decoctum.

Acida muria inaspera.

NERVORVM.

Ad conuulsionem.

ris Illyrica ex aceto pota.

Acori decoctum bibitum.

Cardamomum ex aqua potum.

unci odorati radicis drachma una cum pa-
ri pondere piperis per dies aliquot data.

Costus ex vino, & absinthio exhibitus.

Balsamum ex aqua haustum.

Helenium ex melle in eclegmate exhibitum.

nguentum Sampsuchinum more cataplas-
matis appositum.

nguentum Metopium illitum.

Bedellium illitum.

uniperi bacca bibita.

Cedrides deuorata.

Halimi radix drachma pondere in aqua
musa hausta.

Ficulneus cinis ex oleo illitus.

Erinacei terrestris caro in cibum sumpta.

Castoreum inunctum, & potum.

Serpillum potum.

Fimum caprinum cum aceto bibitum.

Dracum

*Dracunculi radix tosta, & elixa deuorata
cum melle.*

Asphodeli radix drachma pondere pota.

Capparis semen potum.

Capparis cortex pariter haustus.

Argemone emplastrata.

*Agaricus sumptus trium obolorum pondere
cum mulso.*

Rhaponticum potum.

Galbanum deglutitum.

Gentiana radix drachma pondere pota.

Aristolochia rotunda bibita.

Centaurij maioris radix ex vino pota.

Spina alba semen potum.

Acanthij radices potæ.

Abrotani semen cum aqua potum.

*Leucacantha radices ex vino decoctum ex-
haustum.*

Origanum estum cum fico.

Eryngij radix pota cum aqua mulsa.

Pulegium cum posca potum.

Calamintha decoctum haustum.

Baccharis radix in aqua decocta, & pota.

Panaces herculeum linitum.

*Libanotis radices cum loliacea farina em-
plastrata.*

Pencedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.

Clinopodium bibitum.

Chamedryi decoctum potum.

Lasfer

Lasus denarij Lasus oboli pondere datum & deuoratum.
Sagapenum potum.
Galbanum deuoratum.
Betonica folia denarij pondere cum hydra-
melite data.
Xyridis radix ex passo bibita.
Symphytum ex aceto mulso bibitum.
Scyllium illitum.
Serpyllum potum, aut illitum.
Verbasci decoctum bibitum.
Bryonia eclegma ex melle.
Linum scillinum haustum.
Linum chamædryites bibitum.
Linum tragoriganites bibitum.
Satyrii radix ex vino nigro austero bibita.
Coris ex vino pota.

Ad resolutionem neruorum.

Peucedanum ex aceto, & rosaceo inunctum.
Sapparis fermen, & cortex potus.
Sagapenum potum.
Rubie radix hausta.
Colosynthis clistere perfusa.
Vitis nigra viticulae primæ recentes, coctæ,
comestæq.
Linum Scillinum haustum.

Ad tremorem.

Cerebrum leporinum tostum comestum.

Casto

Castoreum potum. & inunctum.

Brassica in cibo sumpta.

Althaeae decoctum potum.

Ad fluxiones.

Farina tritici cum Apollenaris herbe succo
apposita.

Farina hordei ex aceto adhibita.

Ad agritudines & dolores.

Oleum Sicyonium inunctum.

Oleum laurinum illitum.

Elaomeli illitum.

Vnguentum cyprinum inunctum.

Vnguentum Glencinum inunctum.

Vnguentum Metopium inunctum.

Vnguentum Amarae inunctum.

Bdellium malagmati infertum.

Lixiuum ex cinere ficis ex oleo illitum.

Castoreum potum. & illitum.

Erinacei terrestres caro deuorata in cibis.

Viperinae carnes decocte. & si data.

Poterij radice decoctum potum.

Pencedanum ex aceto. & rosaceo inunctum.

Laser oboli pondere deuoratum.

Centaurium minus ebibitum.

Lilij radix massata, melle, ne excepta im-
posita.

Satyrj radix ex vino nigra deuorata.

Althaeae radix per se, vel decocta in vino.

aqua mulsae emp. astri modo imposita.

Coccum

ocum infectarium cum aceto illitum præci-
fos inuat nervos.

enecij folia ad eadem præstant illita.

Tarcij radix illita, ad eadem stiliter im-
ponitur.

lippophasti succus trium obolorum pondere
potus.

qua marina perfusa.

lacetum Scyllinum potum.

inum de stæchade haustum.

inum de thymo potum.

esamum illitum crassitiem inuat.

Ad Neruorum vulnera.

ochlea terrestres tusa, & imposita.

erreni vermes tusi, & illiti.

atyrum illitum.

enecionis folia emplastri modo imposita cum
thuris manna.

racunculi minoris folia illita.

oterij radix tusa, & imposita.

ily radix ex melle subacta, & illita.

ocum infectarium cum aceto illitum.

Tarcij radix illita.

Ad Neruorum crassitiem.

esamum emplastri modo impositum.

urmentitius cinis cum axungia, & oleo illi-
tus.

OCV

Ad Palpebrarum pilorum defluuium.

*Nardi Indica decoctum fotu adhibitum.**Cochlea terrestres acu trañciuntur Et effluat humor, quo postea palpebra illiniuntur.**Oesipus illitus.**Condrilla gummi, ac pariter lac impositum.**Lapis armenius illitus.*

Ad Palpebrarum oculorúmque scabritiem.

*Thuris cortex tostus, & appositus.**Picis fuligo illita.**Licium appositum.**Sepia os lenigatum & illitum.**Fel Marini Scorpionis illitum.**Fel Marinae Testudinis illitum.**Fel Perdici illitum.**Fel Aquilae illitum.**Fel Gallinae albae illitum.**Fel Sylvestris Caprae illitum.**Sinapi tritum ex melle inunctum.**Omphacium impositum.**Squama aris illita.**Rubigo ferri illita.**Chalcitis inuncta.**Hematites lapis melle exceptus adhibitus.*

Ad Palpebrarum inflammationes.

Amaraci folia cum polenta illita.

Alfene cum polenta imposita.

Ricini folia cum polenta trita & emplastri modo adhibita.

Ad Minuendam palpebrarum
crassitiem.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.

Conchula Indica cinis inunctus.

Ad Palpebrarum scabiem.

Caprae succus cum paris Spodio impositus.

Aloë illita.

Fici lac inunctum.

Ad Oculorum albugines.

Opobalsamum illitum, instillatumque.

Cancamum Sino maceratum, & impositum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha impositum.

Mitulorum cinis plumbi modo lotus & illitus.

Conchula Indica cinis oculis inditus.

Cochlearum putaminum cinis melle exceptus linitus.

Marini Scorpionis fel instillatum.

Idemque prestat fel testudinis, perdicis, aquila gallina alba, & Sylvestris caprae.

Vrina humana aereo vase decocta illita.

Lactuca Sylvestris lacteus succus instillatus.

Dracunculi succus immixtus.

Caparum succus perfrictus.

Gingiber illitus.

Chamaesyces succus cum melle immixtus.

Argemones folia imposita.

Ammoniacum impositum.

Horminum ex melle impositum.

Loti domestici succus ex melle illitus.

Sal impositum.

Salis flos eodem modo adhibitus.

Sapphyrus lapis appositus.

Aeris Squama imposita.

Ad Oculorum cicatrices delendas.

Cancanum vino maceratum & infusum.

Myrrha illita.

Bitumen naphtha instillatum.

Cedria illita.

Cochlearum terrestrium cinis cum melle impositus.

Vrina humana aereo vase deacta infusa.

Fœni graeci oleum cum myrteo impositum.

Sagapenum inditum.

Chamaesyces succus cum melle illitus.

Aerugo immixta.

Vini fœx adusta imposita.

Corallium tritum inditum.

Hematites lapis immixtus.

Sapphyrus lapis adhibitus.

Cochlearum

Cochlea terrestres cum suo putamine vsta, &
ex melle imposita.

Ad oculorum nubeculas.

Acori succus instillatus.

Casia alijs medicamentis ocularibus excepta,
& iniecta.

Cinnamomum impositum.

Cerasi gummi inditum.

Acacalis dilutum ad collyria additur, quæ
oculis claritatem faciunt.

Acacia succus elotus, & infusus.

Punicorum malorum cyti tres quantumvis
minimi demorati integro anno ab omni lip-
pitudine præseruant.

Thus immixtum.

Crocomagma illitum.

Ebeni tenuissima ramenta vino optimo mace-
rata, & in collyria addita.

Lycium inditum.

Cedria inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Vipera caro decocta, & in cibis desumpta.

Hirundines ficedularum modo in cibis deno-
rata.

Cinis hirundinum collyrijs adhibitus.

Adeps piscium inunctus.

Feniculi succus infusus.

Fel Marini Scorpionis infusum.

Fel Marina Testudinis infusum.

bb 2

Fel

Fel Perdici infusum.

Fel Aquilæ infusum.

Fel Gallinæ albe infusum.

Fel Sylvestris Capræ infusum.

*Vrina humana æreo vase decocta instil-
lata.*

Lactucæ Sylvestris lacteus succus illitus.

Dracunculi mar. rad. succus inunctus.

Caparum succus inditus.

Loti domestici succus infusus.

*Hirundinariæ mar. succus æreo vase cum mell-
decoctus inunctus.*

Othonnæ succus instillatus.

Centaurij minoris succus impositus.

Ruta incibis sumpta.

Omphacium instillatum.

Panaces Herac. inunctum.

*Libanotis foliorum, & rad. succus infusus
cum melle.*

Laser ex melle inunctus.

Apiastri succus cum melle inditus.

Marrubij succus ex melle illitus.

Pumex indita.

Salis flos immissus.

Vini fax cremata imposita.

Pyrites lapis inditus.

Thyites lapis impositus.

Geodes lapis impositus.

Sapphyrus lapis impositus.

Ad

Ad oculorum vngulas.

Sepia piscis os tritum & impositum.
Glycyrrhizæ radicis puluis inspersus.

Ad oculorum ictus, & recentia vulnera.

Lac humanum cum thure iniectum.

Sanguis Palumbi illitus.

Sanguis Columbae illitus.

Sanguis Turturis illitus.

Sanguis Perdici illitus.

Stæbis folia emplastri modo imposita.

Hematites lapis cum lacte iniectus.

Ad oculorum vlcera.

Fuligo Thuris illita.

Fuligo Terebinthinae illita.

Fuligo Butyri illita.

Thuris cortex impositus.

Myrrha iniecta.

Cornu ceruinum & stum impositum lotum.

*Amylum linitum, & peculiariter canis vlc-
ceribus.*

Stimmi iniectum.

Lapis Galactites cum lacte infusus.

Lapis Sapphyrus cum lacte infusus.

Lapis Samius cum lacte infusus.

Ad erosos oculorum angulos,

Oesypum inunctum.

bb 3

Omp

Omphaciuxi illitum.

Ad oculorum finus & ægilopas.

Inglan dium. Seterum nuclei triti, & illiti.

Myrti decoctum infusum.

Malua cruda commanducata cum exiguo sale adhibita.

Plantago emplastri modo imposita.

Auricula muris altera illita.

Baccharis folia emplastri modo in principio indita.

Anthemis illita.

Solani hortulani concisa folia imposita.

Eiusdem succus cum rubenti gallinarum fimo illitus.

Ægilops adhibita.

Oenanthes. v. labrusca flos impositus.

Cadmia illita.

Aeris squama indita.

Stimmi inditum.

Ad procidentes oculos, & vuas.

Fabiarum farina cum rosis, quorum albo, & thure emplastri modo imposita.

Rubi folia trita, & imposita.

Sapphyrus lapis adhibitus.

Ad oculorum inflammationes.

Amomum ex Cua passa illitum.

Fuligo

Fuligo Thuris illita.
 Fuligo Picis illita.
 Cupressi pilula cum polenta illita.
 Myrti bacca cum polline polenta im-
 cotoneorum malorum flores emplastri modo.
 Cascus illitus.
 Saccharum infusum.
 Sesame herba ex vino decocta, & imposita.
 Portulaca cum polenta illita.
 Intybus per se, & cum polenta adhibita.
 Cucurbita ramenta imposita.
 Anemones radix illita.
 Auricula muris cum polenta emplastri modo
 adhibita.
 Gentiane succus inunctus.
 Abrotanum cum cydonio malo decoctum, aut
 pane, & emplastri modo adhibendum.
 Melilotus cataplasmatis additus.
 Baccharis folia illita.
 Sedi maioris folia imposita.
 Apium cum pane, aut polenta impositum.
 Rubi Idei flos ex melle inunctus.
 Elatine folia cum polenta imposita.
 Papaveris liquor cum tosto oui vitello, & cro-
 co impositus.
 Hyosciami semen, & folia cum farina, polen-
 ta & imposita.
 Mandragora folia recentia cum polenta ad-
 hibita.

Verbasci aureum florē ferentis folia imposita.

Aster Atticus illitus.

Viola purpurea folia illita.

Ricini folia cum polenta imposita.

Ad oculorum dolores.

*Oui Vitellus tostus addito rosaceo, & croco
illitus.*

Sesame herba in vino decocta illita.

Ocimi succus infusus.

Absinthium ex passo decoctum adhibitum.

Ruta cum polenta emplastri modo imposita.

*Aconiti pardalianches radix permiscetur ocu-
larijs medicamentis, quæ doloribus oculo-
rum auxiliantur.*

Ad lusciosos.

*Iecoris Caprini emanans succus dum assatur
iniectus.*

*Iecoris Hyrcini emanans succus dum assatur
iniectus.*

Caprinum iecur tostum in cibis sumptum.

Syluestrium caprarum fel inunctum.

Sanguis Palumbi illitus.

Sanguis Columba illitus.

Sanguis Turturis illitus.

Sanguis Perdici illitus.

Ad oculorum suffusiones.

Fel marini Scorpionis inditum.

Vipera

Tipera adeps admixto cedrino liquore, Atti-
co melle, & Vetere oleo. Gal. Verò non pro-
bat.

Fel testudinis marina illitum.

Fel Perdici illitum.

Fel Aquila illitum.

Fel Gallina alba illitum.

Fel Caprae sylvestris illitum.

Fabarum farina vino macerata, & illita.

Caparum succus instillatus.

Cyclamini succus infusus.

Megapenum impositum.

Euphorbium impositum, cum cautela tamen.

Ad oculorum hebetudinem.

Tancamum ex vino maceratum infusum.

Populi alba pilula, quae primo foliorum exortu
exiliunt ex melle illita.

Marini Scorpionis fel inunctum.

Brassica in cibo sumpta.

Sinapi cum melle inunctum.

Anagallidis succus naribus exceptus.

Absinthium cum melle impositum.

Thymus in cibo sumptus.

Thymbra obsonijs addita.

Ruta succus in malicorio feruefactus, addito
faeniculi succo & melle infusus.

Ruta sylvestris succus cum vino melle, gallina
ceorum felle, & faeniculi succo iniectus.

bb s Solani

Solani somnifici succus inunctus.

Flos salis inditus.

Ad oculorum fluxiones colibendas.

Crocum illitum cum humano lacte.

Thus ex oui Vitello impositū, vel eiusdem albo.

Thuris fuligo imposita.

Picis fuligo illita.

Platani tenerissima folia in vino decocta & illita.

Ebeni ramenta tenuissime trita indita.

Olea Sylvestris foliorum succus iniectus.

Cornu ceruinum & stum, lotum, & iniectum.

Butyri fuligo illita.

Amylum impositum.

Pompholis elota iniecta.

Faba sine cortice commanducata, & fronti imposita.

Ocimi aquatici semen duarum drachmarum pondere ex quatuor mellis cyathis temperatum, inunctum.

Elatinae folia cum polenta imposita.

Squama axis elota iniecta.

Plumbum elotum iniectum.

Galactites Lapis cum lacte iniectus.

Morochthius Lapis cum lacte iniectus.

Samius Lapis cum lacte iniectus.

Hyoscyami sem. cremor expressus infusus.

Sarcocolla infusa.

Alumen

lumen impositum.

orallium iniectum.

umex impositus.

lematites lapis iniectus.

Ad oculorum lippitudines.

ortulaca, & eius succus impositus.

lantaginis succus infusus.

edi maioris folia illita.

halcitis inditus, cum cautela tamen.

bongiarum crematarum cinis illitus, &

presertim in arida lippitudine.

lematites lapis tritus cum lacte iniectus.

Ad oculorum caligines.

hamadrys trita inspersa, aut ex oleo inuncta.

loti domestica succus cum melle impositus.

eratru nigrum in ocularibus collirijs additum.

los aris inditus.

A V R I V M.

Ad aurium dolores.

auri baccarum succus vino vetere, & rosa-

ceo exceptus instillatus.

populneorum foliorum succus infusus.

ad anum ex vino illitum.

rosarum aridarum decoctum ex vino infusum.

malicis foliorum, & corticis succus cum rosa-

ceo in malicorio feruefactus illitus.

Malo

Malorum acidorum punicorum succus cum melle coctus infusus.

Opium cum amygdalino oleo, croco myrrhaq³ iniectum.

Anguium senecta in vino decocta instillata, Millepeda, siue onisci concisi, & cum rosaceo in malicorio calefacti infusi.

Vulpini pulmonis adeps instillatus.

Vermes terreni cū anserino adipe elici inditi.

Anserinus adeps instillatus.

Gallinaceus adeps instillatus.

Vulpinus adeps instillatus.

Vrina Tauri cum myrrha cocta instillata.

Vrina Apri cum myrrha cocta instillata.

Mel cum trito fossili sale infusum.

Sesami semen ex rosaceo iniectum.

Beta succus inditus.

Plantaginis succus immissus in calida materia.

Cucurbita ramentorum succus cum rosaceo infusus.

Dracunculi & trinsq³ succus instillatus.

Porri succus cū aceto, thure, & lacte iniectus.

Sinapis succus, vel eius decoctum instillatū.

Hedera, & eius corymborum succus cum oleo inditus.

Absinthium suffitum, & cum melle impositum.

Origani virentis succus cum lacte infusus.

Menta

Menta succus inditus.
Meliloti succus cum passo iniectus.
Ruta succus in malicorio feruifactus infusus.
Peucedani succus cum rosaceo inditus.
Aparina succus iniectus.
Marrubij succus in rosaceo instillatus.
Cannabis domestica succus impositus.
Polygoni mari succus infusus.
Helxina succus inditus.
Decimi aquatici succus cum sulphure, & nitro iniectus.
Hyoscyami seminis cremor instillatus.
Solani hortensis succus impositus.
Alfina succus infusus.
Cucumeris asinini foliorum succus inditus.
Sal cum aceto iniectum.

Ad aurium internas inflammationes.

Crocum iniectum.
Sesamum cum rosaceo impositum.

Ad aurium parotidas

Desypum impositum.
Caprarum montanarum simus, Vino vel aceto decoctus illitus.
Lini semen tritum, & emplastri modo impositum.
Fabrum farina cum melle, & feno græco illita.

Rumex

Rumex decoctus adhibitus.
Plantago emplastri modo illita.
Irionis semen tusum decoctumq; appositum.
Hyssopum suffitu incensum, & impositum.
Viscum cum pari resina, ac cera commistum
adhibitur.
Althea decocta illita.
Psyllium ex rosaceo, acetoq; aut aqua im-
positum.
Solani hortulani flosa cum sale illita.
Galiossis ex aceto adhibita.
Cimolia terra imposita.

Ad purulentas aures.

Myrrha cum meconio, castoreo, & glaucio
iniecta.
Thus ex vino dulci infusum.
Resina Tenebrathina ex melle, & oleo indita.
Resina Larigna ex melle, & oleo indita.
Resina Abiegna ex melle, & oleo indita.
Resina Picea ex melle, & oleo indita.
Lycium infusum.
Rhois decoctum iniectum.
Myrti baccarum succus instillatus.
Olea sylvestris foliorum succus ex vino infusus.
Taurinum fel cum caprillo, humano ve lacte
instillatum.
Vrina infusa.
Umbilicus Veneris cum medulla cervina in-
iectus.

Aspho

Aphodeli radicum succus per se. & addit is
thure melle vino. & myrrha instillatus.

epi succus impositus.

absinthium cum melle inditum.

Anisum cum rosaceo instillatum.

phondij florum succus instillatus.

olygoni succus infusus.

tebis decoctum iniectum.

syllij succus inditus.

mphactum cum melle impositum.

hemeris sanguinalis herba succo exceptum in-
fusum.

los salis iniectus.

Ad contusas aures.

albi cum polenta impositus.

sulphur cum vino & melle illitum.

Ad exulceratas aures.

esypum impositum.

ullum fel instillatum.

Ad aurium surditatem.

astu & regia radicum ex oleo decoctum inie-
ctum.

epa succus instillatus.

eratrum nigrum immisum. & relictum

usque in diem tertium.

ryonia succus cum melle instillatus.

los aris candidus per fistulam flatu impulsus.

Sulp

Sulphur raptim per fistulam suffitum.

Ad aurium tinnitum, & incertos sonos.

Cedria infusa.

Lauri baccarum succus cum vino vetere, & rosaceo instillatus.

Ficus sicca trita cum sinapi, & liquore aliquo excepta iniecta.

Taurinam fel infusum.

Mel cum trito fossili sale inditum,

Porri succus cum thure, aceto, lacte q³ instillatus.

Cepæ succus impositus.

Sinapi tritum, & cum fico iniectum.

Acetum calidum suffitum per traiectorium instrumentum.

Ad vermiculosas aures.

Cedria cum aceto instillata.

Vrina humana in malicorto decocta instillata,

Capparidis radicis succus iniectus.

Calaminthe succus instillatus.

Psyllij succus inditus.

Acetum infusum.

N A R I U M.

Ad sanguinis narium fluxiones.

Thus in puluerem tritum iniectum.

Cocci

Cochlea terrestres cum suo putamine trita, & imposita.

Porri seminis succus cum thuris polline instillatus.

Ruta trita indita.

Vrtice & trinusque folia cum succo imposita.

Cuminum ex aceto impositum.

Ferula medulla intromissa.

Lysimachia imposita.

Clymeni succus inditus.

Galiopsis flos impositus.

Equiseti succus infusus.

Acetum tum potum, tum iniectum.

Stratiotes adhibita.

Chalcitis succo porri instillata.

Ad sanguinem e Naribus eliciendum.

Crocodilij radice decoctum bibitum.

Ad Narium Polypum.

Cupressi pilula cum fico tusa, & imposita.

Dracunculi maioris radix imposita.

*Lasertij liquor cum chalcantio, aut rasili
argine illitus forcipe prius exciso polypo.*

Flos aris inditus.

Sandaracha cum rosaceo immissa.

Ad Narium vlcera & carcinomata.

Dracunculi maioris radix imposita.

Hedera succus infusus.

Sandaracha cum rosaceo iniecta.

cc

Ad

Ad Narium tedia.

Hedera succus infusus.

Ad narium destillationes.

Melanthij semen tritum, & in linteolo colligatum, saepe ac saepius olfactum.

Ad trahendum per nares.

Capæ succus infusus.

Origani & triusque succus iniectus cum Irino Unguento.

Cyclamini maioris succus instillatus.

Ad cienda sternutamenta.

Fibrorum testiculi iniecti.

Ocymi semen, aut succus naribus infusa.

Sinapi tritum inditum.

Ranunculi radix sicca, trita & que iniecta.

Ptarmicæ flores olfacti.

Struthij radix imposita.

Veratrum album tritum iniectum.

ORIS ET LINGVAE.

Ad erodentia ulcera.

Cyperì radìcis farina in os indita, etiam si Ulcera depascentur, Sorèntque.

Asspalathi ex Vino decoctum ore collutum, ad tetra oris Ulcera.

Acacia indita.

Plantaginis succus in ore detentus.

Cap

Capparis in aceto decocta in collutione.

Glycyrrhizæ succus in ore detentus.

Origani succus in ore contentus.

Leucij flores ex melle impositi.

Testiculus serapias impositus.

Anthemis mansa.

Britannica succus infusus.

Tribuli succus ex melle delinctus.

Rubi decoctum in ore detentum.

Quinquefolij radice decoctum ore collutum.

Verbenaca altera ex vino affusa.

Staphis agria cum melle indita.

Labrusca siccis ori inspersa.

Alumen cum melle impositum.

Sal cum polenta tostum, & iniectum.

Ad oris halitum commendandum.

Resina lentiscina manducata.

Myrrha mansa.

Mala medica manducata.

Anisum mansum.

*Bromus cum siccis rosis decocta, in ore re-
tenta.*

Ad linguae scabritiem.

Menta confricata.

Rhois semen cum melle fricatum.

DENTIVM.

Ad dentes purgandos.

Cinis Purpurea dentibus affricatus.

Cinis Buccina dentibus affricatus.

Cinis Mitulorum dentibus affricatus.

Cinis Conchula Indica dentibus affricatus.

Cinis cochlearum terrestrium dentibus affricatus.

Cinis Sepia piscis dentibus affricatus.

Cinis Cervini cornu dentibus affricatus.

Plantaginis radices decoctum in collutionibus.

Aristolochia rotunda confricata

Alcyonium quintum dentibus affricatum.

Pumex dentibus affricata.

Arabicus lapis dentibus affricatus.

Samius lapis dentibus affricatus.

Ad dentium dolorem.

Picea, & pini folia trita ex aceto decocta frequenti collutione.

Cedria dentium cauis indita.

Platani corticis ex aceto decoctum ore collutum.

Tamaricis foliorum ex vino decoctum in ore detentum.

Olei amurca in cupreo vase ad mellis trasfitionem decocta ex aceto, aut vino, aut mulso colluta.

Mori corticis decoctum, aut pariter foliorum in collutionibus adhibitum.

Ficul

Ficulinum lac lana exceptum, & cauis dentibus inditum.

Angutum senecta ex aceto decocta in collutionibus.

Pastinace piscis aculeus in eius cauda promi nens, dentibus adhibitus.

Ranarum ex aqua & aceto decoctum in collutionibus.

Lacerta secur cauis dentium impositum.

Vermes terreni oleo elixi, & in contrariam aurem instillati.

Rumicis decoctum in collutionibus.

Asparagi radicum decoctum in ore contentum.

Asphodeli radicum succus in contrariam aurem infusus.

Allij, teda, thuris que simul decoctum in ore contentum.

Ononis radice ex pesca decoctum in collutionibus.

Capparidis seminis decoctum in collutionibus.

Idem prestat Capparidis cortex. Quin & radix commanducata.

Lepidij (Et aiunt) radix collo suspensa.

Ranunculi radix imposita.

Anagallidis succus in contrariam narium partem infusus.

Hedere corymborum acini quinque cum rosa ceo in malicorio feruefacti in contrariam

aurem instillati.

*Chamaeleonis nigri decoctum in ore contem-
tum.*

Spina alba decoctum in collutionibus.

Leucacantha radix commanducata.

Absinthij decoctum suffitum.

Hyssopi ex aceto decoctum in ore retentum.

Panaces Heracleum dentium canis inditum.

Pyrethri decoctum ex aceto in ore acceptum.

Peucedani succus canis dentium inditus.

*Nigella decoctum, Vna cum teda ex aceto in
ore detentum.*

Lasertij liquor canis dentium impositus.

Galbanum illitum, & eorum canis inditum.

Apiastri decoctum in collutionibus.

Althæa decoctum ex aceto in ore detentum.

Betonica decoctum ex Vino, Vel aceto.

Clematis prima commanducata.

Polemonij radix commanducata.

Quinquefolij radice decoctum in ore retentum.

*Hyscyami radice ex aceto decoctum in collu-
tionibus.*

*Solani somnifici ex Vino decoctum in ore re-
tentum.*

Ephemerij radice decoctum in collutionibus.

Verbasci decoctum collutum.

Arction ex Vino decocta, & in ore detenta.

Cucumeris sylvestris decoctum in os sumptum.

Colocyntidis decoctum in collutionibus.

Sta

Staphis agria decoctum ex aceto in ore contentum.

Tithymali caracia lac dentium cauernis inditum, dente prius cera munito, ne lac in fauces incidat.

Acetum calefactum in collutionibus.

Sory dentium cauis inditum.

Ad dentes cariosos frangendos.

Cedria eorum cauitatibus indita.

Amurca olei cum omphacio recocta ad mellis crassitudinem, & imposita.

Pastinaca piscis aculeus impositus.

Ranunculi radix iniecta eorum cauitatibus.

Chamaeleonis nigri radix cauernis dentium indita.

Ad firmandos commotos dentes.

Lentisci decoctum in ore retentum.

Colymbadum muria in collutionibus adhibita.

Syluestris olea oleum in ore contentum.

Sory in collutionibus.

Alumen cum aceto, & melle solutum, & adhibitur.

Ad dentium torporem.

Portulaca manducata.

Ad fluidas gingiuas.

Cyperi farina imposita.

cc +

Rosa

Rosarum aridarum ex Vino decoctarum expressus liquor, in collutionibus impositus.

Colymbadum muria in ore contenta.

Oleum Sylvestris olea in ore detentum.

Galle quoquo modo adhibita.

Mali punici florentes cytini in decoctis macerati, & in collutionibus additi.

Prunorum foliorum decoctum in ore retentum.

Lac asininum in collutionibus.

Pulegium siccatum, crematumque & in puluerem tritum appositum.

Rubi decoctum in ore detentum.

Staphis agria decoctum in collutionibus

Omphacium cum melle impositum.

Acetum in collutionibus adhibitum.

Rubigo ferri illita.

Alumen quocunque modo adhibitum.

Sal tostum cum polenta impositum.

Alabastrites Lapis tritus impositus.

Smyris Lapis tritus impositus.

Ad Erosas putridasque gingivas.

Cancanum impositum, nihilque eo efficacius.

Lycium attritum impositum.

Plantaginis succus in ore detentus.

Aloë ex Vino, & melle illita.

Tribuli Striusque fructus ex melle impositus.

Labrusca florum combustorum cinis cum melle illitus.

Ace

Acetum in collutionibus.

Chalcitis trita, & imposita.

Alumen tritum, & impositum.

Pumex trita, & imposita.

Aerugo trita, & imposita.

GUTTURIS ET GVLAE.

Ad Anginam.

Pix liquida peruncta.

*Mori fructus succus in aereo vase decoctus, in se
latiusque cum mellis exiguo illitus.*

Multipeda siue Oroscij ex melle inuncti.

*Cinis crematarum hyrundinum ex melle mo-
re emplastri adhibitus.*

*Hyrundines sale inueterata drach. i. ponde-
re cum aqua pota.*

Fel taurinum cum melle inunctum.

Fel testudinis illitum.

Acetum gargarizatum.

Mel gargarizatum.

Cepae succus inunctus.

Piper cum melle inunctum.

Absinthium cum melle, & nitro illitum.

Raphani semē ex aceto mulso gargarizatum.

Hyssopi cum fico decoctum gargarizatum.

*Laserpitij liquor cum mulsa aqua gargari-
zatus.*

Viola purpurea ex aqua cocta, & pota,

cc 5

Elate

Elaterium efficacissime illinitur cum melle

Vetere oleo, aut felle taurino.

Sal ex melle, oleo. & aceto illitum.

*Spartij succus e ramis in aqua maceratis, &
mox tuis, extractus, & illitus.*

Ad Gutturis inflammationes.

*Cinis crematarum hyrundinum ex melle m
re emplastri applicitus.*

Lac gargarizatum.

*Rana oleo elixa cernicis & colli abscessibus
lita.*

Mel illitum.

Origani virentis succus gargarizatus.

*Helxine succus gargarizatus, forisque inun
ctus.*

Vr:ica vtriusque succus gargarizatus.

Chalcitis imposita.

Alumen illitum.

Sal tostum cum melle inunctum.

Acetum gargarizatum.

Aloë cum vino aut melle apposta.

Britannica succus illitus.

Tribuli fructus ex melle impositus.

Rubi mororum succus gargarizatus.

Ficuum siccarum decoctum gargarizatum.

Ad columellam reprimendam.

Lasertij liquor cum melle inunctus.

*Pruni foliorum ex vino decoctum gargari
zatum.*

Ompla.

Omphacium impositum.

Acetum gargarizatum.

Flos aris in puluerem subtilissimū impositus.

Ad Gulæ destillationes.

Papaueris Vasculorum decoctum ex melle in eclegmatis forma redactum, sæpiusque linctum.

Bdellium cum ieiuna salina dilutum, & illitum.

Verbenaca altera ex vino gargarizata.

Omphacium impositum.

Flos aris pulverizatus, & impositus.

Alumen impositum.

Acetum gargarizatum.

Ad Faucium & Tracheæ arteriæ asperitates.

Myrrha lingue subdita, ibique liquata.

Ptisana hordeacea gargarizata.

Amylum delinctum.

Sinapis succus gargarizatus.

Glycyrrhizæ succus lingue subditus.

Tragacantha in eclegmate cū melle sumpta.

Laserpitij liquor aqua dilutus in delinctu.

Symphytum petraum commanducatum.

Quinquesolij radices decoctum gargarizatū.

Aethiopsis cum melle in eclegmate.

Lac gargarizatum.

Licum attritum, & delinctum.

PEC

PECTORIS
PECTORIS ET
PVLMONIS.

Ad cruenta sputa & sanguinis
reiectiones.

Ouum tepidum bibitum.

Cornu ceruini cinis lotus, & ebibitus cum tragacantha.

Climenum potum.

Serpilli succus drachmarum duarum pondere cum aceto potus.

Fimum caprinum tritum, in vino, aqua & potum.

Triticea farina glutinis modo elixa, in decoctione linctu data.

Amylum potum.

Ferule Viridis medulla pota.

Portulaca ad summum cocta deuorata.

Plantago quoquo modo exhibita, praesertim succus.

Eiusdem semen potum.

Porri semen drachmarum duarum pondere cum paribus myrti baccis.

Agaricus trium obolorum pondere cum aqua mulsa potus.

Rhaponticum haustum.

Lysimachiae succus haustus, & perfusus.

Centaurij maioris radix pota.

Spina alba radix hausta.

Arabica

Arabica spina radix pota.

Aloë cochlearium duorum pondere cum frigida aqua vel sero pota.

Polygoni maris succus potus.

Salvia succus in orbiculos concretus cum melle sumptus.

Symphytum petraum cum aqua potum.

Mentha succus cum aceto potus.

Althæa decoctum potum.

Betonice folia trium obolorum pondere in diluta vini potione hausta.

Symphyti alterius radix pota.

Achillea hausta.

Tragi cacumina decem in vino bibita.

Personata radix cum pineis nucibus pota.

Isopyri semen potum.

Adiantum potum.

Tricomanes pota.

Vitis Vinifera foliorum, & capreolorum succus haustus.

Labrusca flores poti.

Omphacium parvè potum.

Corallium haustum.

Hamatites lapis cum mali punici succo pota.

Morochthus lapis cum mali punici succo pota.

Samia terra cum mali punici succo pota.

Ad

Ad Phtisim, seu Tabem.

Pistacia per se, aut ex melle sumpta.

Pinea nuces per se, aut ex melle sumpta.

*Terebinthina, resina per se, vel ex melle m
re eclegmatis deuorata.*

*Pix liquida in eclegmate ex melle cyathi m
sura deuorata.*

Iuniperi bacca hausta.

*Lauri bacca trita cum melle vel passo, deu
rata.*

Ficus sicca cum hyssopo feruefacta, & pota.

Cancris fluuiatiles elixi cum suo iure sumpti.

Lac humanum ex vbere suctum.

Ius esculentum omnium adipum datum.

Plantago in potu exhibit a.

Porrum cum melle decoctum.

*Agaricus drachma pondere sumptus cu
passo.*

Acanthi radices pota.

Marrubij folia, siue expressus succus potus.

Betonica folia cum melle data.

Myrrhis in sorbitione pota.

Asii lapidis flos ex melle delinctus.

Ad pulmonis abscessus.

*Semen cyclaminis secundae speciei quadragi
ta diebus potum.*

*Tragoriganum cum melle in eclegmate exh
bitum.*

Tussi

Tussilaginis sicca, incensaq³ fumus ore haustus, apostemata interna pectoris rumpit.

Ad suspiriosos.

Lauri bacca trita cum melle, vel passo, & exhibita.

Ficus sicca cum hyssopo decocta, & pota.

Vulpinus pulmo exiccatus bibitus.

Ius senum gallorum potum.

Vinum hyssopites bibitum.

Plantago cum lenticula decocta comesta.

Rhaponticum bibitum.

Aqua mulsa pota.

Aristolochia rotunda bibita.

Centaurij maioris radix pota.

Hyssopum decoctum cum fico, aqua, melle, rutaque potum.

Stachas ex aqua decocta pota.

Pulegium cum melle, & aloë potum.

Scylla ex melle trium obolorum pondere delincta.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia eodem modo pota.

Baccharis radice decoctum potum.

Ruta pota.

Peucedani succus in ovo sumptus.

Nigella in vino pota.

Galbanum deglutitum.

Marrubij decoctum, siue expressus succus potum.

Parth

Parthenium ex oxymelite sumptum.
Anagyris folia cum passo bibita.
Periclymeni semen potum cum vino.
Adianti decoctum potum.
Fidicula siue Trichomanes hausta.
Elaterium optima suspiriosis est purgatio.
Thapsie succus exhibitus.
Bryonia cum melle in eclegmate sumpta.
Sandaracha non resina in catapotis data.
Sulphur in oio sumptum, vel suffitum.
Agaricum drachma vnius pondere datum.
Cancamum haustum ex aqua vel mulso.

Ad Tussim.

Iris Illyrica assumpta.
Cardamomum ex aqua potum.
Cinnamomum deuoratum, vel potum.
Calamus odoratus suffitus per se, vel ex resina terebinthina.
Helenij eclegma ex melle deglutitum.
Myrrha ad quantitatem fabae deuorata.
Styrax data in eclegmate.
Bdellium datum in eclegmate.
Terebinthina resina ex se, vel ex melle eclegma delinctum.
Mastix pota.
Iuniperi bacca bibita.
Cedri fructus deuorati.
Paliuri semen potum.

Lad.

Ladanum in medicamentis, & malagmati-
bus insertum.

Cerasi gummi cum vino diluto exhaustum.

Amygdala amara cum melle, & lacte in il-
linctu data.

Gummi amygdalarum amararum cum vino
diluto potum.

Nuces anellana cum aqua mulsa pota.

Ficus sicca denorata.

Camedryi decoctum potum.

Scordium potum.

Tussilago sicca sumpta, siue incensa, accepto
fumo per os.

Propolis suffita.

Mel deglutitum.

Farina tritici glutinis modo elixa, & ad lin-
gendum cum mentha, & butyro data.

Farina auena cremor in sorbitione receptus.

Semen lini cum melle, & pipere sumptum.

Faba in cibis accepta.

Raphanus elixus manducatus, praesertim in
vetere tussi.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa de-
norata.

Asphodeli radix trium drachmarum ponde-
re pota.

Allium crudum, & coctum assumptum in ve-
tere tussi.

Iricnis semen cum melle linctum.

da

Piper

Piper delinctu acceptum.

*Scilla cum melle in eclegmate in diutinis tu-
sibus.*

Centaurij maioris radix hausta in antiqua.

Tragacantha in eclegmate cum melle.

*Hyssopum cum melle, fico, rutaque ex aqua
decoctum.*

Stæchas eodem modo parata.

Origanum in eclegmate cum melle linctum.

Tragoriganum eodem modo paratum.

*Baccharis radicum decoctum potum, in di-
tina.*

Panaces cum vino dulci potum.

Seselis Massiliensis radix, & semen haustum.

Myrrij radix comesta.

Dauci semen potum, in diutina.

Peucedani succus in ovo sumptus.

Laserpitij liquor in sorbili ovo datus.

*Marrubij decoctum, sine expressus succus bi-
bitus.*

Galbanum deglutitum, in Vetere.

Sagapenum deuoratum, in diutina.

*Helsine succus cyathi pondere bibitus in di-
tina.*

Equiseti radix, & herba pota.

Iunci decoctum bibitum.

*Papaneris Vascula in aqua ad dimidium
decocta, decoctoque addito melle, & ecl-
gma fiat ad lingendum.*

H

Hyosciani semen potum.

Verbasci decoctum potum, in antiqua.

Cacalia radix vino madefacta comesta.

Bryonia cum melle in eclegmate delincta.

Vne passæ alba caro exsiccata demorata.

Aqua mulsa pota.

Taphsia illita.

Vinum hyssopites bibitum.

Sandaracha suffita cum resina, accepto Vapore per fistulam vel traiectorium.

Sulfur in oro sumptum, vel suffitum.

Ad pectoris asperitates.

Glycyrrhizæ succus in ore retentus quousque colliquescat.

Radix cacaliæ in vino madefacta, & delincta.

Ad vocem expediendam.

Myrrha lingua subdita, quousque tota liquescat.

Tragacantha ex melle in delinctu adhibita.

Laser aqua dilutum, & in sorbitione sumptum.

Styrax delinctus.

Brassica commanducata.

Vinum hyssopites.

Ad Pleuretim.

Guillus adeps ex vino lotus, & cum cinere, & calce coactus impositus.

da z

Pa

Pastinaca erratica semen potum.
Sagapenum emplastri modo illitum.

Ad Lateris dolores vbi febris absit.

Fimum caprillum cum cera, & oleo sub-
litum, impositum.

Hordeacea farina vna cum meliloto, & p-
pauerum vasculis ex mulso elixa, illita.

Brassica caules virides cremati, & suillo a-
pe excepti, & impositi.

Leucacantha radices ex vino decoctum ha-
stum.

Asphodeli radix drachma pondere ex vino
pota.

Gentiana radicum succus drachma ponde-
sumptus.

Aristolochia rotunda ex aqua bibita.

Centaurij maioris radix pota.

Lasus in sorbitionibus datum.

Galbanum illitum.

Marrubij folia ex melle adhibita.

Trifolij bituminosi folia, semen & potum.

Aethiopis pota.

Acori decoctum potum.

Costus cum absinthio, & vino potus.

Agallochum ex aqua potum.

Myrrha faba pondere deuorata.

Bdellium haustum.

Resina terebinthina illita, appositae.

Bryonia

Bryonia ex melleo eclegmate delincta.

Ad Pulmonis inflammationes.

Decimum cum polenta illitum.

Artica Striusque semen cum melle delin-
ctum.

Tragoriganum ex melle in eclegmate sum-
ptum.

Chrysocome pota.

Aqua mulsa hausta.

Ad purulentas excreationes.

Prionis semen cum melle delinctum.

Betonica folia drachmarum duarum ponde-
re in aqua mulsa cyathis quatuor pota.

Personata radix cum pineis nucibus sum-
pta.

Aethiopsis hausta.

Linum hyssopites.

Andaracha ex mulso data. (Hoc medica-
mentum ego nunquam probauerim.)

Sulfur in oleo potum, Vel suffitum.

Linum hyssopites bibitum.

Ad asthmaticos.

Auri bacca ex melle, Vel passio accepta.

Alnus sicca cum hyssopo feruefacta, Et pota.

Rina impubis pota.

Ruta epota.

Cyclamini alterius semen potum.

dd 3

Dra

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa
cum melle in eclegmate sumpta.

Aqua mulsa pota.

Spondilij semen, & herba ipsa in sorbitione.

Equiseti radix, & folia hausta.

Abrotani utriusque semen tritum, & cum
aqua potum.

Hyssopum cum fico, melle, rutaque ex aqua
decoctum, potum.

Calamyntha decoctum potum.

Vinum hyssopites haustum.

Thymi cum melle decoctum potum.

Satureia cum melle hausta.

Seseli Massiliense potum.

Fidicula sine Trichomanis decoctum bibitum.

Cuminum cum posca sumptum.

Smyrni radix comesta.

Tapsia illita.

Ammoniacum bibitum.

Melissophylli folia in eclegmate delincta.

Tussilago sicca & suffita, adeo ut fumus in os
ingrediatur.

Hippophaesti succus trium obolorum pondere
haustus.

Botrys pota, vel in eclegmate data.

Periclymeni semen potum.

Adianti decoctum bibitum.

Ad renitentes excreationes.

Iris illyrica pota.

Coagu

Coagulum ferè omne potum.

Rhaphanus elixus deuoratus.

Porrum cum ptisana coctum esui datum.

Nasturtium coctum, in sorbitione datum.

Bulbi breui coctura elixi & in cibum sumpti.

Ammoniacum in eclegmate datum.

Scordium potum.

Cassia linita.

Lini semen in eclegmate delinctum.

Scille sicca oboli tres ex melle in eclegmate exhibiti.

Marrubium siccum potum cum iridis farina.

Pinum hyssopites haustum.

Ad pectoris destillationes.

Prionis semen cum melle delinctum.

Ad omnia pectoris incommoda.

Porrum cum melle decoctum comestum.

Glycyrrhizæ succus bibitus.

Thymus mellis mistus in delinctu sumptus.

Thymbra eodem modo parata.

Ordilij radix in eclegmate cū melle sumpta.

Libanotis radices potæ.

Thymphytum petraeum in mulso decoctum bibitum.

Quinquefolij radicis succus potus.

ad 4 COR

C O R D I S.

Ad Defectum animi.

*Cucumis olfactus.**Pulegium ex aceto naribus admotum.**Buglossum potum.*

Ad Cardiacam.

*Intybus per se & cum polenta illita.**Absinthium in passo decoctum, & appositum.**Rubi folia illita.*

Ad Præcordiorum duritiem.

*Rhaponticum potum.**Vinum absinthites potum.*

Ad Vetustas præcordiorum Inflammationes.

Scordium cum cera coactum impositum.

M A M M A R V M.

Ad Mammarum inflammationes.

*Thus cum cimolia, & rosaceo inunctum.**Cydonia mala cataplasmatibus adiecta, & illita.**Nuces iuglandes cum ruta, & exiguo melle imposita.**Fabarum lomentum per se, & cum polenta illitum.*

Aspho

Asphodeli radices, & folia ex vino adhibita.
Irionis semen illitum.

Hemerocallis radix emplastri modo imposita.

Althæa decocta, & superposita.

Vuarum Vinacei cum sale illiti.

Ostracites lapis cum melle impositus.

Geodes lapis cum aqua illitus.

Terra Samia ex rosaceo, & aqua imposita.

Ad Rigentes à partu mammas.

*Tritici furfures ex ruta decocto elixi, & ap-
positi.*

Baccharis folia emplastri modo adhibita.

*Epimedij folia concisa ex oleo cataplasmatibus
addita.*

Hyoscyami semen tritum ex vino illitum.

Ricini folia imposita.

Vuarum Vinacei cum sale illiti.

Ad Mammarum duritiam.

Erui farina emplastri modo imposita.

Chamæpitrys prima ex melle illita.

Vuarum Vinacei cum sale triti & impositi.

Ad Mammas exulceratas.

Conchula Indica cinis illitus.

Asclepiadis herbarum radices imposita.

Ad Lac in mammis concretum.

*Cera grumi decem granorum millij magni-
tudine sumpti.*

ad 5 Faba

*Fabarum lomentum per se, & cum polenta
impositum.*

Lentium farina illita.

Apium, & eius succus illitus.

Ad Extinguendum Lac.

Cicuta imposita mammis.

Ad Lactis Vbertatem præstandam,

Halimi folia in cibis sumpta.

Vitici semen potum.

*Ptisana hordeacea cum fœniculi semine co-
cta, & in cibum sumpta.*

Malux decoctum potum.

Sonchi succus haustus.

Lactuca in cibis recepta.

Ocimum deuoratum.

Eruca comesta.

*Anemone & eius caules cum ptisana hor-
deacea deuorati.*

Anisum potum.

*Aneti aridi seminis, & eorum decoctum hau-
stum.*

Fœniculum in cibo sumptum.

Nigella pluribus diebus pota.

Circæ semen in sorbitione potum.

Clematis prima in cibis accepta.

*Echij radix in sorbitione, vel cum vino hau-
sta.*

Glaux

*Glaux cum hordeacea farina sale, & oleo co-
cta, & deuorata in sorbitione.*

Polygala pota.

*Bryonia succus cum tritico coctus, in cibum
sumptus (sed hic prudentia opus est.)*

Ne Lac in mammis concreascit.

Menta cum polenta imposita.

Fax Vini cum aceto peruncta.

*Ad Mammās cohibendas, ne nimis
augeantur.*

Cicuta contrita, & imposita.

Cotes naxia illita.

V E N T R I C V L I .

Ad Vomitiones & nauseam.

*Cotoneorum malorum maceratorum liquor
haustus.*

Nardus Indica ex aqua pota.

Nardus Celtica ex aqua pota.

Palmula in cibo sumpta.

*Palmularum inuolucrum cataplasmatis con-
ferentibus adiectum.*

*Gallinaceorum Ventriculi interior folliculus
siccus, tritusq; cum Vino potus.*

Succinum haustum.

Faba in posca decocta, & in cibum sumpta.

Lentis xx. grana sine cortice deuorata.

Pha.

Phaselus in cibo acceptus.

Sisymbrium haustum.

Rubi folia exterius illita.

Lactuca illota deuorata.

Lens sylvestris esui data.

Scilla sicca epota.

*Agaricus trium drachmarum pondere per se
absque liquore sumptus.*

Gentiana radici succus cum aqua potus.

Alba spina radix hausta.

*Menta duo, tresve rami cum acida punica
succo poti.*

Paonia semen ex vino nigro potum.

*Betonica commanducata, moxq³ vino aqua
misto superbibito.*

*Vitis vinifera foliorum, capreolorumq³ suc-
cus potus.*

Myrtites Vinum potum.

Vini fax illita.

Scillinum Vinum potum.

Ad coeliacos.

Lycium potum, & inditum.

Cotonea mala cruda comesta.

*Mora immatura siccata, tusaq³ obsonij im-
mista.*

*Ficulnei cineris lixiuium pondere cyathi ex-
hibitum.*

Myrica in potu data.

Galla

Galla cum aqua aut Vino trita, & illita.

Rhois semen obsonijs inspersum.

Myrti folia trita, & ex aqua illita.

Olea sylvestris folia cum polenta illita.

Coagulum leporinum, & equinū trium obolorum pondere ex Vino potum.

Faba in posca decocta, & denorata.

Aegyptia faba farina, & corticis ipsius decoctum, ex mulso datum.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in aqua, aut Vino potum.

Plantago elixa in aceto, & cum sale sumpta.

Hyacinthi semen potum.

Coronopus decoctus in cibo sumptus.

Rhaponticum potum.

Spina alba radix pota.

Ferula Viridis medulla bibita.

Laserpitij liquor in Vna acino sumptus.

Nymphaeae radix siccata, & in Vino bibita:

Clymeni succus potus.

Limonij herbae semen acetabuli pondere ex Vino sumptum.

Tragi herbae acini decem ex Vino bibiti.

Papaueris Vascularum decoctum ex melle in eclegmate redactum in delinctu. Si vero efficacius reddere velis, adiungito hypocistidis, & acacia succum.

Vuarum Vinaceorum decoctum potum.

Vina

*Vinaceorum nuclei in farinam polenta modo
inpersi.*

*Aqua vel Vinum in quibus ferrū extinctum
fuerit pota.*

Morochthus lapis potus.

Vinum myrtites potum.

Adiantum ex Vino bibitum.

Trichomanes ex Vino pota.

Ad vomitiones ciendas.

Lauri folia pota.

Cochleæ Vepribus inhaerentes deuorata.

*Peponis radix sicca drachma pondere ex hy-
dromelite pota.*

Bulbus Comitorius deuoratus.

*Origani cum Rhoeis semine. Et capis in cu-
preo vase diebus quadraginta, dum cani-
cula sydus flagrat insolatum potum.*

Lemnia terra pota.

Ad ventriculi dolores.

Iuncus odoratus potus.

Bulbi comesti.

Rhaponticum bibitum.

Absinthium in passo decoctum potum.

Melilotum ex Vino decoctum haustum.

*Arthemisia tenuia folia ex oleo contusa em-
plastri modo imposita.*

Nymp

Nymphaea radix illita.

Senecioni: caulis in passo decoctus, denoratus

Vel potus.

Alabastrites lapis cum cerato impositus.

Ad ventriculi erosiones.

Nardus Indica ex aqua pota.

Nardus Celtica ex aqua pota.

Iuncus odoratus potus.

Sycomori succus potus.

Pinea nuces denorata.

Lac humanum potum.

Sonchi succus bibitus.

Pulegium cum posca sumptum.

Hieracii & triusq; succus haustus.

Scordium duarum drachmarum pondere cum
mulsa potum.

Paonia semen ex vino nigro potum.

Ad ventriculi ardores.

Portulaca cum polenta illita.

Sonchus emplastri modo impositus.

Umbilici Veneris succus illitus.

Intybus & traque ex aceto denorata.

Glycyrrhizae succus potus.

Apium ebibitum.

Foeniculum cum frigida aqua potum.

Polygonum illitum.

Solani hortulani folia apposita.

Cham

Chamadaphnes folia hausta.

Vitis Vinifera folia, & capreoli emplastri modo adhibita.

Labrusca flos illitus.

Ad ventriculi flatus.

Mei radices ex aqua feruesacta, vel citra coctionem trita pota.

Nardi Indica, & Celtica ex aqua pota.

Castoreum bibitum.

Gallinaceorum senescentium ius potum.

Absinthium cum seseli, aut gallica nardo potum.

Ligustici semen, & radix pota.

Smyrni semen haustum.

Ad singultum.

Sisimbrii semen in Vino potum.

Rhaponticum haustum.

Aristolochia rotunda bibita.

Mentha duo, tresve rami cum acida punice succo poti.

Anethi coma, & seminis decoctum potum.

Cuminum erraticum cum aceto potum.

Alysson potum, siue manibus gestatum, vel naribus infusum.

Aspleni decoctum potum.

Periclimeni semen potum.

Saxifraga bibita.

Ad acia

Ad acidos ructus.

Agaricus drachma pondere sumptus.

Tragoriganum potum.

Betonica folia faba pondere ex despumato melle sumpta.

Ad sanguinem & lac in ventriculo
concreta.

Ficulnei cineris lixiuium potum.

Coagulum Equinum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Coagulum Leporinum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Coagulum Agninum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Coagulum Hedinum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Coagulum Hinnulinum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Coagulum Vitulinum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Coagulum Bubalinum trium obolorum pondere ex Vino potum.

Helichrysi coma cum mulso pota.

Laser potum.

Ad inflammationes ventriculi.

Hieracium maius & minus emplastri modo impositum.

Vitis Vinifera folia & capreoli cum polenta impositi.

ee

Viola

Viola purpurea ex polenta illita.

Ad cibi appetentiam ciendam.

Piper comestum.

Acetum in obsonijs additum.

Absinthium potum.

Ad concoctionem adiuuandam.

Eruca in cibo comesta.

Piper omne comestum.

Gingiberis vsus.

Scylla cum melle cocta, & deuorata.

*Absinthium haustum, vel Ventriculo adhi-
bitum.*

Tragoriganum potum.

Pulegium potum.

Ligustici semen & radix pota.

Seselis Massiliensis semen cum Vino potum.

Carum potum.

*Betonica folia post cenam sumpta addito me-
le despumato fabae magnitudine.*

Vinum absinthites.

Ad stomachi fluxiones.

Adiantum potum cum Vino.

Persici mali sicci decoctum, & bibitum.

Cotonei mali macerati liquor potus.

I E C I N O R I S.

Ad iecinoris obstructiones.

Nardus Indica ex aqua frigida hausta.

Nardus Celtica ex aqua frigida hausta.

Lanri

Lauri cortex tribus obolis in vino odorato potus.

Piceæ folia drachma pondere in aqua, aut mulsa pota.

Amygdala amara cum melle, & lacte in dilinctu data uicis anellana magnitudine.

Gentiana radice succus cum aqua potus.

Agaricum potum.

Rhaphenticum exhaustum.

Eryngium ex vino assumptum.

Anthemidis decoctum potum.

Chamaepityos folia septē diebus in vino pota.

Betonica in aceto mulso drachma pondere bibita.

Eupatorij herba aut semen in vino potum.

Papaveris corniculati radix pota.

Rubrica Sinopica hausta.

Glycyrrhizæ succus delinctus.

Ad regium morbum.

Nardus Indica hausta.

Nardus Celtica hausta.

Cervinum cornu estum, ac lotum potumque.

Millepedæ sine ouisci ex vino poti.

Cicer cum roremarino decoctum comesum.

Rumicis radices in vino decoctæ & bibita.

Atriplicis semen bibitum cum mulsa aqua.

Asparagi radicum decoctum potum, cum ficis & ciceribus.

Crithmi, & eius radicum seminum decoctum
potum.

Iris cum melle linctā.

Scilla cum melle in eclegmate pondere trium
obolorum pota.

Hyrudinaria radix cum aniso, & vino pota.

Sphondylii semen potum.

Agaricus drachma pondere sumptus.

Rhaponticum haustum.

Absinthij decoctum, dilutum de trium cyatho-
rum pondere quotidie haustum.

Aloë drachma pondere pota.

Origani decoctum corpori perfusum.

Calamintha cum vino pota.

Feniculum erraticum potum.

Libanotis radices pota cum vino, & pipere.

Rorismarini decoctum potum.

Nigella trita cum Irino Unguento, naribus
apposita.

Chelidoniij radix cum aniso, & vino albo
pota.

Lasfer cum caricis datum.

Marrubij succus naribus infusus.

Polij utriusque decoctum bibitum.

Conyza folia, & flores poti.

Aspleni decoctum potum.

Lichen ex melle inunctus.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum haustum.

Anthe

Anthemides decoctum potum.

Buphtalmum potum statim à balneo.

Paonia radix bibita.

Hyacinthi semen cum vino potum.

Rubia radix cum mulsâ aqua bibita.

Chamepityos folia septem diebus in vino pota.

Betonice folia cum dulci aqua pota.

Elaterium potum.

Anchusa radicis decoctum potum.

Quinquesolij succus trium cyathorum pondere aliquot diebus potus.

Osyris decoctum potum.

Chrysanthemi decoctum balnei more adhibitu.

Vinum Scillinum potum.

Verbenace supina folia drachma pondere cum thuris obolis tribus, & vini veteris hemina una ieiunis 40. diebus pota.

Lycij herba in aceto decocta, & bibita.

Myrica decoctum potum.

Halycacabi fructus poti.

Chamacisi folia trium obolorum pondere senis diebus in aqua pota.

Rusci folia, & bacca in vino pota.

Vinum Scillinum haustum.

Ceruini cornu cinis potus binis ligulis.

Sulfur sorbili ouo sumptum.

Ad hydropem.

Asarum potum.

cc 3

Cinna

Cinnamomum ebibitum.

Calami odorati decoctum cum semine apij
potum.

Erinacet terrestris caro.

Cochlearum terrestrium operimentum, &
caro simul contrita tumoribus hydropico-
rum imposita.

Amurca in villosa pelle peruncta, & imposita.

Vrina humana sui ipsius bibita.

Vrina caprae quotidie cum spica pota.

Cicer cum rore marino decoctum.

Rapbanus emplastri modo impositus.

Plantago cum lenticula decocta.

Ebuli radix in vino decocta, & pota.

Allium decoctum manducatum.

Bibbi cum melle, & trito pipere emplastri
modo impositi.

Scilla preparata sumpta.

Anagallidis succus vino potus.

Chamaeleonis albe radix cum vino pota.

Absinthium bibitum cum sicubus, nitro, & lo-
liacea farina.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum potum.

Hysopum cum fico, nitroque emplastri modo
impositum.

Fidicula decoctum potum.

Orig anum cum fico decoctum.

Sampsuchi decoctum potum.

Ruta

Ruta cum fico emplastrata & eius decoctum
ex vino tum potum, tum corpori persusum.

Pastinaca erratica semen potum.

Anisum potum.

Smyrni semen potum.

Lascepsitij liquor cum caricis datus.

Chamedrij decoctum potum.

Polij & tris sue decoctum bibitum.

Androsaces in vino pota duarum drachma-
rum pondere.

Beronica folia cum aqua dulci pota.

Cucumeris asinini radice succus sesquiboli
pondere, & cortex eius acetabuli quarta
parte.

Aqua marina balneum.

Vitis syvestris radix in aqua feruefacta, &
in vini cyathis duobus marina aqua diluta
pota.

Vinum Scillinum potum.

Viticis semen potum.

Ficus sicca in vino cum polenta & absinthio de-
cocta, & illita.

Sal.

Alcyonium tertium.

Arena & Urticibus sole feruefacta capite te-
nus hydropicis obruta.

Ad refrigeratum iecur.

Nardus Indica ebibita.

Nardus Celtica ebibita.

Amomi decoctum potum.

cc 4 Pin

*Pinorum, & piceæ folia ex aqua, vel mulso
pota.*

Ad iecinoris dolores.

Acori decoctum potum.

Absinthij decoctum ex passo appositum.

Periclymeni semen potum cum vino.

Ad iecinoris duritiem.

Ammoniacum illitum, & ebibitum.

L I E N I S.

Ad induratos lienes.

*Cotonea mala cruda cataplasmatibus addita
& imposita.*

Sycomori liquor haustus, & illitus.

Raphanus emplastri modo impositus.

Brassicæ folia cum aceto deuorata.

Chamadry decoctum potum.

Lupinorum farina illita.

Ad lienis obstructions.

Nardus Celtica ex vino pota.

Adiantum bibitum.

Trichomanes hausta.

Ad lienis inflammationes.

Iris Illyrica ex aceto pota.

Acorum potum.

Nardus Celtica ex vino pota.

Nardus montana ex vino hausta.

Sar

*Sarmenticius cinis ex aceto rosaceo, & ruta
illitus.*

Myrica ex Vino decoctum potum.

Vitici semen potum.

Ad lienis dolores.

Dictamnium potum, & illitum.

Ad minuendos lienes.

Iris Illyrica ex aceto pota.

Acorum potum.

Nardus Celtica ex Vino bibita.

Nardus Montana ex Vino bibita.

Myrica ex Vino decoctum haustum.

Vitici semen potum.

*Cyclamini secunda semen quadraginta die-
bus haustum.*

Sagapenum ebibitum.

*Ammoniacum drachma pondere ex aceto
sumptum.*

Chamadrys ex aceto pota.

Nasturtium haustum.

Piperis radix illita.

Poly & triusque decoctum cum aceto potum.

Cyclamini succus inunctus.

*Capparis semen drachmarum duarum ponde-
re quadraginta diebus ex Vino bibitum.*

Eiusdem radix ex Vino bibita eodem pondere.

Lepidium cum beleny radice impositum.

*Hedera & tenella folia ex Vino decocta, & el ari-
da ex pane coacta imposita.*

ee s

Isatis

Isatis Sylvestris tum pota, tum illita.

Agaricum drachma pondere cum aceto mulso datum.

Rhaponticum potum.

Smyrni radix comesta.

Gentiana radix duarum drachmarum pondere pota.

Aristolochia rotunda pota.

Crocodilij radices decoctum potum praesentaneis remedio prodest.

Hyssopum cum ficis, utroque illitum.

Tragoriganum cum aceto potum.

Pulegium cum sale illitum.

Sison potum.

Pucedani succus haustus.

Viscum cum calce, gagate & lapide decoctum illitum.

Teucrium cum posca potum, vel cum ficis appositum.

Leucoij radices cum aceto illita.

Nymphaeae radix ex vino bibita.

Aspleni folia pota, vel eius decoctum cum aceto quadraginta diebus haustum, vel folia ipsa ex aceto illita.

Bunij semen potum.

Hammonitis cum aceto pota.

Rubia semen ex aceto mulso potum.

Lonchitis alterius folia cum aceto hausta.

Betonica folia ex oxymelite ebibita.

Polemo

Polemonij radix ex aqua sumpta.

*Periclymeni semen quadraginta diebus in
Vino potum.*

Xyridis semen ex aceto sumptum.

Anchusæ radix cum mulsâ aqua pota.

Vrtica & traque cum cerato imposita.

Trichomanes pota.

Vini scillini & sus.

*Glans & nguentaria cum crui farina pota ex
mulsâ aqua.*

*Bryonia trium obolorum pindere triginta
diebus ex aceto hausta, aut cum ficis illita.*

*Vitis nigra & viticula primæ & recentes cocta, ac
comesa.*

Filicis maris radix hausta.

*Aqua, vel Vinum, in quibus chalybs, aut fer-
rum restinctum fuerit in potu.*

Alcyonium tertium bibitum.

Corallium ex aqua bibitum.

Asius lapis ex aceto, & Vina calce illitus.

*Cotis naxia delinata à ferro scobes ex aceto
bibita.*

INTESTINORVM.

Ad colicos affectus.

Amygdale amare illinctu adhibita.

*Cochæa terrestres cum suo putamine ruse ad-
dita pauca myrrha, ex Vino bibita.*

Alauda avis rosta in cibo sumpta.

Suil

*Suillus talus crematus ad albedinem & sique
potus, Vbi flatus excruciet.*

*Butyrum infusum, Vbi colon exulceratum
fuerit.*

Gallina finum cum aceto Vel Vino haustum.

Ruta decoctum ex oleo infusum.

Petroselinum potum.

Colocynthis infusa clysmatibus.

Gnici decoctum infusum.

Ad intestinorum dolores.

Iris illyrica pota.

Acori decoctum bibitum.

*Mei radices trite cum melle in eclegmate
sumpta.*

Cardamomum ex aqua potum.

Agallochum ex aqua haustum.

*Nuces inglandes cum suo putamine perusta,
& Umbilico admotæ.*

Ficium cum ruta decoctum clysmate infusum.

*Halimi folia drachma pondere in aqua mul-
sa pota.*

Crocum in potionibus bibitum.

Dauci semen potum.

Libanotidis radices hausta.

Ferula semen in potu sumptum.

Peucedani succus in ouo haustus.

Melissophylli decoctum clystere infusum.

Castoreum potum.

Butyrum clysmatibus infusum.

Ser

Serpyllum ebibitum.
Calamintha decoctum haustum.
Eryngium ad potandum datum.
Cera in sorbitionibus data.
Ammi ex vino sumptum.
*Triticei furfures ex decocto ruta elixi, & ib-
liti.*
Milium calefactum, in sacculis adhibitum.
Orobi farina aceto macerata imposita.
Sisymbrij semen in vino potum.
Piper cum lauri tenellis folijs haustum.
Scilla in eclegmate cum melle.
Rhaponticum potum.
Sampfuchi decoctum ebibitum.
Centaurij maioris radix pota.
*Ruta una cum siccato anetho elixa in potu
sumpta.*
Panaces cum vino haustum.
Anethi coma, & seminis decoctum potum.
Ligustici semen & radix pota.
Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.
Phalangij folia, flores, ac semen haustum.
Centunculum austero vino potum.
Conyza folia, & flores poti.
Peonia radix in vino pota.
Pseudobunium ebibitum.
Aqua marina fotu adhibita.
Chamapitys hausta.
Graminis decoctum ebibitum.

Cha.

Chamedaphnes folia in potu data.

Sal calefactum in sacculis adhibitum.

Nitrum cum cumino ex hydromelite haustum.

Seselis Massiliensis semen ex vino potum.

Asclepiadis radices ex vino potae.

*Alisma per se, aut cum pari pondere seminis
danci haustum.*

*Suillus talus combustus ad albedinem & sque
ebibitus.*

Lini seminis decoctum per sedem infusum.

*Agaricum duorum obolorum pondere sum-
ptum.*

Ad dysentericos.

Aspalathi decoctum clystere infusum.

Myrrha fabae magnitudine deuorata.

Lentiscus ebibita.

Piceae cortex potus.

Maceris cortex in potu sumptus.

Paliuri folia, & radix hausta.

Acuta spinae fructus deuorati vel epoti.

Rubi canini fructus deuoratus.

Cisti folia, & cytini in potu data.

Hypocistis hausta.

Ladanum cum vino setere potum.

Rosarum fructus in potu sumptus.

Lycium potui datum.

Acaciae succus haustus.

*Glandium interior tenuiorque tunica deco-
cta pota.*

Castia

Castanearum interior pariter tunica ebibita.

Galla omphacitis ex vino, aut aqua trita illita, aut hausta.

Rhois foliorum decoctum clystere infusum, vel in potu acceptum.

Eiusdem semina pro sale cibis, obsonijsq; aspersa.

Palme inuolucris decoctum, tum infusum, tum bibitum.

Punicorum acidorum nuclei siccati, & ebibiti, vel in defecationibus additi.

Myrthi semen, & folia pota.

Cotonea mala comesta cruda, vel cocta, vel eorum succus potus.

Pyra tam domestica, quam sylvestria deuorata.

Mespila in cibum accepta.

Loti arboris bacca comesta, vel hausta.

Corni arboris bacca siue in edulijis, siue in defruto assumpta.

Sorba sicca quoquo modo sumpta.

Prunorum sylvestrium bacca deuorata.

Siliqua siccata deuorata.

Cochlea terrestres suis cum putaminibus & sto (vt Gal. inquit) esui data.

Siluri piscis salsamentum fomento adhibitum.

Leporinus sanguis frixus deuoratus.

Garum piscium clysmate infusum.

Cer

*Cervinum cornu potum duorum cochlearium
mensura.*

Cera in sorbitionibus data.

*Lac ignitis iniectis calculis decoctum clystere
infusum.*

*Leporinum coagulum trium obolorum ponde-
re ex Vino potum.*

*Equinum coagulum trium obolorum pondere
ex Vino potum.*

*Asparagus altilis elixus, Vel assus in cibo sum-
ptus mitigat.*

Idæa radix bibita.

Althæa decocta succus ex Vino haustus.

Alceæ radices cum Vino, aut aqua potæ.

Phyllitis potæ.

Portulaca ad summum cocta in cibis sumpta.

Plantago per sedem infusa.

Equiseti succus potus.

*Caprillus adeps cum polenta, & Rhoe datus,
Vel clystere infusus.*

Melissophyllum bibitum.

*Tragium scolopendræ similis elixum, & sum-
ptum in cibo.*

Faba in posca decocta, & comesa.

*Alismatis radix cum pari pondere seminis
sylvestris pastinacæ bibita.*

*Oxylapathi aut oxalidis semen, in aqua aut
Vino bibitum.*

Lyfimachia potui data.

Tragi

Tragi cacumina x. in Vino pota.
Clematis folia cum Vino hausta.
Stæbis decoctum clystere infusum.
Limonij semen in Vino potum.
Elatine elixa pota.
Polemonij radix ex Vino sumpta.
Eupatorij semen, & folia in Vino hausta.
Nymphææ siccata radix ex Vino ebibita.
Sedum maius cum Vino potum.
Sanguis hyrci, caprae, leporis, cernique in sar-
tagine frigus, in cibo sumptus.
Vitis Vinifera foliorum & capreolorum suc-
cus potus.
Vinaceorum decoctum ebibitum.
Vinaceorum nuclei in farinam polenta modo
illiti.
Vua passa alba comesa per se cū suis nucleis.
Omphacium clystere infusum.
Vinum anantinum potum.
Vinum Cydonites potum.
Vinum rhoites potum.
Terra lemnia ebibita.
Muria clysmatibus infusa, Vbi diutina dysen-
teria intestina exulcerata extiterint.
Scordium duarum drachmarum pondere cū
aqua dulci potum.
Hederae flores trium digitorum carpta bis in
die ex Vino hausti.

Ad cohibendum aluum.

ff

Cor

Coagulum leporinum potum.

Lac omne, in quo igniti calculi marini extin-
cti fuerint.

Casus elixus, & ab elixatione statim seposi-
tus, moxque in assatus in cibo sumptus.

Fimus caninus ardente Syrio acceptus, & in
aqua bibitus.

Panis triticeus siccus inueteratus comestus.

Hordeacea farina cum myrti baccis, aut syl-
uestribus pyris, aut malicorio ex vino illita.

Puls ex Zea in cibum sumpta.

Puls ex Avena in cibum sumpta.

Puls ex milio in cibum sumpta.

Oryza in cibum accepta.

Lentes cum suo cortice decoctae deuoratae, prae-
sertim si decoquantur ex aceto cum adstrin-
gentibus alijs.

Oxylapathi, aut oxalidis semen in vino, aut
aqua potum.

Brassica percocta cibis.

Beta nigra cum sua radice, & lente decocta
esui data.

Plantago ex aceto elixa, cum sale comesa,
quin & eius semen ex vino potum. Prae-
terea clysteribus infusa.

Intybus tam hortensis, quam erratica in ci-
bum accepta.

Condrylla succus coctus potus.

Lens Syluestris quoquo modo sumpta.

Acinos

Acinos pota.

Anisum ebibitum.

Anerhum, quin etiam eius coma, & semen
haustum.

Apium in cibo sumptum.

Phyllitis potui data.

Acanthi radices bibita.

Feniculum erraticum potum.

Ruta in cibo vel potu sumpta.

Orchis Serapias ex vino potus.

Pernia radix ex vino decocta hausta.

Althæa decoctum bibitum.

Alismatis radix pota.

Polygoni succus potus.

Clematis prima in vino bibita.

Lagopu: ex vino, vel ex aqua sumpta ubi fe-
bris sit.

Xyridis radix in mulso pota.

Anchusa folia ex vino sumpta.

Rubi ramorum decoctum potui datum.

Quinquefolij radicis decoctum bibitum.

Phoenix in vino austero hausta.

Idæa radix bibita.

Lunci, præsertim marini semen frixum, & in
diluto vino potum.

Astragali radix ex vino hausta.

Hyacinthi radix ebibita.

Papaueris nigri semen ex vino haustum.

Verbasci radix, & flores potui dati.

ff 2 Labrus

Labrusca flores poti.

Punicorum acidorum Vinum potui datur.

*Rubrica Sinopica in ovo hausta, aut clyste
infusa.*

Vini fex illita.

Sedum maius ex Vino haustum.

Adianti decoctum potum.

Trichomanes decoctum bibitum.

Acetum cibus incoctum.

Ad diuturnas alui fluxiones.

*Sanguis Hyrcinus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Sanguis Caprillus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Sanguis Leporinus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Sanguis Ceruinus in sartagine frixus & c
mesus.*

*Ad ciendam, & emolliendam
aluum.*

Cerusia comesta.

Melimela esui data.

Persica in cibum sumpta.

Mora matura comesta.

Ficus matura deuorata.

Marinus echinus in cibus.

*Tellinarum, chamarumque ius cum sale ha-
stum.*

Sepi

Sepia in cibo sumpta.
Silurus piscis in cibis.
Goby ius bibitum.
Piscium in vniuersum ius per se, aut ex vino bibitum.
Gallinaceorum Veterum ius epotum.
Lac haustum.
Serum lactis potum.
Caseus recens in cibo sumptus.
Butyrum comestum vel bibitum.
Medulla ossium deuorata.
Cicer in cibo sumptum.
Rumex decoctus & in cibis sumptus.
Blitum decoctum & in cibis sumptum.
Ma'na decocta & in cibis sumpta.
Atriplex decocta & in cibis sumpta.
Beta candida decocta & in cibis sumpta.
Asparagus decocta & in cibis sumpta.
Lactuca decocta & in cibis sumpta.
Brassica leniter feruefacta, esui data.
Tragorinum potum.

Ad intestinorum inflationes.

Farina tritici cum hyoscyami succo illita.
Farina hordei cum lini, & feni graci semine imposita.
Ocimi semen potum.
Rhaponticum bibitum.

ff 3 Ane

Anethi coma, & seminis decoctum potum.

Cumini decoctum cum oleo clystere infusum.

Vel eius semen cum polenta & hydrela
maceratum & illitum.

Peucedani liquor in ouo ebibitus.

Anthemidis decoctum potum.

Ad latas intestinorum tineas.

Cardamomum potum.

Mali punicearadicum decoctum bibitum.

Nuces iuglandes largius esitate.

Mori radices corticum decoctum haustum.

Allium potui datum, vel comestum.

Chamaeleonis albi radix acetabuli pondere,
ex castorei, & origani decocto pota.

Filicis femina radix trium drachmarum
pondere ex melle hausta.

Melanthij semen potum, vel ex aqua Umbi-
lico illitum.

Attramentum sutorium drachma pondere
sumptum, vel cum melle delinctum.

Heliotropij matum folia, tum semina cum
hyssopo, nitro, & nasturtio pota.

Ad teretes intestinorum tineas.

Lupinorum farina cum melle lineta, vel cum
aceto, pipere, & ruta pota.

Brassica semen potum.

Portulaca succus potui datus. Praestat idem
& sem

Et semen.

Nasturtium bibitum.

Absinthium marinum per se, vel cum oriza decoctum, cum melle sumptum.

Absinthium santonicum, et marinum, haustum.

Hyssopum cum melle linctum.

Menta bibita.

Calamintha decoctum cum sale, et melle sumptum.

Thymum haustum.

Thymbra potui data.

Ruta decoctum ex oleo bibitum.

Coriandrum cum passo sumptum.

Anchusa tertia cum hyssopo, et nasturtio pota.

Vinum absinthites potui datum.

Sedum maius ex vino haustum.

Filicis femina radix drachmarum trium pondere cum vino pota. Sed qui sumunt prae gustare allia debent.

Ad aluum fluentem ab expurgante medicamento.

Callorum gallinaceorum senum Ventriculus sale inueteratus, et in umbra siccatus potus.

Ad intestinorum vulnera.

Equiseti radix, et folia cum aqua, pota.

Ad intestinorum vlcera.

ff 4 Las

Lac omne ignitis calculis calefacturi, infu-
sum.

Sapphyrus lapis bibitus.

S E D I S.

Ad fedis rimas.

Pix liquida illita.

Amurca in cupreo vase ad mellis spissitudi-
nem decocta illita.

Viticis semen cum aqua illitum.

Cancris fluviales combusti cum melle cocti
illiti.

Labri Veneris radix in vino decocta, & sub-
inde tusa imposita.

Leucoij flores cera excepti, & emplastri modo
adhibiti.

Labrusca flores illiti.

Plumbum elotum impositum.

Ad fedis vlcera.

Thus tritum cum lacte, & linamento exce-
ptum impositum.

Punicorum acidorum succus cum melle deco-
ctus illitus.

Oesypus impositus explet & emollit.

Plumbum elotum illitum.

Ad condylomata.

Cotonea mala cruda cataplasmatibus adiecta.

Ovis vitellus assatus, & ex rosaceo, & croco-
illitus.

Aloe

Aloe cum passo adhibita.

Anethi cremati seminis cinis illitus.

Libanotis emplastri modo imposita.

Ballotes folia in feruenti cinere cocta imposita.

Rubi folia adhibita.

Helsine imposita.

Quinquefolij radix illita.

Sermentitius cinis, quoniam & Vinaceorum ex aceto illitus.

Rubigo ferri illita.

Plumbum elotum impositum.

Sandaracha cum rosaceo inuncta.

Suillus adeps illitus.

Crocum cataplasmatibus inditum.

Ad sedis inflammationes.

Lens cum sertula campana, siccis rosis, cydonio malo, malicorio & rosaceo illita.

Sonchi succus illitus.

Melilotus cum fœni graci farina, & lini semine ex passo impositus.

Libanotis adhibita.

Althææ radix decocta illita.

Symphyti maioris radix cum folijs Senecionis cataplasmatibus modo.

Senecionis flores, & folia, ex modico vino illita.

Ad induratos sedis tumores.

Pix liquida illita.

ff s Ad

Ad procidentem sedem.

Lentisci succus, & folia illita.

Malorum cydoniorum decoctum in defensionibus.

Torpedo marina apposita.

Cyclamini succus ad mellis spissitudinem decoctus, illitus.

Cerulei anagallidis flores appositi.

Aster Atticus illitus.

Acetum illitum, & fotu adhibitum.

Acida muria in defensionibus.

Ad tenasmos.

Lac ouillum, caprillum, bubulumque ignitis calculis calefactum, & clystere infusum.

Fœni graci seminis decoctum infusum.

Lini semen quoquo modo appositum.

Erui farina vino macerata illita.

Ad penfiles sedis thymos.

Capra sylvestris fel illitum.

Fimum ouillum ex aceto inunctum.

Laser in malicorio cum aceto feruesfactum.

Acetum illitum.

Ad hæmorrhoidas ciendas.

Cepa confricata.

Ad hæmorrhoidum defluxiones.

Aloë cum passo illita.

Libanotis

Libanotis emplastri modo imposita.

Rubi folia adhibita.

Palmule illite.

Ad hæmorrhoidas sanandas.

Rhois semen illitum.

Palmule illite.

Ononis decoctum, Et quidam aiunt, potum.

Piumbum elotum impositum.

Arabicus lapis illitus.

Portulaca ad summum cocta imposita.

R E N V M.

Ad renum dolorem.

Cardamomum ex Sino potum.

Nardum Celticum ac linitum.

Amomi decoctum bibitum.

Harundinis radix lumborum doloribus pro-
ficit cum aceto illita.

Tragacantha drachma pondere in passo dis-
soluta cum adusto, elatoq³ cerui cornu, &
scissilis aluminis tantillo potum.

Pencedani succus potus.

Vua passa alba in cibum sumpta.

Aicyonium tertium potum.

Feniculi coma decoctum subdi um.

Anagallis pota.

Agarici drachma pota.

Glycyrrhize succus cum passo potus.

Tordilium

Tordilium bibitum.

Athyllis pota.

Paonia radix ex Vino pota.

Symphytum petraum ex aqua potum.

Anchusa decoctum ex aqua haustum.

Vinum melitites ebibitum.

Ad renum calculos & arenulas.

Nardus Indica potui data.

Nardus Cetica potui data.

Nardus Montana potui data.

Verum Celtica ceteris prestat.

*Lauri folia pota, quin & radice cortex qui
longe potentior est, potus.*

Cerasi gummi ex Vino haustum.

Amygdala amara gummi ex passo sumptum.

Ononis radice cortex cum Vino potui datus.

Anisum potum.

Cumini alterius sylvestris semen potum.

*Artemisia decoctum in defensionibus adhibi-
tum.*

*Chamemeli decoctum potum, vel fotu adhibi-
tum.*

Parthenij folia hausta.

Althae decoctum bibitum.

Alismatis decoctum potui datum.

Tribuli utriusque fructuum succus haustus.

Rubi radix pota.

Papaveris

Papaveris corniculati radice decoctum ha-
stum.

Umbilici Veneris folia cum radice pota.

Vinum absinthites bibitum.

Adiantum potui datum.

Trichomanes potui data.

Vua passa alba comesa.

Melitites Vinum assidue potum.

Alcyonium tertium potum.

Ad renum vlcera.

Lac omne potum.

Plantaginis radices, & folia ex passosum-
pta.

Vua passa alba comesa.

Melitites Vinum assidue potum.

Ad renum obstructiones.

Rhaponticum haustum.

Vinum absinthites potum.

Vinum Melitites potum.

V E S I C A E.

Ad ciendam remorantem vrinam.

Acori decoctum potum.

Mei radices ex aqua decocta, vel trita citra
coctionem, & pota.

Nardus Indica potui data.

Nardus Celtica potui data.

Nardus Montana potui data.

Cardamom

Cardamomum ex Vino haustum.

Asarum bibitum.

Phu sicca pota.

Malabathrum potum.

Casia in potu hausta.

Cinnamomum potum.

Costus ebibitus.

Iuncus odoratus in potu sumptus.

*Calamus odoratus cum graminis, aut apij se-
mine sumptus.*

Aspalathi decoctum haustum.

Crocum ebibitum.

Helenij radicum decoctum potui datum.

Crocomagma potum.

*Pineæ nuces repurgatae comestæ, aut cum pas-
so, vel cucumeris semine potæ.*

Lentisci decoctum haustum.

Terebinthi fructus comestus.

*Resina omnis, præsertimque terebinthina
hausta.*

*Cupressi folia ex passo, & exiguo myrrha
pota.*

Cedrides denorata, vel pota.

Lauri foliorum decoctum in defensionibus.

Albæ populi cortex Unciæ pondere haustus.

*Paliuri foliorum, & radicum decoctum in
potu sumptum.*

Phillyrea folia pota.

Ladanum ex Vetro Vino haustum.

Olea

Olea Aethiopica, ac nostratis lachryma potui
data.

Glandes in potu sumptae.

Palma inuolucris decoctum bibitum.

Punica acida succus potus.

Cerasi gummi haustum.

Amygdala amara lachryma bibita.

Erinaceus marinus in cibum sumptus.

Erinacei terrestris caro inueterata ex ace.
mulso pota.

Vermes terreni triti, & cum passo poti.

Mel haustum.

Artisana hordeacea denorata.

Zythum ex hordeo paratum potum.

Nicerum decoctum potui datum.

Erui decoctum haustum.

Lupinorum radicum decoctum bibitum.

Raporum cauliculus elixus, & in cibum
sumptus.

Raphanus comestus, quin & eiusdem semen
potum.

Asperis radix in cibum accepta.

Asparagi breui coctura elixi, & in cibum
propinati.

Non quoquo modo sumptum.

Cucumeris semen potum.

Ruca & strusque semen bibitum.

Dracunculus minor haustus.

Hortensius

Hortensis smilacis siliqua cum semine elixa,
Et in cibum data.

Asphodeli radix pota.

Bulbus Vomitorius in cibum sumptus, Vel
eius decoctum potum.

Porrus domesticum, Et sylvestre comestum.

Cepa decocta in cibum sumpta.

Allium in cibum sumptum,

Capparis fructus quadraginta diebus potus.

Anagallidis succus bibitus.

Calamintha decoctum potum.

Salvia decoctum haustum.

Crocodilij semen bibitum.

Thymi decoctum potui datum.

Thymbræ decoctum bibitum.

Serpyllum in potu sumptum.

Ruta quoquo modo sumpta.

Spinae albae radix pota.

Acanthi radices pota.

Ononis radice cortex ex Vino haustus.

Eryngij radix pota.

Absinthium potui datum, Vel eiusdem deco-
ctum bibitum.

Hyssopi decoctum in potu assumptum.

Origanum haustum.

Tragorigani decoctum ebibitum.

Ruta sylvestris pubi illita.

Ligustici semen, Et radix pota.

Pastinaca erratica semen haustum.

Cari

Cari semen potum.
Anethi coma, & seminis decoctum bibitum.
Apium crudum, coctum & in cibum sumptum.
Petroselinum in potu haustum.
Fœniculi decoctum potum.
Nigella pluribus diebus bibita.
Poly montani decoctum potui datum.
Artemisia decoctum in defensionibus adhibi-
tum.
Anthemidis decoctum haustum, vel in defen-
sionibus additum.
Lithospermii semen ex vino albo sumptum.
Rubie radix pota.
Lonchitis radix ex vino sumpta.
Hypericum bibitum.
Betonica folia pota.
Periclymeni semen haustum, Est enim Valen-
tissimum medicamentum.
Saxifraga potui data.
Xyridis radix trium obolorum pondere bibi-
ta. Sed semini vis longè maior.
Unci marini semen frixum, & ex diluto vi-
no haustum.
Ageratum suffitum.
Vesicariae sine halicacabi rubentes acini folli-
culis inclusi deuorati.
Solani somnifici semen potum.
Rusci folia, bacca asparagi, radices & in vino
pota.

Spartij semen denotatum.
 Vitis alba cauliculi teneri decocti, et denotati.
 Cytisi decoctum potum.
 Dauri semen haustum.
 Coris semen in potu sumptum.
 Equiseti succus potus.
 Umbelici Veneris folia cum radicibus mandu-
 cata.
 Bunij, & pseudobunij semen potui datum.
 Astragali radix ex vino sumpta.
 Hyacinthi radix bibita.
 Vitis nigra viticula prima cocta, comest & q.
 Chamadaphnes foliorum succus ex vino sum-
 ptus.
 Vinum Cydonites potum.
 Vinum Hyssopites potum.
 Vinum Scillinum potum.
 Vinum Absinthites potum.
 Aqua mulsa in potum accepta.

Ad vrinae angustias.

Cimices lectularij triti, & Vrinaria fistula
 impositi.
 Millepeda ex vino pota.
 Cicada inassa mansa.
 Locusta suffita, praesertim in feminis.
 Cervini cornu cinis elotus binis ligulis epotus.
 Malva decoctum in sessione adhibitum.
 Portulaca in cibum sumpta.

Aspa

Asparagi radicum decoctum haustum.
Cithami radix semen, & filia ex vino decocta pota.
Sandycis decoctum potui datum.
Caucalis olerum modo in cibum sumpta.
Amaraci decoctum potum.
Baccharis radicum decoctum haustum.
Ocimi semen bibitum.
Smyrnij radix pota.
Agaricum drachma pondere datum.
Pencedani succus potus.
Rhaponticum potum.
Phalaridis succus ex aqua, aut vino haustus.
Lotus sylvestris trita per se, aut cum malua semine ex vino, aut ex passio pota.
Chamapitys potui data.
Chamaleonis albi radices decoctum bibitum.
Abrotani semen tritum, & ex aqua calefactum potum.
Pastinaca sylvestris semen potum, vel pubi illitum.
Tordilij semen in potu sumptum.
Polemonij radix ex aqua pota.
Sifonis semen haustum.
Ammi cum vino sumptum.
Petroselinij semen potum.
Galbanum bibitum.
Chamadryos decoctum potui datum.

Trifolij bituminosi semen, & folia in aqua
hausta.

Scordij decoctum ex vino, vel ex aqua para-
tum potum.

Anthyllis altera drachmarum duarum pon-
dere bibita.

Peonia potui data.

Althæa decocta succus ex vino potus.

Graminis radicum decoctum potui datum.

Arctij radix cum semine decocta, in potu sum-
pta.

Adiantum potum.

Trichomanes hausta.

Alcyonium tertium potum.

Lapis Hamatites ex vino bibitus.

Lapis Morochthus ex aqua bibitus.

Lapis Iudaicus ciceris magnitudine ex aqua
calida potus.

Lapis Spongiae ex vino haustus.

Ad vrinæ stillicidium.

Acori decoctum potum.

Sisymbrij semen in vino bibitum.

Panaces heraclium ex vino haustum.

Seseli massiliense potui datum.

Cumini sylvestris alterius semen in potu sum-
ptum.

Olusatris radix cum semine ex mulso pota.

Polycnemum ex vino bibitum.

Clinopodium haustum.

Oenanthe

Oenanthes radix cum vino epota.

Conyza folia, & flores in potu.

Aspleni decoctum potui datum.

Cepa cum asparagi radicibus decoctum, in potu sumptum.

Onobrychis bibita.

Polygoni succus haustus.

Saxifraga in vino decocta potui data.

Xyridis radix ex mulso pota.

Tragij liquor semen, & folia in potu sumpta.

Rusci folia, radices, bacca, bibita.

Lauri Alexandrina radix sex drachmarum pondere potui data.

Elichrysi coma ex vino hausta.

Ad vesicæ vlcera.

Myrti folia, & semen pota.

Lac omne bibitum.

Cucumeris semen ex lacte, & passo haustum.

Glycyrrhizæ succus ex passo sumptus.

Vua passa alba comesa.

Ad vesicæ vulnera.

Butyrum infusum.

Equiseti folia ex aqua pota.

Ad eiiciendos vesicæ calculos.

Osisfragi anis Ventrículus paulatim in potu haustus.

Muris simus, qui Muscerda dicitur, cum mulso, & thure potus.

Vrina apri potui data.

Rumicis radicum ex Vino decoctum bibitum.

Sion crudum, coctum & haustum, vel comestum.

Sisymbrij semen potum.

Baccharis decoctum haustum.

Apij semen, vel radix Vino bibita.

Feniculum erraticum potum.

Sagapenum potui datum.

Adianti decoctum bibitum.

Trichomanes decoctum in potu sumptum.

Vitis Vinifera lachryma in caudice concreta ex Vino pota.

Ad vesicæ calculos frangendos.

Cardamomum, cum corticis radicis lauri drachma potum.

Bdellium potum.

Cerasi arboris gummi bibitum.

Aspleni decoctum haustum.

Lithospermum ex Vino albo potui datum.

Saxifraga ebibita.

Graminis decoctum haustum.

Tragij semina pota.

Rusci radices, ac bacca in potu sumpta.

Indaicus lapis coti delimatus, ex aqua calida potus.

Lapis

Lapis spongia potui datus.

Ad vrinæ incontinentiam.

Ruta sylvestris semen fixum, & in cibis sumptum.

Phoenix in vino austero bibita.

Ad vesicæ scabiem.

Panaces herculeum cum mulsa aqua aut vino potum.

Cepæa herba bibita.

Ad mictum grumorum sanguinis.

Cumini sylvestris alterius semen potum.

Elichrysi coma in mulso pota.

Ad cruentos mictus, ex fractis calculis prouenientes.

Acida muria illico clysmate infusa per Vrinae fistulam.

VIRILIVM ET PV- DENDORVM.

Ad Venerem eiendam, stimu-
landamque.

Costus ex mulso bibitus.

Crocum potum.

Semen lini cum melle, & pipere deuoratum.

Rapum decoctum in cibum sumptum.

Eruca largius in cibis comesta.

Eruca semen haustum.

Dracunculi maioris radix tosta, vel elixa ex vino bibita.

Asphodeli radix assumpta.
Nasturtium potum, vel comestum.
Porri semen potui datum.
Bulbus decoctus manducatus.
Allium cum coriandro tritum in cibis.
Vrtica semen ex passo potum.
Galij radix assumpta.
Mentæ succus potus.
Pastinacæ erraticæ radix comesta.
Anisum potum.
Testiculi canis radix quæ Vegetior est bibita,
vel comesta.
Satyrj radix esitata.
Horminum in vino potum.
Gladioli superior radix ex vino sumpta.
Scincorum renes drachmâ pondere ex vino
hausti.
Lac omne haustum.

Ad augendam genituram.

Coriandrum bitum.
Omnia medicamenta quæ Venerem excitant,
præter ea, quæ in calore & siccitate excel-
lunt.

Ad Venerem inhibendam.

Viticiis semen potum, & folia testibus illita.
Portulaca manducata, pudendisque inuncta.
Lactucæ semen potum nocturnas Veneris ima-
ginationes arcet.

Anethi

*Anethi seminis, & coma decoctum assidue
potum.*

Ruta in cibo, potuque sumpta.

*Canini testiculi herba languida, flaccidaque
radix potui data.*

*Cannabis sativa semen in cibum largius sum
ptum.*

Gladioli inferior radix pota.

*Cicuta cum sua coma trita, & genitalibus il-
lita, & est potentissimum medicamentum.*

Ad seminis profluuium.

Nymphaea radix bibita.

Iridis Illyrica radix ex aceto pota.

Ad pudendorum vlcera.

Oesypus illitus.

Aloe illita, & in puluerem imposita.

*Polygoni succus in vino decoctus cum melle
adhibitus.*

Alumen quocunque modo adhibitum.

Flos salis inspersus.

Ad testium inflammationes.

Cicer cum eruo decoctum appositum.

Faba in vino decocta cataplasmati adhibita.

*Senecionis folia cum floribus emplastri modo
imposita.*

Asphodeli radix, & folia illita.

Timolia illita.

Melilotum emplastri modo adhibitum.

Teodes lapis illitus.

gg s

Ruta

Ruta illita cum lauri folijs.

Sal cum origano & fermento illitum.

Cuminum cum passa sua, faba^q, lomento, aut
cera impositum.

Coriandrum cum passa sua, & melle illitum.

Lilij concisa radix cum apollinari herba, &
triticea farina cataplasmatibus modo.

Samia terra ex rosaceo & aqua illita.

Hyoscyami semen tritum ex vino impositum.

Ad genitalium pruritum.

Salvia decoctum ex vino illitum.

Resinae omnes, praesertimque terebinthina il-
lita.

Ad induratos testes.

Irionis semen impositum.

Ad eos qui natura praeputio carent.

Thapsiae succus circumlinitus. Tumorem enim
excitat, qui deinde pinguium fo. u. emolli-
tus praeputij iacturam resarcit.

Mel triginta diebus à balneo illitum.

Ad genitalium phagedenas
exulcerationes.

Taurinum fel ex melle illitum.

Labruscae flos tritus cum melle, croco, myrrha,
& rosaceo impositus.

Ad genitalium thymos.

Smaridis salsa crematum caput illitum.

Fel sylvestris capra inunctum.

Fimum

Fimum ouillum ex aceto impositum.

Thymus emplastri modo adhibitus.

Thymbra apposita.

Ruta cum pipere, nitroque confricata.

Tithymali characia lac inunctum.

Chamaesices rami triti, & impositi.

Mercurialis succus illitus.

Heliotropij semen illitum.

V T E R I.

Ad vteri strangulatus.

Mei radices trita, & cum melle in eclegmate deuorata.

Iuniperi bacca pota.

Vngues odorati suffiti.

Cimices lectularij naribus illiti.

Bitumen olfactum, suffitum, & admotum.

Phoca coagulum potum.

Vrina cum ligustrino oleo feruesfacta infusa.

Plantaginis succus potus.

Sinapi tritum naribus illitum.

Agaricum drachma pondere sumptum.

Ruta trita excepta melle, pudendis & sedi illita.

Panacis herculei semen cum vino bibitum.

Seselis Massiliensis radix, & semen potum.

Peucedanum olfactum.

Sagapenum naribus ad olfaciendum illitum.

Trifolij bituminosi semen, & folia pota.

Paonia

Paonia nigri seminis grana x v. bibita.

Alismatis radix pota.

Betonica folia drachma pondere in aqua dulci hausta.

Gagates lapis suffitus.

Ad menses ducendos.

Iris Illyrica ex vino sumpta, & fotu adhibita.

Mei radicum decoctum de sessionibus adhibendum.

Acori decoctum in sessionibus.

Cyperi radicum decoctum fotu adhibendum.

Asari radices senis drachmis ex aqua bibita.

Phu decoctum potui datum.

Casia odorata in potu sumpta.

Cinnamomum haustum, vel ex myrrha suppositum.

Amomum pessis, aut sessionibus additum.

Costus ebibitus.

Odoratus iuncus potui datus.

Calamus odoratus haustus, & suppositus fotu.

Cancamum ex aqua mulsa potum.

Helenij radicum decoctum potum.

Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore, vel ruta succo admota.

Styrax pota, & apposita.

Bitumen ex vino, & castoreo bibitum.

Cedrides ex polline piperis hausta.

Lauri foliorum decoctum fotu admotum.

Phillyrea folia potui data.

Vitidis

Viticis semen drachma pondere ex vino haustum.

Olea Aethiopica, ac nostratis lachryma pota.

Amygdala amara admota.

Ficulneum lac cum detrita nuce Græca ebbitum.

*Cochlea terrestres cum suo operimento tusa,
& fameis locis admota.*

Castoreum drachmarum duarum pondere haustum.

Capæ succus pudendis illitus.

Oesypum in lana suppositum.

Anserinus, & gallinaceus adeps illitus.

Caprarum montanarum finum ex odoramento aliquo potum.

Scandulaceum bibitum.

Seminis lini decoctum fotu admotum.

Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle suppositum.

Rhaphanus in cibum sumptus, vel eius succus haustus.

Asphodeli radix potui data.

Eryngij decoctum haustum.

*Brassica succus ex loliacea farina suppositus,
vel eiusdem decoctum bibitum.*

Sium pro olere sumptum.

Crithmum, vel eius decoctum in potu sumptum.

Centaurij maioris radix bibita, vel eiusdem succus suppositus.

Con

Condrylla gummi ex myrrha subditus.

Lactuca sylvestris lacteus succus bibitus.

Porrum domesticum, & Sylvestre comestum.

*Allij comarum decoctum in de sessionibus ad-
ditum.*

Cyclaminus tum pota, tum supposita.

Abrotani semen ex aqua haustum.

Capparis cortex, & semen potui datum.

Anemones radix ex Vellere apposita.

Hederæ Corymbi triti subditi.

Pulegium bibitum.

*Agaricum cum oxymelite drachma ponder-
haustum.*

Origanum potum.

Absinthium haustum, Vel ex melle subditum.

Tragoriganum potui datum.

Salvia decoctum potum.

Ammi ex Vino haustum.

Thymi, thymbraeq; decoctum in potu sumptum.

Serpyllum potui datum.

Smyrnæ semen ebibitum.

*Amaraci decoctum haustum, Vel pudendis il-
litum.*

Baccharis radicis decoctum potum.

Ruta & traque tum pota, tum subdita.

Panaces Herculeum ex Vino haustum.

Ligustici radix, & semen potum, & illitum.

Pastinacæ erraticæ semen potum.

Seselis Massiliensis radix, & semen haustum.

Toi

Tordilium potui datum.
Feniculum ex vino sumptum.
Sison bibitum.
Libanotis radices pota.
Peucedani succus potus.
Petroselinum potui datum.
Daucum haustum.
Hammoniacum in potu sumptum.
Nigella pluribus diebus hausta.
Sagapenum potum.
La serpity liquor cum pipere, & myrrha bibit.
Gallanum suppositum, & suffum.
Clinopodium haustum.
Chamadryos decoctum potui datum.
Lilij cremata radix ex rosaceo subdita.
Melissophylli decoctum in desessionibus.
Trifolij semen, & folia pota.
Polij & trisusque decoctum haustum.
Scordij succus bibitus, vel herba ipsa subdita.
Artemisia decoctum sessionibus additum.
Myrrhis bibita.
Conyza folia, & flores poti.
Hemerocallis radix cum vellere subdita.
Rusci folia, & bacca ex vino sumpta.
Leucoij decoctum fotu, & sessionibus admotu.
Eiusdem semen duarum drachmarum pondere ex vino sumptum.
Anthemidis decoctum tum potum, tum fotu adhibitum.

Paonia

Peonia radix amygdala quantitate hausta.

Rubia radix supposita.

Adianti decoctum bibitum.

Trichomanes potui data.

Anagyris trita folia ex passo sumpta.

Hypericum tam bibitum, quam suppositum.

Coris semen potui datum.

Vrtica & trinusque folia trita, & cum myrrha subdita.

Betonica folia drachma pondere cum vino sumpta.

Medij semen haustum.

Chamadaphnes foliorum succus ex vino bibitus.

Gladioli superior radix supposita.

Tragij liquor bibitus, quin etiam semen, & folia pota drachma pondere.

Chrysocome ex mellicrato sumpta.

Elaterium in pessa subditum.

Helichrysi coma ex mulso potui data.

Madragea liquor semioboli pondere subditus.

Eiusdem semen bibitum.

Daphnoides hausta.

Veratrum Nigrum suppositum.

Veratrum Album suppositum.

Vitis nigra tenella & viticula in cibum sumpta, decocta olerum, vel asparagorum more.

Heliotropij folia supposita.

Vinum scillinum bibitum.

Vinum absinthites haustum.

Vinum

Vinum hyssopites potum.

Ad menses cohihendos.

Nardus Indica.

Muscus arboribus innascens in sessionibus additum.

Thuris cortex in pessa subditus.

Oxyacantha bacca in potu, vel in cibo sumpta.

Hypocistis tum pota, tum indita.

Olea sylvestris succus pudendis admotus.

Rhois semen potum alba profusua sistit.

Palmula immatura manducata.

Palmularum involucrium potui datum.

Punicerum acinorum nuclei siccati in sole, & obsonijs inspersi, concoctive sumpti.

Galla in decoctis addita ad sessiones paratis.

Glandium tenuior cortex tum bibitus, tum in pessa suppositus.

Myrti semen fotu subditum, vel de sessionibus additum.

Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.

Acacia tum pota, tum indita.

Lycium subditum.

Loti ligni decoctum haustu, aut fotu admotu.

Lentisci folia tam pota, quam subdita.

Coagulum Leporinum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Hadinum potum, ac etiam subditum.

hb

Coagu

Coagulum Agninum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Ceruinum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Hinnulinum potum, ac etiam subditum.

Coagulum Vitulinum potum, ac etiam subditum.

Ceruinum cornu &stum, lotum ex adstringenti liquore aliquo haustum.

Caprarum montanarum finum siccatum tritum & cum thure in lana suppositum.

Rumicis radices subditæ.

Plantago tum bibita, tum fotu adhibita.

Barba hyrcina succus ex Vino sumptus, vel suppositus.

Porri coma decoctum ex aqua marina, & acetum in defensionibus.

Rubi ramorum decoctum potum.

Arabica spina radix manducata.

Phœnix ex Vino austero bibita.

Papaveris nigri semen potum.

Achillea subdita.

Idea radix hausta.

Rubi decoctum potui datum.

Equiseti folia bibita.

Menta fotu subdita.

Iunci marini semen frixum, & ex Vino diluto potum.

Ocima

Ocimastrum potum ex vino.

Anisum haustum, praesertim ad alba profluvia.

Cuminum ex aceto impositum.

Nymphaea, flore luteo, radix, & semen ex vino nigro pota.

Paonia seminis grana xij. ex vino austero sumpta.

Lysimachia succus subditus.

Azoly herba cum loliacea farina indita.

Polygoni succus suppositus.

Symphysi petrae ex vino decoctum haustum.

Clymeni succus bibitus.

Limoni semen acetabuli pondere ex vino bibitum.

Medij radix elixa, & ex melle in eclegmate sumpta.

Tragi acini numero x. ex vino hausti.

Hyoscyami semen oboli pondere in mulsa aqua potum.

Solani hortensis succus in lana inditus.

Mandragora semen cum sulphure, & vino suppositum.

Semperuium maius in vellere subditum.

Vuarum Vinaceorum decoctum haustum, & fotu appositum.

Labrusca flos pessulo inditus.

Omphacium inditum.

Rubigo ferri subdita.

Chalcitis cum succo porri indita.

hb 2

Vini

Vini fax imo Ventrīs, ac pudendis illita.

Hematites lapis ex Vino haustus.

Morochthus lapis in Vellere inditus.

Ostracites lapis drachmæ pondere ex Vino sumptus.

Samia terra cum sylvestris punica floribus hausta.

Ad secundas pellendas.

Castoreum drachmarum duarum pondere cum pulegio bibitum.

Cyclaminis alterius semen haustum.

Allij coma decoctum fotu impositum.

Aristolochia longa cum myrrha, & pipere sumpta, vel pessulo indita.

Pulegium bibitum.

Thymi decoctum potui datum.

Thymbræ decoctum haustum.

Apij semen in potu sumptum.

Marrubij decoctum bibitum,

Stachyos decoctum potui datum.

Artemisia decoctū in defensionibus adhibitū.

Circeæ radix quatuor librarum pondere cōtusa, & in septem dulcis Vini heminis mace-

rata per noctem, diēmq; tribus diebus potz

Oenanthes semen, caulis, & folia ex mulsibita.

Leucoij semen drachmarum duarum pondere ex Vino haustum.

Rubie radix supposita.

Ana

Anagryis trita folia ex passo bibita.

Chamaepityos ex melle subdita.

Chrysocome ex aqua mulsa pota.

Thrychomanes hausta.

Bryonia supposita.

Myrrha pota.

Peucedani succus potus.

Bunij semen potum.

Smyrni semen potui datum.

Adianti decoctum bibitum.

Ad expellendum foetum.

*Castoreum duarum drachmarum pondere
cum pulegio sumptum.*

*Canicula lac prima foetura haustum mor-
tuum pellit.*

Oesypus, in lana suppositus.

*Caprarum montanarum finum cum aliquo
odora mento potum.*

Vulturis finum suffitum.

Ciceris decoctum bibitum.

*Lupinorum decoctum cum myrrha, & melle
foetu adhibitum.*

Sium pro olere in cibo sumptum.

Dracunculi maioris decoctum infusum.

Piper haustum.

Cyclaminis radix femori adalligata.

Hedera foliorum pediculi melle illiti subditi.

Gentiana radix subdita.

Centaurij maioris radix indita.

Centaurij minoris succus infusus.

Pulegium potum.

Dictamnus bibitum, inditum, incensumq³.

Thymi decoctum haustum.

Thymbræ decoctum potui datum.

Baccharis recentissima radix supposita.

Panacis Herculei acuminata radix indita.

Pastinaca erratica radix subdita.

*Deselis Massiliensis radix pota, quin etiam
Et semen.*

*Galbanum cum myrrha, Et Vino potum. sus-
situmque.*

Clinopodium potum.

Chamaedryos decoctum haustum.

Scordij succus drachmæ pondere sumptus.

Artemisia decoctum in sessionibus adhibita.

Coryza folia, Et flores bibita.

*Leucij semen duarum drachmarum ponde-
re ex Vino potum.*

Onosmatis folia ex Vino hausta.

Rubia radix supposita.

*Anagyris trita folia cum passo pota, quin Et
adalligata, sed statim post partum aufe-
rantur.*

Anchuse radix apposita.

Mandragora liquor infusus.

Myrrhis pota.

Heliotropij folia indita.

Sulphuris

Sulphuris fumus in Uterum permeans.

Danci semen bibitum.

Ammoniacum. haustum.

Periclymeni semen drachma pondere in Vino potum.

Lauri Alexandrina radix sex drachmarum pondere ex dulci Vino sumpta.

Alumen subditum.

Iaspis lapis femori adalligatus.

Aëtites lapis pro amuleto femori suspensus.

Saminis lapis adalligatus.

Ad conceptionem inhibendam.

Salicis folia per se, & cum aqua sumpta.

Leporinum coagulum post triduum à purgatione menstrua sumptum.

Sanguis menstruus illitus.

Brassica flores à puerperio in pessulo subditi.

Asparagi radix suspensa.

Piper à coitu illico subditum.

Hedera corymbi drachma pondere à purgatione hausti.

Hedysarum ante coitum feminis subditum.

Cedria Virili membro illita.

Ostracites lapis sicilici pondere quatuor diebus à purgatione potus.

Asplenium (ut quidam credunt) silente luna nocturno tempore decerptum cum muliere Ventre adalligatum.

hh 4

Pericly

*Periclymeni semen, & folia diebus triginta
sex pota.*

*Epimedij folia trita illico à purgatione quin-
que diebus continuis bibita.*

Gladioli inferior radix hausta.

Filicis fœmina radix potui data.

Heliotropium adalligatum.

Rubigo ferri pota.

Menta ante coitum & ulua admota.

Ad conceptionem iuuandam.

*Leporinum coagulum cum butyro subditum
statim à mensium purgatione.*

*Loliacea farina cum myrrha, thure, bitumi-
ne, & croco suffita.*

Pastinace erraticæ semen potum.

Ad foetum mortuum educendum.

Dictamnnum tum potum, tum subditum.

Salvia decoctum bibitum.

Galbanum cum myrrha ex vino potum.

Marrubij decoctum haustum.

Tussilaginis decoctum potui datum.

Ad prohibendum abortum.

Aëtites lapis sinistro brachio adalligatus.

Samius lapis pro amuleto suspensus.

Ad puerperia iuuanda.

Dictamni radix bibita.

*Baccharis radice decoctum foru adhibi-
tum.*

Fenicu

Feniculum erraticum potum.

Pucedani succus haustus.

Paonia seccata radix potui data.

Althea decoctum infusum.

Ad pręnantium malacias.

Vitis Vinifera foliorum capreolorumq³ succus potus.

Ad vteri inflammationes.

Nardi Indica decoctum fotu adhibitum.

Iunci odorati decoctum in desefſionibus adhibitum.

Vitici foliorum & seminis decoctum fotu appositum.

Butyrum recens illitum.

Sonchi succus inunctus.

Agaricum drachma pondere cum oxymelite potum.

Pulegi decoctum fotu subditum.

Melilotus cum passo emplastri modo impositus.

Panacis Herculei lachryma ex melle indita.

Artemisia decoctum in desefſionibus adhibitum.

Leucoi decoctum fotu appositum.

Anthyllidis radix ex rosaceo, lacteq³ indita.

Partheni decoctum in desefſionibus additum.

Althea decocta, ac subinde anserino, suil-
lõve adipe, aut resina terebinthina sub-
acta, subdita.

h h s Ad

Ad exulceratos locos.

Aspalathi ex vino decoctum infusum.

Lac in quo igniti calculi extincti fuerint infusum.

Oesypum inditum. Explet enim & emollit.

Fœni græci folia ex aceto illita.

Asclepiadis folia adhibita.

Ad induratos locos.

*Myrrha cum absinthio, lupinorum cremore,
vel ruta admota*

Styrax illita.

Anserinus & Gallinaceus adeps illitus.

Bdellium inunctum.

Malua decoctum inditum.

Ladanum pessis immissum.

Panaces Herculeum ex melle inditum.

Ebuli, sambuciq; decoctum fotu admotum.

Parthenij decoctum in desessionibus,

*Fœni græci ex aqua expressus succus cum
anserino adipe in pessulo subditus.*

Lilij radix admota.

Ageratum suffitum.

Ad vteri inflationes.

Ruta ex oleo decoctum clystere persusum.

*Geranium, & eius radix drachma pondere
pota.*

Ad procidentem vterum.

Casia fotu vel suffitu adhibita.

Myrti

Myrti baccarum succus in defensionibus.

Cotoneorum malorum decoctum fotu adhibitum.

Gallarum decoctum in sessionibus additum.

Acacia subdita.

Hypocistis subdita.

Vrtice & trinusque folia imposita.

Acetum fotu adhibitum.

Ad vteri dolores & erosiones.

Adeps Anserinus illitus.

Adeps Gallinaceus illitus.

Vrina cum ligustrino oleo feruescenda imposita.

Lini seminis decoctum infusum.

Malua decoctum fotu adhibitum, vel infusum.

Portulaca decoctum clysmate inditum, proprie facit ad erosiones.

Rhaponticum potum.

Centaurij maioris radix bibita.

Anethi decoctum in defensionibus.

Verbenaca recta folia ex recenti suillo adipe,

Vel ex rosaceo subdita.

Hyoscyami seminis cremor inditus.

Mandragora liquor pessulis impositus.

EXTREMORVM MEM-

BRORVM.

Ad podagram.

Amomum illitum.

Mei radices imposita.

Populi nigra folia ex aceto illita.

Amur

Amurca cruda, ac recens fotu adhibita.

Salicis foliorum, & corticis decoctum fotu impositum.

Ficulneum lac cum farina fœnigraci, & aceto cataplasmatibus additum.

Cochlea terrestres, suo cum operimento tusa, imposita.

Mustela cremata cinis ex aceto inunctus.

Marinus recens pulmo concisus impositus.

Lac humanum cum opio, & cera illitum.

Aleps ouillus, caprillus, hircinus &c ex eiusdem animalis fimo coactus inunctus.

Sanguis menstruus inunctus.

Caprarum montanarum fimum ex earum adipe illitum.

Hordei farina cum cotoneis malis imposita.

Lens cum polenta decocta, & emplastri modo adhibita.

Raporum decoctum fomentis additum.

Brassica cum fœno græco, & aceto in cataplasmate.

Intybus per se & cum polenta illitus.

Cucurbitæ ramenta imposita.

Ari radix fimo bubulo emplastri modo excepta.

Asphodeli radix drachma pōdere ex vino pota.

Cyclaminis decoctum fotu adhibitum.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

Panaces Herculeum cum passa sua illitum.

Liba

*Libanotis cum loliacea farina, & aceto cata
plasmatis addita.*

Scordium ex aceto, aut aqua impositum.

Leucoium ex aceto illitum.

Androsaces imposita.

*Helxines succus cera, & hircino adipe excep-
tus illitus.*

*Hyoscyami semen, & folia cum polenta cata
plasmatis adhibita.*

Semperuiuum inunctum, & bi calor exuperat.

Vrtica emplastri modo illita.

Musculus marinus impositus.

Cucumeris asinini radix ex aceto inuncta.

Thapsia succus illitus.

Glans Unguentaria illita.

*Sambuci & Ebuli folia cum seuo taurino,
aut hircino imposita.*

*Bryonia cum caprino stercore cataplasmatibus
addita.*

Heliotropij folia illita.

*Vua passa à nucleis repurgata, & cum pa-
nace succo inuncta.*

Acetum calido fotu cum sulphure adhibendum.

Rubigo ferri illita.

Sulphur cum aqua, & nitro inunctum.

Sal cum aceto impositum.

Asinus lapis cum fabarum lomento illitus.

Gagates lapis inunctus.

Fornacea testa exusta imposita.

Ad coxen

Ad coxendicos affectus.

*Mei radices imposita.**Helenij folia ex vino cocta imposita.**Iridis Illyrica decoctum clysmate infusum.**Cardamomum ex aqua potum.**Asarum potum, vel clystere infusum.**Populi albae cortex Unciae pondere haustus.**Iberis contusa, & emplastri modo imposita.**Siluri piscis salsamētum clysteribus infusum.**Piscium Garum clysteribus iniectum.**Smyrni semen potum.**Bubulum finum ex bubus in pascuis degentibus illitum.**Lolij farina ex aqua mulsa decocta imposita.**Lupinorum farina ex aceto illita.**Ammoniacum bibitum.**Ascyri semen ex aqua potum.**Asparagi radicum decoctum bibitum.**Althae decoctum potui datum.**Sinapi tritum cum fico impositum donec ruborem excitet.**Nasturtium clysmate infusum.**Irionis semen clystere iniectum.**Bulbi per se, & cum melle impositi.**Capparidis semen potum.**Lepidij folia, & radices, cum helenij radice trita, & imposita.**Agaricum trium obolorum pondere in aceto mulso potum.*

Rhapon

Rhaponticum potum.

Androsami semen bibitum. Sed à purgatione aquam exorbere oportet.

Centaury maioris decoctum clystere infusum.

Leucacantha radice ex vino decoctum bibitum.

Abrotani semen cum aqua potum.

Rubia radix pota.

Pulegium illitum, quousque rubescat cutis.

Calamintha imposita reces tritaq³ donec exsiccatur locus.

Thymus ex fimo cum polenta impositus. Idem prestat & Thymbra.

Ruta sylvestris semen quadraginta diebus potum.

Panaces Herculeum ex melle inunctum.

Lascer cera, ligustino, & Irino oleo subactum illitum.

Euphorbium in odorata potione sumptum.

Leontopetalum clysteribus infusum.

Hyperici semen quadraginta diebus potum.

Chamaepityos folia quadraginta diebus ex dulci aqua bibita.

Betonica folia ex aqua bibita.

Polemonia radix ex aqua sumpta.

Xyridis radix ex mulso pota.

Ocimastris semen cum vino, myrrha, & pipere sumptum.

Quinque folij radice decoctum potum.

Heliochrysi coma ex vino hausta.

Papa

Papaueris corniculati radice decoctū potum.

Aethiopis decoctum bibitum.

Arction ex vino haustum. & illitum.

Chamacis folia trium obolarum pondere in aqua cyathis tribus tricenis quadragenis. Se diebus pota.

*Colocynthis clystere infusa. & recens loca con-
fricata non illos.*

Cucumeris sylvestris radix clystere infusa.

*Spartij ramorum ex aqua marina diuturnum
infusum.*

*Scammonia ex aceto decocta. & cum hordea-
cea farina imposita.*

Acetum mulsum haustum.

Sorcy ex vino clystere infusum.

Muria clystere indita.

Adarces illitus.

Ad articulorum dolores.

Gallorum senescentium ius potum.

Brassica cum fieno graeco. & aceto illita.

*Ruta tum hausta, tum cataplasmatibus adhi-
bita.*

*Agaricum draehme pondere ex aceto mulso
sumptum.*

Melissophyllum ex sale impositum.

Quinquefolij radice decoctum bibitum.

*Psyllium ex rosaceo. & aceto, aut aqua illi-
tum.*

Mandragera radix cum polenta imposita.

Vrtica

Vrtica cataplasmatibus modo adhibita.

Veratrum nigrum potum.

Fucus marinus recens impositus.

Thapsia succus inunctus.

Narcissi radix trita, & ex melle imposita.

Acetum mulsum potum.

Vinum melitites frequentius potum.

Ad articulorum collisiones.

Sarmentitius cinis cum axungia vel oleo illitus.

Ad articulorum topicos.

Cannabis sylvestris radix decocta, & illita.

Ochra inuncta.

Ad perniones.

Thus cum scillo adipe aut anserino impositum.

Pix liquida inuncta.

Acacia illita.

Myrti seminis decoctum fotu adhibitum.

Ficus cremata cum cerato imposita.

Cancerum fluviatilium cinis cum decocto melle illitus.

Pulmo marinus recens concisus, & impositus.

Asinae ungula cinis oleo maceratus illitus.

Vrsinus adeps inunctus.

Vmbilici Veneris succus impositus.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, malicorio, cydonio malo, & rosaceo adhibita.

Orobi decoctum fotu impositum.

ii

Rapo

Raporum decoctum fomenti modo.

Beta decoctam impositam.

Dracunculi maioris folia ex vino decocta. Et
imposita.

Oleum in excavata asphodeli radice decoctum
illitum.

Cyclamini decoctum fatu et libitum. Quine-
tiam oleum cum pauca cera in eius excava-
ta radice feruifacitum, illitum.

Scilla cremata imposita.

Ranunculi decoctum inunctum.

Arcticon ex vino illitum.

Alumen aqua aspersum.

Ad pedum inflammationes ex calceor-

um aceto.

Pulmo Agninus impositus.

Pulmo Vrsinus impositus.

Pulmo Suillus impositus.

Calceamentorum veterum folia combusta. Et
illita.

Capra succus cum adipe gallinaceo impositus.

Ad pedum rimas.

Cancrorum fluminum cinis cum decocto
melle illitus.

Scilla oleo feruifacita. Et cum resina impo-
sita.

Ad digitorum redumias.

Punicortum malorum succus illitus.

Myrti folia trita. Et inpersa.

Olea

olea sylvestris folia trita, & imposita.
Eboris ramenta in putuere melle illita.
Aloe cum pulvere imposita.
Paronychia concisa & illita.
Bryonia oleo decocta, quousque liquefeat,
inuncta.
Eubryonia cremita, flores de melle impositi.
Rubigo ferri illita.
Acacia illita.
Rhois folia ex aceto, aut melle illita.
Marrubij folia ex melle imposita.
Quinquefolij radix illita.
Tithymali characia lac illitum.
Acerem illitum.
Alumen aqua inspersum.
Sal impositum.
Ad Paronychia
Thus cum melle illitum.
Eboris scobes inspersum.
Paronychia folia illita.
Ad scabros ungues auferendos.
Pix liquida illita.
Cini semen cum pari nasturtio & melle.
Cupressi pilula imposita.
Lapathi erugis radices in aceto decocta, & illita.
Ranunculi folia & radices admota.
Chelidonium melle illitum, & glibba.
Viscum cum eruto, & nigmento appositum.
Alumen cum aqua inspersum, & illitum.
Sulph

Sulphur cum resina terebinthina inunctum.

Sandaracha cum pice imposita.

Fax Sini cremata ex resina.

Ad mobiles vngues extrahendos.

Vna passailita.

Ad contusos vngues.

Bulbi cum polenta impositi.

SIM

SIMPLICIVM MEDICAMENTO-

RVM FACULTATES

secundum genera ex

Discorde.

FEBRIVM.

Ad tertianas.

A RANEVS plagella confricatus,
lintheolove illitus, mox fronti.
aut temporibus impositus.

Vermes terreni cum anserino adipe decocti, & illiti.

Plantaginis radices integra tres cum vini
cyathis tribus, & pari aqua pota.

Trifolij bituminosi tria folia trita, totidemq;
semina epota.

Hypericum ex vino bibitum.

Verbenaca supina tertius à terra geniculus
cum adiacentibus folijs bibitus.

Heliotropij seminis grana quatuor pota ante
febris accessionem.

Portulaca succus haustus.

ii 3

Ad

Anthemis clysmate infusa.

Polygoni succus. boxa ante accessiōem sum-
ptus.

Quinquefolij folia ex dulci aqua, aut diluto
Vino cum exiguo pipere bibita.

Ad eticam.

Portulaca tum Ventrīculi osculo, tum hypo-
cundrijs illita.

Ad febrium algores.

Piper haustum.

Agaricum drachma pondere sumptum.

Aristolochia rotunda ante accessiōem bibita.

Abrotanum ex oleo inunctum.

Calaminta decoctum potum.

Panaces Herculeum illitum.

Smyrnijs semen, & radix ex mulso pota.

Pyrethrum inunctum.

Lasar cum pipere, & thure ex Vino haustum.

Conyza ex oleo inuncta.

Coris semen cum pipere haustum.

Buglossi radix cum semine bibita.

Perichlymeni semen ex oleo inunctum.

Ad pestilentes febres.

Myrrhis bis, vel ter qualibet die ex Vino pota.

TVMORVM PRAETER

NATVRAM.

Ad inflammationes.

Harundinum Virentia folia tusa illita.

ii 4

Glan

Glandes intrita, & illitu apposita.

Rhois semen ex aqua illitum.

Lupinorum farina, cum polenta, & aqua in
posita.

Vmbilici Veneris succus circumlitus.

Plantago emplastri modo imposita.

Asphodeli radix cum polenta adhibita.

Acetum in succidis lanis, aut spongijs imposi-
tum.

Rhaponticum cum aceto illitum, & bi diutius
perseuerauerit inflammatio.

Pulegium cum polenta illitum.

Tussilaginis folia contrita, & ex melle im-
posita.

Parthenium emplastri modo impositum.

Lonchitis altera imposita.

Cannabis sylvestris radix emplastri modo ad-
hibita.

Polygonon illitum.

Tribuli fructus cataplasmatibus additus.

Xyridis radix ex aceto imposita.

Achillea illita.

Helxine cataplasmatibus addita.

Lichen herba adhibita.

Verbenaca supina folia illita, ubi inflamma-
tio diutius perseuerat.

Papaueris folia, & cum calycibus illita, &
calyces tantum cum polenta adhibiti.

Hyoscyami semen, & folia imposita.

Man

Mandragera recentia folia cum polenta il-
lita.

Bryoniae radix ex vino decocta adhibita.

Sambuci, ebullique pratenera folia cum polen-
ta illita.

Indicum illitum rumpit.

Triticis fursures acerrimo aceto elixi impo-
siti.

Tritici pollen ex hydrelao, vel aqua mulsa il-
litum.

Triticus panis ex aqua mulsa decoctus.

herbis ad idem conferentibus additus.

impositus.

Sesamum illitum.

Ad carbunculos

Ligustri folia imposita.

Pix liquida ex melle, & vna passilla e-

marginat, disrumpitque.

Cupressi folia trita, & imposita.

Sabina folia ex vino illita carbunculos circan-

scribunt.

Olea matura arefacte illita, & marginant.

Nucum inglandium veterum nuclei peruncti.

Columbinum fructum cum melle.

lini se-

mine subactum.

Erui farinae emplastri modo imposita.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Brassica cum sale illita rumpit.

Nasturtium impositum.

Porrum cum suco appositum.

Banaces Herculeum illitum.

Cōriandrum cum passa sua ex melle impositum.

Lasericij liquor inunctus.

Tithymali caradere lac illitum.

Vua passa à nucleis repurgata, & cum rutis imposita.

Ad furunculos & tubercula.

Fermentum triticeum impositum.

Helxine illita.

Sal cum sua passa, aut suillo adipe, aut melle impositum.

Hastula regia radix in face vini decocta, illita.

Ephemerij folia ex vino cocta, & imposita.

Vtriusque Vrtica folia illita.

Leontopodij radix suspensa.

Cucumeris sylvestris radix cum resina terebinthina imposita.

Scammonia succus cum melle, aut oleo illitus.

Mori radice liquor illitus.

Thapsie succus ex melle illitus.

Pycnocomi folia inuncta.

Sandaracha cum adipe imposita.

Asius lapis liquidus, aut resina terebinthina exceptus, illitus.

Cimolia terra ex aceto illita.

Ad gangrenas.

Rhois folia ex aceto, & melle illita.

Punicorum succus inunctus.

Nucum in gladiam & biberum nuclei peruncti.

Ficuli cineris lixivium spongijs exceptum
& impositum.

Loliacea farina cum sale, & Raphano cata-
plasma, & additum.

Cicerum farina cum hordeo, & melle adhi-
bita.

Lentes cum fertula campana, rosaceo, siccis
rosis, malicorio, & salsa aqua illita.

Erui farina illita.

Brassica elixa cum melle, cataplasma ad-

distilla.

Bulbi per se, & cum melle impositi.

La serpiti liquor illitus, & pueri scalpello ex-
ciso.

Galiopsis folia, semen succum, & catulus ex uce-
to imposita.

Verbasci florem aureum ferentis folia adhibita.

Tithymali canthotac impositum.

Bryonia radix, fructus, & folia cum sale illita.

Vna passa à nucleis repurgata, & cum sale
imposita.

Ad erysipelas, & sacros ignes.

Crocum illitum cum refrigerantibus.

Cupressi folia per se, & cum polenta imposita.

Rhamni folia illita.

Ligu

Ligustri folia adhibita.

Rosa illita.

Acacia succus inunctus.

Olea sylvestris folia contrita, & imposita.

Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo
rosaceo, & vino illita.

Menstruus mulierum sanguis circumlitus.

Caprarum montanarum fimum ex vino, vel
aceto decoctum impositum.

Vrina humana sedimen inunctum.

Lentes cum meliloto, siccis rosis, rosaceo, &
malicorio adhibita.

Malua ex oleo decocta, & illita.

Brassica utraque incisa, & cum polenta em-
plastri modo imposita.

Portulaca cum polenta cataplasmatibus addita.

Plantago illita cum cimolia, & cerussa.

Intybi radix, & folia cum polenta imposita.

Isatidis folia illita.

Acinos cataplasmatibus addita.

Ruta succus cum aceto, cerussa, & rosaceo in-
unctus.

Coriandrum cum pane, polenta ve illitum.

Lily folia ex aceto illita.

Tussilaginis folia trita, ex melle imposita.

Parthenium cum floribus emplastri modo im-
positum.

Polygonum illitum.

Anchusa radix cum polenta adhibita.

Lycopsis

Lycopsis radix cum polenta imposita.

Rubi Idai flos illitus.

Helxine imposita.

Quinquefolij radix decocta cataplasmatibus indita.

Verbanaca recta ex aceto inuncta.

Papaveris Vascula concisa cum polenta imposita.

Solani hortensis folia cum polline polenta illita. Quin & eiusdem succus inunctus.

Mandragoræ radix ex aceto illita.

Cicutæ succus inunctus.

Umbilici Veneris succus circumlitus.

Psyllium, & eius sissamentum inunctum.

Lens palustris illita.

Ricini folia ex aceto illita.

Semperuium manus inunctum.

Stratiotes imposita.

Acetum circumlitum.

Rubigo ferri illita.

Chalcitis inuncta.

Salcum aceto, aut hyssopo illitum.

Ad herpes.

Acaciæ succus inunctus.

Myrti folia cum omphacino oleo, aut exiguo rosaceo ex vino imposita.

Olea sylvestris folia contrita, & imposita.

Caprarum montanarum finum ex vino, vel aceto decoctum illitum.

Lentes

Lentes cum sertula campana, rosaceo, siccis
rosis, & malicoria cataplasmatibus indita.

Helxines succus cum cerussa inunctus.

Plantago imposita.

Chelidonium maius ex vino illitum.

Rubi folia illita.

Solani hortulani succus cum cerussa, rosaceo,

& argenti spuma illitum.

Ad epini tydas.

Quillum, caprillum & finum ex aceto illitum.

Brassica coacta cum polenta imposita.

Plantago quoque modo adhibita.

Cucumeris folia cum melle inuncta.

Porri folia cum Rhoe obsoniorum cataplas-

matibus indita.

Absinthium cum aqua illitum.

Coriandrum cum passa & melle im-

positum.

Viscum in splenio adhibendum.

Heliotropij semina illitum.

Vua passa a vaculis repurgata, cum ruta im-

posita.

Ad sinunas.

Iridis Illyricae radix cocta, & illita.

Pix liquida cum farina hordeacea, & pueri

impubis Urina decocta, illita.

Ficus sicca cocta, & imposita.

Grossi cocta, & illita.

Viperina

Vipérina carnes cocta, & in cibum sumpta.
 Mustella sanguis inunctus.
 Asinini sanguis cicis ex oleo maceratus illit.
 Bubulum finum è bubus herbas pascuis
 sumptum illitum.
 Hordei farina cum pice, & impubis pueri
 Crina excepta in pice.
 Coliacea farina cum fimo caluino ex vino
 decocta, adhibita.
 Fabarum farina cum melle, & fimo græco illita.
 Lens in aceto cum meliloto decocta, illita.
 Lupinorum farina ex aceto inuncta.
 Rumex decoctus circumlitus.
 Plantago cum sale inposita, vel radix collo
 suspensa.
 Raphani cum sulphure illitum.
 Nasturtium ex murice inunctum.
 Piper cum pice inpositum.
 Iorandrum cum faba lomento adhibendum.
 Albanum illitum.
 Sparine cum axungia inuncta.
 Heliosophylli folia cum sale cataplasmatibus
 addita.
 Ulthæa ex vino, vel aqua mellea decocta, im
 posita.
 Uvaque folij radix decocta, ac concisa adhi
 bita.
 Asperitij liquor ex cera illitus.
 Miliaci generis succus circumlitus.

Mandra

Mandragora recentia folia cum polenta imposita.

Semperuium tertium impositum.

Galiopsis folia, caulis, semen, & succus cataplasmatibus indita.

Pseudobunij rami quaterni ex aqua poti illitique.

Adiantum impositum.

Fornacea testa, tostae ex cerato illita.

Capparis radix, & folia trita & imposita.

Ad panos.

Olea sylvestris folia cum melle inuncta.

Ficus sicca cocta. & illita.

Bubulum finum ex pascuis sumptum impositum.

Lupinorum farina ex aceto adhibita.

Atriplex tam crudum, quam coctum illitum.

Plantago cum sale imposita.

Bulbi elixi cum polenta, & suillo adipe illiti.

Isatidis folia imposita.

Eryngium adalligatum,

Abrotanum cum farina hordeacea, & hydreleo subacta illitum.

Acinos herba imposita.

Panacis Asclepij flores, & semen cataplasmatibus indita.

Coriandrum cum faba lomento appositum.

Ammoniacum inunctum.

Onobrychis corisa, et emplastri modo imposita.

Gladioli

Gladioli superior radix cum liliacea farina,
& dulci aqua illita.

Psyllium ex rosaceo, acetose, aut aqua im-
positum.

Mandragora folia recentia adhibita.

Galiopsis folia, caulis, succus, & semen illita.

Personate radix cum axungia suo super folio
imposita.

Pycnocomum adhibitum.

Conyza emplastri modo imposita.

Vini fax illita.

Ad tumores discutiendos.

Cancris fluiatiles impositi.

Lini semen illitum.

Fœni græci farina cataplasmatibus addita.

Capparis radix, & contusa folia imposita.

Smyrni radix illita.

Ammoniacum inunctum.

Ruphthalmi folia, & flores cera excepta, &
imposita.

Mandragora recentia folia cum polëta illita.

Galiopsis folia, caulis, succus, & semen ad-
hibita.

Aegilops imposita.

Diphryges cum resina terebinthina, aut ce-
rato.

Pyrites lapis illitus.

Alabastrites lapis crematus, resina, aut pice
exceptus.

kk

Cimolia

Cimolia terra illita.

Ad scirrhum.

Taurinus sanguis cum polenta illitus.

Bubulum finum ex pascuis assumptum ex
aceto illitum.

Loliacea farina cum fimo columbarum in vino
decocta.

Lini semen cum nitro, & lixiuo ficulneae ci-
neris decoctum.

Hydropiper illitum.

Cannabis sylue stiris radix imposita.

Ad carcinomata.

Cancerorum fluxu acilium cinis cum melle de-
coctus, & illitus.

Irionis semen tritum, & impositum.

Utraque Scitica adhibita.

Galiopteris folia, caulis, succus & semen im-
posita.

Ad tumores in vniuersum.

Suillus adeps illitus.

Brassica Syriaca conosa cum polenta imposita.

Cucurbita imposita.

Xanthii semen illitum.

Bulbi elixir cum polenta, & adipe suilla illiti.

Lini semen cataplasmatibus inditum.

Fœni graeci semen illitum.

Capa decocta, & cum passa sua, & ficu ad-
hibita.

Narcisse radix illita.

Bryonia

Bryonia radix ex vino decocta, & imposita.
 Isatidis folia applicata.
 Smyrni radix illita.
 Tragoriganum cum polenta impositum.
 Mentha cum polenta cataplasmatibus addita.
 Amaraci folia cum cera coacta, & illita.
 Daucum illitum.
 Libanotis radices emplastri modo imposita.
 Nigella ex aceto inuncta.
 Horminum ex aqua illitum.
 Bupthalmi flores cera subacti.
 Althaa decocta imposita.
 Cannubis glaucis radix emplastri modo
 adhibita.
 Anagryis folia illita.
 Polygonon cataplasmatibus inactum.
 Xyridis radix ex aceto inuncta.
 Helxine imposita.
 Quinquefolij radix decocta emplastri modo.
 Verbenacae supina folia imposita.
 Psyllium ex rosaceo, acetoso, aut aqua illitum.
 Ephemeris folia ex vino decocta, illita.
 Cytisi folia cum pane inter initia imposita.
 Cucumeris agrestis radix cum polenta imposita.
 Chamaesyces rami triti, & impositi.
 Pycnocomi semen cum polenta illitum.
 Indicum inunctum.
 Vini fax cruda per se, vel cum myrto illita.

kk 2

Ad

Ad steatomata.

Chrysanthemi flores cum cerato triti, & im-
positi.

Ad meliceridas.

Rumex cum rosaceo, & croco illitus.

Melilotus ex aqua inuncta.

Vua passa à nucleis expurgata trita, cum res-
ta imposita.

Ad tumores ex ictu.

Brassica concisa cum polenta imposita.

Cucurbita emplastri modo illita.

Hydropiper impositum.

Thymus, Thymbræque illita.

Ad sugillata.

Caseus recens illitus.

Succida lana oleo acetoso perfusa.

Fabarum farina ex melle, & feno greco.

Lupinorum farina imposita.

Raphanus ex melle.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Hydropiper impositum.

Ptarmica cum floribus illita.

Bulbi per se, aut ex oui vitello.

Rhaponticum ex aceto.

Alcæ ex melle.

Easerpitij liquor illitus.

Absinthium ex melle.

Aqua maris calida fotu adhibita.

Hyss

Hyssopum ex feruenti aqua.
 Calamintha ex vino.
 Amaraci siccata folia ex melle.
 Cuminum erraticum commansum ex melle.
 Et passa una illitum.
 Ammi ex melle.
 Acetum ex melle.
 Thapsia succus, Et radix cum thuris, Et cera
 aequali portione anabius tantum horis im-
 posita, Et subinde marina aqua foku ad-
 hibita.
 Bryonia ex oleo decocta quousque liquecat.
 Sal ex melle inunctum.

V V L N E R A

Ad vulnera conglutinandam.

Cupressi folia trita.
 Ulmi folia, sed multo magis corticis istia, si
 scilicet loco intorqueatur.
 Sycomori liquor illitus.
 Amurca in cupreo vase decocta illita.
 Palmula immatura illita.
 Viticis folia, Et semen imposita.
 Punicorum cytini impositi.
 Thus inspersum.
 Lana cinis impositus.
 Sylvestris brassica folia imposita.
 Argemone illita.
 Glycyrrhizae succus illitus.

kk 3 Cen

Centaurij maioris recens radix imposita.

Centaurij minoris folia defusa, & illita.

Achillea imposita.

Poterij radix concisa illita.

Sm. rny. radix imposita.

Aloe in puluerem inspersa.

Sarcocolla imposita.

Polycnemox ex aqua impositum.

Polium emplastri modo impositum.

Scordium impositum.

Equiseti folia inspersa.

Lonchitis folia imposita.

Althea in vino, aut melle, aut aqua decocta imposita.

Sideritis folia imposita.

Chamaepitys, ex melle adhibita.

Sideritis altera imposita.

Polygonum emplastri modo adhibitum.

Polygonatum emplastri modo adhibitum.

Symphytum petraeum inditum.

Symphytum emplastri modo impositum.

Clymeni succus impositus.

Sideritis qualibet illita.

Lycapsis radix cataplasmatibus indita.

Ocimi semen illitum.

Graminis radix concisa, & adhibita.

Conyza illita.

Quinquefolium adhibitum.

Coccum infectorium tritum, & inspersum.

Ver

Verbenaca illita. *Erigeron folia & flores cum thuris manna
adhibita.*

Verbasci folia ex aceto. *Spongia recentes sine pinguedine ex aqua vel
posca.*

Succida lana vino, aceto, oleo per infusa.

Dracunculi folia per vino decocta.

Isatidis folia illita.

Stratiotes millefolium impositum.

Morochthus lapis inspersus.

Ad fluxum sanguinis vulnerum

Sylvestris olea foliorum succus admotus.

Galla cremata vino, aceto, aut mellea extin-

cta, inspersa.

Punicorum cytini imposita.

Persea arida folia illita.

Cupressus pilata cum arboris coma tincta &

admotus.

Thuis inspersum.

Ranarum cremataram omnis illita.

Araneorum tela adhibita.

Caprarum montanarum simum ex aceto.

Asininum simum tum cruentum, tum crema-

tum ex aceto.

Stæbis folia imposita.

Portulaca illita.

Plantago admotus.

Idea radix admota.

Isatidis folia inuncta.

Salvia adhibita.

Galij flos inditus.

Androsami folia illita.

Quinquifolium admotum.

Phoenix herba cum punicea lana corpori alligata.

Lichen herba adhibita.

Astragali radix indita.

Hyoscyami semē oboli pondere in mulsā aqua potum.

Stratotes millefolium admotum.

Cinnabaris, & Sanguis draconis inditus.

Alumen admotum.

Sulphur impositum.

Gypsum inspersum.

Spongia sicca recentes, & Sacca imposita.

Spongiarum crematarum cinis ex pice.

Eretria terra inspersa.

Stibium inspersum.

Ad sanguinem ex cerebro erumpentem.

Gallinaceorum cerebrum ex vino potum.

Stibium tritum inspersum.

Ad sanguinis grumos.

Thymus impositus.

Thymbra illita.

Ad vulnera telis venenatis illata.

Dictam

*Dictamni succus tum potus, tum instilla-
tus.*

Ad ossa carne vestienda.

Iris Illyrica illita.

Panacis Herculei radix imposita.

Myrrha cum cochlea carnibus peruncta.

Ad vulnera membranarum cerebri.

Butyrum admotum.

Ad vulnerum inflammationes.

*Bubulum recens finum ex pascuis sumptum,
ac subinde folijs inuolutum, & in feruenti
cinere calefactum impositum.*

Pinorum, & piscearum. folia trita, & illita.

Fabarum farina cataplasmati indita.

Lupinorum farina admoti.

Stratiotes imposita.

Millefolium ex aceto illitum.

Labrusca flores cataplasmati inditi.

Aerugo illita.

Ad infixia vulneribus extrahenda.

*Cochlea terrestres cum suo operimento tusa,
& apposita.*

Siluri salsi caro admoti.

Lacerta concisum caput impositum.

Bulbi cataplasmati inditi.

Horminum ex aqua illitum.

Anagallis adhibita.

kk s Narciss

Narcissi radix cum lotij farina imposita.
Aristolochia rotunda imposita.
Dictamnium admotum.
Gladioli radix superior ex vino; & thure i-
lita.
Xyridis radix admota.
Tragij folia, semen, & liquor illitu.
Pycnocomi semen cum potentilla impositum.
Acute floris radix illita.
Harundinis radix admota.
Sinapi impositum.

Ad carnis excrescentias.

Galle trita, & inspersa.
Palmarum nucleis exusti, lotij, illiti.
Erinacei murini operimentis cinis admotus.
Cremata purpurea capris inditum.
Conchule Indige cinis illitus.
Smaridis piscis exustum caput impositum.
Lana cremata cinis inditum.
Scordium siccatum inspersum.
Aes ustum impositum. Quinetiam aris flos
admotus.
Plumbum elotum tritu, inspersum, illitu, &
quoquo modo admotum.
Stibium tritu, inspersum, illitu, & quoquo
modo admotum.
Argenti spuma trita, inspersa, illita, &
quoquo modo admota.

Cerussa

Cerussa trita, inspersa, illita, Vel quoquo
modo admota.

Chrysocolia trita, inspersa, illita, Vel quoquo
modo admota.

Ochra trita, inspersa, illita, Vel quoquo mo-
do admota.

Diphryges tritus, inspersus, illitus, Vel quoquo
modo admotus.

Auripigmentum tritum, inspersum, illitum, Vel
quoquo modo admota.

Pumex tritus, inspersus, illitus, Vel quoquo
modo admotus.

Corallium tritum, inspersum, illitum, Vel quoquo
modo admotum.

Asy lapidis flos siccatus tritus, inspersus, il-
litus, Vel quoquo modo admotus.

Pyrites lapis cum resina impositus.

Ad vulnera cicatrice obducenda.

Cadmia elota inspersa, Vel illita.

Plumbum elotum impositum.

V L C E R V M.

Ad depascentia ulcera, quæ Græcis
φagedæivæ vocantur.

Pini, piceæ, cortex cum chalcantia tritus
illitus.

Lentisci decoctum fotu adhibendum.

Cupressi folia trita inuncta.

Sabina

Sabina utriusque folia trita, & admota.
Rhamni cuiusque folia imposita.
Cisti flores per se illiti.
Olea sylvestris folia trita, & adhibita.
Lignorum, marcor illitus.
Olinæ matura exusta, trita, & inspersa.
Palma cortex, siue inuolucrum admotum.
Myrti folia trita, cum omphacino oleo, aut
 exiguo rosaceo ex vino imposita.
Amygdala amara ex vino inuncta.
Smaridis piscis crematum, caput, tritum, &
 illitum.
Garum piscium admotum.
Testudinis fel inunctum.
Loliacea farina cum sale, & raphano illi-
 ta.
Lini semen ex vino decoctum.
Erui farina admota.
Raphanus tritus inunctus.
Beta folia imposita.
Plantago quoquo modo indita.
Dracunculi maioris radix concisa, ex melle;
 bryonia addita.
Asphodeli radix, & folia ex vino.
Anagallis trita adhibita.
Hedera decocta folia ex vino.
Chelidoni maioris radix ex vino.
Isatidis folia superposita.
Aristolochia rotunda adhibita.

Chamaleonis

Chamaeleonis nigri radix cataplasmatibus ad-
dita.
Pulegium Sirens appositum.
Marum admotum.
Panacis Asclepij flores, & semen illitum.
Pastinaca erratica folia confusa ex melle.
Coriandrum cum pane polenta &c illitum.
Marrubij folia ex melle.
Tithymali characia lac illitum.
Omphacium ex aceto inunctum.
Cicuta succus illitus.
Sedum maius impositum.
Sphondilium cum ruta admotum.
Polygonum superpositum.
Verbenaca ex aceto.
Solani hortulani folia cum polenta polline
illita.
Acetum fotu adhibitum.
Acida muria fotu imposita.
Petasties admota.
Aeris squamma inspersa.
Aerugo illita.
Sal tostum cum polenta adhibitum.
Salis flos inspersus.
Chalcitis illita.
Diphryges inunctum.
Asius lapis tritus ex aceto.
Alumen cum galla cremata pari pondere ex
aceti fece,

Ad

Ad vlcera diuturna.

Cisti. flores per se illiti.
Centaurium minus admatum.
Panacis Herculei acuminata radix imposita.
Viscum cum thure inunctum.
Chamaedrys ex melle.
Lilij foliorum succus in arco base decoctus
ex aceto. & melle.
Scordium tritum ex melle.
Anchusa radix oleo incocta ex cera.
Verbenaca trita ex melle.
Astragali radix illita.
Thalietri radix inuncta.
Personata folia imposita.
Omphacium ex aceto.
Spongia recentes sicca. & Syena imposita.
Asij lapidis flos siccatus illitus.
 Ad malefica dolosaque vlcera.
Plantago quoquo modo imposita.
Dracunculi concisa radix cum bryonia ex
melle.
Petasites illita.
Psyllium tritum ex melle.
Bryonia folia fructus radix cū sale imposita.
Filicis femina radix trita, & illita.
Cadmia pulvis inpersus.
Salis flos illitus.
Asij lapidis flos ex melle.
Ostracites lapis ex melle.

Ad

Ad sinus & fistulas.

ridis Illyrica radicum decoctum infusum.
 nullus adeps infusus.
 tel. infusum.
 lantaginis succus inditus.
 dracunculi maioris radice succus ex melle.
 tristolachia rotunda cum uide ex melle.
 rhondiliy ramenta circumligata sinuum cal-
 los erodunt.
 quinquefolium cum sale ex melle.
 tratiotes millefolium infusum.
 ithymali characia lacteus succus inditus.
 mphacium cum aceto.
 halcitis collyrii modo infusa.
 admia illita.
 pongia recens sine pinguitudine ex decocto
 melle imposita.
 entiana quoque modo adhibita.

Ad vlcera in callum indurata.

apparis radix exiccata imposita.
 erugo cum ammoniaco collyrii modo im-
 posita.
 pongia arida lino ligata. Et in paeniciilli
 modo imposita.

Ad vlcera ab erodentibus
prouenientia.

ut omne, Et praesertim bubulum illitum.

Ad

Ad phthiriasim.

Staphis agria trita, & ex oleo illita.

Ad fordida vlcera.

Olea Syluestris folia tusa ex melle.

Iris Illyrica ex melle.

Colymbades trita & imposita.

Resina terebinthina illita.

Pix liquida cum melle indita.

Erinacei marini operimentum exustum impositum.

Purpura cremata cinis illitus.

Conchula Indica cinis inspersus.

Orobi farina admota.

Brassica cum faeno graco, & aceto illita.

Asphodeli folia, & radices imposita.

Capparis cortex siccatus, & adhibitus.

Anemones radix illita.

Hedera decocta folia ex vino.

Chelidonium maius cum axungia admotum.

Aristolochia rotunda imposita.

Libanotidis radices siccatae ex melle.

Ballote ex melle.

Marrubij folia ex melle.

Verbenace supina folia illita.

Narcissi radix cum erui farina ex melle.

Bryonia radix, fructusque cum sale admota.

Aerugo ex melle cocta, & imposita.

Aesustum inspersum.

Vrtica

Artica & traque trita, & illita.
Peucedani radix trita inpersa.
Cadmia indita,
Mel illitum.
Pompholyx admota.
Muria indita.
Alumen quoquo modo adhibitum.
Asij lapidis flos exiccatus, & illitus.

Ad ambusta.

Platani pilula adipe excepta illita.
Ligustri foliorum decoctum foru adhibitum.
Cisti flores cum cerato impositi.
Acacia gummi ex ouo illitu pustulas prohibet.
Myrti folia cruda seu cremata cerato excepta.
Mori folia trita ex aceto illita.
Thus ex suillo vel anserino adipe exceptum.
Buccina cinis illitus.
Mitulorum combustorum cinis admotus.
Conchula Indica cinis inunctus.
Calciamentorum veterum cinis impositus.
Suillus adeps inunctus.
Fimum Ouillum cera & rosaceo subactum.
*Fimum Columbinum cum lini semine ex
oleo.*
*Fimum Gallinaceum cum lini semine ex o-
leo.*
Sesamum ex rosaceo.

Malua decocta ex oleo.

Beta Virentia folia illita.

Brassica cinis ex oui albo.

Lactuca sylvestris lacteus succus ex humano lacte.

Hedera flores ex cera. Quin & decocta folia ex vino.

Acanthi radix illita.

Ruta sylvestris semen, & folia admota.

Glutinum calida aqua maceratum illitum pustulas prohibet.

Typha flos Vetere suillo adipe eloto exceptus.

Hemerocallis radix illita.

Althaa folia ex exiguo oleo admota.

Hyperici semen, & folia imposita.

Ascyri semen, & folia adhibita.

Androsami folia imposita.

Anchusa radix in oleo decocta ex cera.

Helxine admota.

Papaveris corniculati folia ex oleo.

Verbasci sylvestris folia cataplasmatibus addita.

Stimmi ex recenti adipe illitum pustulas prohibet.

Alumen ex aqua.

Sal ex oleo pustulas prohibet.

Cimolia terra illita pustulas prohibet.

Phrygius lapis cerato exceptus.

Atramentum scriptorium ex aqua.

Cinn

Cinnabaris, & sanguis draconis illitus.

Gelij flos inunctus.

Lilij radix cremata ex rosaceo. Quin & fo-
lia illita.

Eynoglossa folia ex Veteri suillo adipe.

Sambuci pratenera folia inuncta.

Narcissi radix ex exiguo melle.

Oleum ex canatis asphodeli radicibus deco-
ctum illitum.

Ad fauos.

Peponis radix ex melle.

Nasturtium illitum.

Ad ficos.

Bulbi in cinere tosti, & cum caputum mana-
rum cinere impositi.

Ad intertrigines.

Calciamentorum crematorum solea illita.

Ad ulcerum inflammationem.

Aranei tela imposita.

Ad ulcera caua explenda.

Thus inditum.

Pix liquida cum melle.

Pix arida imposita.

Medulla osium quadrupedum qualibet
inuncta.

ll 2

Mel

Mel infusum.
Cadmia inspersa.
Corallium inditum.
Asy lapis flos ex melle.
Eretria terra illita.
Pumex inspersus.

Ad vlcera cicatrice obducenda.

Purpurarum crematarum cinis illitus.
Mitu'orum cinis illitus.
Conchula Indica cinis illitus.
Aloë inuncta.
Eupatorij folia concisa ex suillo adipe.
Filicis fœmina radix sicca in puluerē aspersa.
Cadmia admota.
Aes Estum impositum.
Squamma aris inspersa.
Aerugo ex oleo & cera.
Stimmi quoquo modo adhibitum.
Molybdæna quoquo modo adhibita.
Argenti spuma quoquo modo adhibita.
Cerusa quoquo modo adhibita.
Chalcitis quoquo modo adhibita.
Pumex quoquo modo adhibita.
Fex Vini cremata quoquo modo adhibita.
Calx lota quoquo modo adhibita.
Corallium quoquo modo adhibitum.
Asy lapidis flos quoquo modo adhibitus.

For

LUXATIONVM ET FRACT. 165

Fornacea testa tosta quoquo modo adhibita.

LUXATIONVM ET
FRACTVRARVM.

Ad artuum luxationes.

Harundinis radix cum aceto adhibita.

*Personata radix trita illita dolores artuum
à contorsionibus sedat.*

Acacia decoctum fotu adhibitum.

*Viticis semen cum folijs cataplasmatibus addi-
tum.*

*Stercus caprillum cum cera, & rosaceo inun-
ctum.*

*Asparagi radix ex aceto, vel Vino adhi-
bita.*

Cyclamini decoctum fomenti modo.

Bulbi cataplasmatibus more adhibiti.

Acanthi radices impositae.

Sampsuchi folia cum cera coacta imposita.

*Anchusae folia cum melle, & farina adhi-
bita.*

Vrtica & traque imposita.

Narcissi radix cum melle trita.

Vitis nigra folia cum Vino imposita.

Filicula imposita.

Heliotropij folia linita.

Sarmentorum Vitis, & Vinaceorum cinis ex

℥ 3

aceto

aceto linitus.

Sal cum farina, & melle.

Ad ossa fracta.

Myrthi foliorum decoctum fotu adhibitum.

Succida lana oleo, Vino, acetóque perfusa.

Verbasci decoctum potum.

Fuligo pictoria cum rosaceo cerato imposita.

Vlmí foliorum, aut corticis radicum decoctum perfusum.

Ad ossa fracta euellenda.

Aristolochia rotunda cataplasmatís more imposita.

Peucedani radix in puluerem imposita.

Euphorbium impositum.

Xyridis radix addito flore aris.

Bryonia trita, & imposita.

Vitis nigra radix.

Ad eos qui ab alto deuoluuntur.

Gentiane radicis succus drachmæ pondere haustus.

Baccharis radicis decoctum potum.

Millesfolium cum aqua, & sale potum.

Lixiuum ex cinere sarmentitio factum cum aceto, sale, & melle.

Ad ruptos.

Acori decoctum potum.

Cardamomum ex aqua potum.

Calami odorati decoctum cum graminis, aut
apij semine potum.

Helenij radices in eclegmate cum melle deno-
rata.

Bdellium haustum.

Iuniperi bacca bibita.

Cedrides denorata.

Halimi radix drachma pondere in aqua mul-
sa pota.

Dracunculi maioris radix tosta, & elixa
cum melle sumpta.

Asphodeli radix drachma pondere in Sinopota.

Bulbi elixi in aceto, & in cibo sumpti.

Agaricum trium obolorum pondere denora-
tum cum mulso.

Gentiana radice succus drachma pondere
haustus.

Aristolochia rotunda bibita.

Serpyllum potum.

Centaurij maioris radix hausta cum vino.

Acanthi radices pota.

Smyrny radix comesta, vel pota.

Leucacantha radice ex vino decoctum potum.

Abrotani semen ex aqua potum.

Organum cum ficu denoratum.

Equiseti radix & folia pota.

Calamintha decoctum haustum.

Baccharis radice decoctum bibitum.

ll 4 Liba

Libanotis radices pota.

Sagapenum bibitum.

Laserpitij liquor cum lixiuio potus.

Galbanum deglutitum.

Polycnemon bibitum cum Vino.

Scordium additis nasturtio, melle, resinaque deuoratum.

Althae decoctum potum.

Alcea radix in Vino vel aqua pota.

Betonica folia drachma pondere in dulci aqua bibita.

Symphytum petraum cum aceto mulso potum.

Symphyti radix pota.

Xyridis radix ex mulso pota.

Helichrysi coma in Vino pota.

Verbasci decoctum potum.

Bryonia cum melle in eclegmate deuorata.

Schistus lapis potus.

V E N E N O R V M.

Ad omnium venenosorum morsum.
ictumque.

Iridis illyrice radix ex aceto pota.

Cardamomum ex Vino potum.

Nardus Celtica cum absinthij decocto hausta.

Ihu antidotis inferitur, qua Venenatis resistent morsibus.

Cinnamomum bibitum.

Casia

Cassia potui data.

Helenij radicis decoctum potum.

Bdellium potui datum.

Platani pilula ex vino hausta.

Erica flores poti. Quin etiam coma.

Vitidis semen in potu sumptum.

Glandes esitata.

Nuces comesa.

Sycomori lachryma illita.

Ficulneum lac plagis inditum.

Pix liquida cum trito sale illita.

Paliuri foliorum. Et radicis decoctum potum.

Gallinaceorum cerebrum cum vino potui datum.

Eruca, quae in oleribus reperiuntur ex olea illita.

Coagulum Leporinum potum ex vino trium obolorum pondere.

Coagulum Agninum potum ex vino trium obolorum pondere.

Coagulum Hinnulinum potum ex vino trium obolorum pondere.

Coagulum Aprinum potum ex vino trium obolorum pondere.

Coagulum Ceruinum potum ex vino trium obolorum pondere.

Coagulum Vitulinum potum ex vino trium obolorum pondere.

ll s Coa

Coagulum Bubalinum potum ex Vino trium
obolorum pondere.

Coagulum Hædinum potum ex Vino trium
obolorum pondere.

Coagulum Caprea potum ex Vino trium obo-
lorum pondere.

Coagulum Laticornis potum ex Vino trium
obolorum pondere.

Marina testudinis sanguis cum leporino coa-
gulo, & cumino potus.

Mel ex calido rosaceo bibitum.

Triticea farina ex aceto & Vino imposita.

Porri succus ex melle sumptus. Quin & cornu
illita.

Porrum sylvestre esitatum.

Piper quoquo modo sumptum.

Eryngium ex Vino haustum.

Teucrium ex aceto inunctum.

Argemone ex Vino epota.

Agaricum trium obolorum pondere ex Vino
haustum.

Rhaponticum potui datum.

Chamaedrys ex Vino bibita.

Gentiana radix drachma pondere cum pipe-
re, & ruta ex Vino pota.

Aristolochia longa drachma pondere potui da-
ta, ac etiam plaga admosa.

Origani decoctum haustum.

Leucas ex Vino sumpta, vel cataplasmat
ada

addita.

Pulegium ex Vino potui datum.

Dictamni succus ex Vino potus.

Baccharis radix ex Vino bibita.

Panacis Herculei semen cum aristolochia
sumptum.

Ligustici tum radix, tum semen haustum.

Pastinaca erratica semen potui datum.

Anisum potum.

Asclepiadis radices ex Vino sumptae.

Cuminum ex Vino haustum.

Ammi cum Vino potui datum.

Delphinium morsui admotum.

Lasertij liquor tum inunctus, tum bibitus.

Galbanum inunctum homines tutos reddit.

Clinopodium haustum.

Trifolij bituminosi folia ex oxymelite sumptae.

Poly decoctum potum.

Betonica folia trium drachmarum pondere
ex Vini sextarijs duobus hausta, vel ad-
mota.

Polygoni succus bibitus.

Clematis prima illita.

Sparganii radix ex Vino pota.

Acida muria plaga indita.

Terra Lemnia hausta.

Sal cum origano, melle, & hyssopo illitum.

Ad viperarum morsum.

Costus, semiuncia pondere potus.

Cassia

Cassia potui data.

Pix liquida illita.

Iuniperi folia, et foliorum succus potui datus.

Fraxini folia, vel eorum succus haustus.

Lauri folia admota.

Abrotanum illitum.

Galbanum Splenij loco superiectum.

Origanum Virens inditum.

*Pulli gallinarum discerpti, & confestim ad
moti.*

*Anthemis detrita cum hordeacea farina, &
mulso aceto cataplasmatibus modo admota.
Sed locus antea aceto mulso calido fovea-
tur.*

Rubi folia ex vino illita.

Porri succus ex meri hemina haustus.

Apiastri succus ex vino potus.

Leporis coagulum potui datum.

*Omotarichi piscis salita carnes in cibum sum-
pta, hausto deinde copiosiore vino. Quin-
etiam admota.*

Cervi genitale tritum, & ex vino sumptum.

Vrina ipsiusmet demorsibibita.

Furfures triticei in decocto ruta elixi, admoti.

Erui farina ex vino macerata illita.

Raphanus inunctus.

Brassica succus cum nitro & iride potus.

Chondrylla manducata.

Allium ex vino sumptum, & illitum.

Scilla

cilla decocta in aceto, & imposita.

Inagallidis succus ex vino sumptus.

erula medulla in vini potione.

Iparina succus ex vino potui datus.

Rubia radice succus cum folijs potus.

Ribuli terrestris succus drachma pondere potus, plagæq; admotus.

Anchusa Alcibiadis nomine folia, radicesque tum comesta, tum bibita, tum adalligata.

Cimastri semen ex vino haustum.

Ambuci, ebulique radix ex vino cocta, potui data.

Bryonia radix duarum drachmarum pondere hausta.

Tritium sarmentorum cinis ex aceto illitus.

Ad serpentum & aspidum morsum.

Canceri fluviatiles crudi, tritique cum asinino lacte potui dati.

Equi fluviatilis testiculus potus.

Castorium bibitum.

Mustela salita, & in umbra exiccata pulvis drachmarum duarum pondere ex vino sumptus.

Rana cum sale in oleo decocta comesta.

Gobius piscis deuoratus.

Cimices lectularij septē quoquo modo hausti.

Aprinum iecur, & recens, & siccum ex vino sumptum.

Gallis

*Gallinaceorum carnes dissectæ, ita ut tepere-
bunt appositæ, crebrôque mutata.*

Butyrum illitum.

*Caprarum montanarum finum in Vino, Vel
aceto decoctum illitum.*

Mel ex calido ro'aceo bibitum.

*Asphodeli radix trium drachmarum pondere
sumpta. Quin & folia, flores, & radices
in cataplasmatibus.*

Nasturtium haustum.

Spina alba semen potum.

Abrotanum ex Vino sumptum.

*Hyssopum tritum cum melle, sale, & cumino
impositum.*

Nepeta pota, Vel cataplasmatibus indita.

*Panacis Asclepij semen cum floribus hau-
stum, & inunctum.*

Panaces chironium bibitum, & illitum.

Hieracij succus ex Vino potus.

*Elaphobosci semen in Vini potione sum-
ptum.*

*Euphorbium incisa capitis cute ad os, & f-
que in Vulnus impositum, statimque con-
sutum.*

*Lesntopetalum bibitum illico dolorem au-
fert.*

Lilij folia illita.

*Metisophyllum ex Vino haustum, & plagæ
admotum.*

Marra

Sarrubij folia hausta.
Erpyllum tum potum, tum impositum.
Uta cum nucibus inglandibus, & caricis
sumpta.
Hyllitis ex vino hausta.
Myrrij radix illita.
Enicolum ex vino sumptum.
Agapenum ex vino potui datum.
Abanotis radices cum vino bibita.
Ordium siccatum ex vino sumptum.
Myza illita.
Sematis in aceto bibita.
Chij radix ex vino pota. Præputa Verò demor
deri prohibet, id quod præstant semen, &
folia.
Simastri semen potum.
Opatorij semen, & folia in vino sumpta.
Helichrysi coma ex vino bibita.
Erbenaca supina radix, & folia ex vino
hausta, tum etiam admota.
Andragora radix ex melle, aut oleo illita.
Perij radix ex vino sumpta.
Acetum calidum fotu adhibitum, ubi illa-
tum Venenum frigidum sit: frigidum Verò
ubi calidum.
Udianti decoctum bibitum.
Uqua maris fotu adhibita.
Ucum origano, melle, & hyssopo inunctum.
Urmentitius cinis ex aceto illitus.

Samia

Samia terra ex aqua pota.
Ophites lapis pro amuleto gestatus.

Ad hæmorrhoi morsum.

Allium bibitum, & illitum.
Merum copiosius haustum.
Vitium & viniferarum folia decocta. & ex melle subacta imposita.

Ad cerastæ morsum.

Sesamum cum rosaceo inunctum.
Raphani semen ex vino bibitum.
Sal cum cedria, aut pice, aut melle illitum.

Ad scolopendræ morsum.

Asphodeli radix, & semen ex vino pota.
Sal ex melle, & aceto.
Ruta sylvestris admota. Quin, & bibita ex vino.
Muria acida fotu adhibita.
Aristolochia ex vino pota.
Serpyllum potui datum ex vino.
Calamintha ex mero sumpta.

Ad dryini morsum.

Aristolochia cum vino hausta.
Trifolij bituminosi folia in potu sumpta.
Asphodeli radix potui data.
Glandes quæcunque bibite,
Illicis radices tuse, & icto loco illite.

Ad na

Ad natricis morsum.

Origanum tritum, & aqua subactum ex li-
xiuio, & oleo inditum.

Aristolochia cortex minutim contritus cum
querna radice, & hordei farina ex melle
illitus.

Aristolochia bina drachma in potione posca
pota.

Marrubij succus ex vino haustus.

Fanus recens ex aceto sumptus.

Ad cenchri morsum.

Lactuca semen cum lini semine illitum.

Satureia cum syluestri ruta, & serpyllo, &
asphodeli radice ex vino sumpta.

Gentiana potui data.

Cardamomum deuoratum.

Ad muris aranei morsum.

Mus araneus ipse discerptus, & impositus.

Allium cum ficulneis folijs, & cumino illitum.

Absinthium vino bibitum.

Chrysogoni radix concisa, & ex aceto impo-
sita.

Galbanum in Splenio admotum.

Hordeacea farina ex aceto mulso illita.

Punica dulcis acini decocti, & inuncti.

Porrum contritum impositum.

Abrotani decoctum ex vino haustum.

Serpyllum ex vino potum.

Eruca ex vino sumpta.

m m

Cupressi

Cupressi recentes pilula ex aceto potui data.

Cyclaminus ex aceto mulso sumpta.

Pyrethrum ex Vino potum.

Chamaeleonis radix bibita.

*Ad pastinacæ marinæ, scorpionis &
draconis marini morsum.*

Salvia decoctum potum.

*Simplicia omnia, quæ Viperinis morsibus con-
ueniunt.*

*Absinthij, aut Sulphuris ex aceto decocti po-
tio.*

*Animalia ipsa dissecta suo cuiusque ietui ad-
mota.*

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Ocimum cum polenta, & aceto impositum.

Plumbum confisicatum.

Sulphur admotum.

Ad morsum mustelæ.

*ErUCA comesta, & post eam bibitum Vinum
odoriferum.*

Ad morsum basilisci.

*Castoreum drachmæ pondere ex Vino po-
tum.*

Papaveris succus haustus.

Ad calcidicæ lacertæ morsum.

Portulaca percocta.

Ad rabidi canis morsum.

*Lycium in catapotio datum, aut ex aqua bi-
bitum.*

Ca

Cancrorum fluuiialium cinis cochlearium duo-
rum pondere ex gentiana radice vino, per
triduum in vino potus.

Smaridis piscis salsa caro.

Omotarichi piscis salita carnes illita.

Garum omnium piscium fomēto adhibitum.

Canis rabidi epar tostum, & in cibo sum-
ptum à metu aquae praeseruat.

Caninus sanguis bibitus.

Canina &rina bibita.

Mel bibitum cum rosaceo calido.

Triticum commanducatum, & appositum.

Cepae cum ruta, sale, & melle mixtae.

Allium cum vino potum, & cataplasmatibus
inditum.

Panaces Herculeum pici mistum, & cata-
plasmatis additum.

Feniculi radices concisa, & ex melle im-
posita.

Lascer impositum.

Ballote cataplasmatibus modo cum sale illita.

Melissophyllum cum vino bibitum, & cata-
plasmatis inditum.

Alyssum in edulio contusum.

Allium sylvestre in cibo sumptum & illitum.

Salsamentum inditum.

Succus Cyrenaicus.

Ad canis non rabidi morsum.

Amygdala amara ex melle excepta.

m m a Mitu

Mitulorum caro imposita.

Gobius piscis impositus.

Orobi farina vino macerata indita.

Plantago cataplasmatibus modo adhibita.

Cucumeris folia imposita.

*Bulbi cum melle, & trito pipere cataplasma-
tis more impositi.*

Menta imposita.

Urtica & traque cum sale adhibita.

*Cynoglossi radix, & folia cum suillo adipe ve-
teri imposita.*

Sambuci, & ebuli folia illita.

Sarmentitius cinis ex aceto illitus.

Ad phalangiorum morsum.

Myrica fructus poti.

Myrtus ex mero hausta.

Mori foliorum succus cyathi mensura potus.

*Lixivium ficulnei cineris potum, adiecto sa-
le trito, & vino.*

*Cancris fluviatiles crudi, tritique cum asinino
lacte poti.*

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Malva decoctum impositum.

Myrrhis ex vino pota.

*Asparagi radicum decoctum haustum ex
vino.*

Lactuca sylvestris bibita.

Coris semen potum in vino.

Hedera

Hedera succus cum aceto potus.
Abrotanum cum Vino bibitum.
Dauci semen ex Vino assumptum.
Nigella drachma pondere cum aqua pota.
Aparine ex Vino pota.
Melissophyllum cum Vino bibitum, & cata-
plasmatis more additum.
Phalangii folia, flores, semenque potum.
Iunci marini tenella folia prope radicem e-
rumpentia imposita.
Hyacinthi radix pota.
Semperiuium maius in potu datum.
Aqua maris fotu applicata.
Punica sylvestris radix, quam tenuissime
trita, aut aristolochia cum hordei farina,
& aceto subacta.
Apiastri decoctum fotu adhibitum, aut eius
folia.
Abrotani semen propinatum binarum drach-
marum pondere cum hemina Vini.
Anisi semen propinatum binarum drachma-
rum pondere cum hemina Vini.
Cumini ethiopici semen propinatum bina-
rum drachmarum pondere cum hemina
Vini.
Ciceris sylvestris semen propinatum bina-
rum drachmarum pondere cum hemina
Vini.
Cedrides trite admota, vel bibita.

mm 3

Platani

Platani cortex potius.

Cupressi viridium pilularum admisto Vino decoctum.

Chamaepityos decoctum bibitum.

Trifolij semen propinatum.

Ad stellionis morsum.

Sesamum cum rosaceo.

Ad crocodilorum morsum.

Sal impositum.

Ad quadrupedum morsum.

Aprinum epar tum recens, tum siccum bibitum.

Ad scorpionum ictus.

Cyperus impositus.

Cardamomum ex Vino potum.

Amomum ex ocimo illitum.

Lauri bacca ex Vino bibita.

Myrti succus ex mero haustus.

Ficus sativa lactens succus plaga instillatus.

Cancris fluxiatiles crudi, tritiq³ cum asinino lacte poti.

Scorpius ipse tritus, & impositus, vel tostus deuoratus.

Delphinium appositum.

Mulus piscis dissectus, & impositus.

Smaridis piscis salita caro apposita.

Lacerta dissecta, & apposita dolorem sedat.

Mures domestici dissecti, & impositi.

Fimum

Fimum Asini herbas pascentis Vino dilutum haustum.

Fimum Equi herbas pascentis Vino dilutum haustum.

Vrina humana pota.

Farina triticea ex aceto, & Vino posita.

Lychnidis semen cum Viro potum.

Oxylapathi, & oxalidis semen Vino, aut aqua potum.

Sonchi succus comestus, & cataplasmatibus more impositus.

Intybus more cataplasmatibus.

Phalangium herba pota.

Lactuca sylvestris bibita.

Ocimum cum polenta impositum.

Asphodeli semen, & flores in Vino poti.

Abrotanum in Vino potum.

Sampsuchum ex aceto, & sale impositum.

Hieracium maius, & minus cataplasmatibus more appositum.

Lacer oleo dilutum impositum.

Colus rustica cum Vino piperis bibita, & manibus gestata dolorem punctura omnino fugat.

Melissophylli folia adhibita.

Polemonij radix alligata.

Rubi flos, & mora.

Verbasci aureum florem ferentis folia imposita.

m m 4 Cham

Chamaesyces succus illitus.

Scorpioides illita.

Heliotropium potum cum vino, & illitum.

Aqua maris fotu imposita.

Sulphur ignem non expertum cum resina terebinthina exceptum admotum.

Calamintha trita illita, vel cum posca, fota.

Galbanum Splenij more ductum impositum.

Hordei farina cum vino parata.

Ruta decoctum fotu adhibitum.

Trifolium tritum iniectum.

Cupressus cum vino, & ruta.

Peucedani succus haustus.

Pulegij decoctum potum.

Gentiana decoctum potum.

Aristolochia praesertim cortex drachmarum duarum pondere.

Sal cum lini semine.

Sapphirus lapis illitus.

Ad vesparum & apum ictum.

Lauri folia trita, & illita.

Ma'ua concisa ex oleo imposita.

Sisymbrij folia imposita.

Althae decoctum ex posca bibitum.

Sal cum sepo Vitulino.

Ad fugandum animalia venenosa.

Iuniperi accensa fumus.

Cedrides peruncto corpore adipe vel medulla cervina excepta.

Viticis

Viticis folia suffita, vel substrata.

Canceri fluviatiles crudi cum ocimo triti
scorpionibus admoti.

Cervinum cornu crudum incensum, suffi-
tūque.

Cervi, & Elephantis adeps inunctus.

Cervina medulla.

Nasturtium suffumigatum.

Abrotanum stratum, suffitūq; incensum.

Origani folia stratis subiecta.

Dictamnū olfactum omnia, quæ ictu, aut
morsu venenum relinquunt, enecat.

Calaminthe suffitus.

Peucedani suffitus.

Lysimachia incensa fugat serpentes, &
muscas.

Nigella suffitus.

Galbani suffitus.

Polium & trumq; incensum, stratumq;.

Corylæ suffitus.

Gagates lapis suffitus.

Ad venena omnia.

Phu antidotis insertum.

Cinnamomum potum.

Pix liquida cyathi mensura in eclegmate
ex melle data.

Cedrides antidotis imposita.

Nuces inglandes cum ruta, & ficis præsumpta

Quinquefolij radicis succus bibitus.

mm 5 Coagulum

Coagulum leporinum potum.

Epipactis hausta.

Castoreum bibitum.

Calamintha præpota.

Mustela salita, & in Umbra exiccata pulvis
cum Vino.

Mustela Ventriculus coriandro farctus, &
inueteratus.

Canicula lac primi partus potum.

Eryngium cum Vino potum.

Butyrum deficiente oleo, haustum.

Sanguis Anseris antidotis commistus.

Sanguis Anatis antidotis commistus.

Sanguis Hædi antidotis commistus.

Vrina ipsiusmet infirmi pota.

Semen raparum haustum.

Ruta semen acetabuli pondere cum Vino po-
tum.

Napi semen potum.

Malua decoctum cum suis radicibus frequen-
ter potum, crebroq; euomitum.

Brassica semen antidotis impositum.

Irionis semen haustum.

Laserpitium potum.

Agaricum drachma pondere cum diluto Vi-
no sumptum.

Chamaeleonis alba radix cum Viro pota.

Spina alba in amuletum congesta, colloqu-
suspensa.

Abrotan

Abrotani semen cum Vino potum.

Aut cum inglandibus nucibus, & caricis
sumpta.

Apj decoctum potum.

Tarrubij folia bibita.

etonica folia drachma pondere in Vino bi-
bita.

olemonie radix in Vino bibita.

tribuli terrestris succus haustus cum Vino.

milacis asperi acini prius, postve sumpti.

acetum tepidum bibitum.

erra Lemnia ex aqua hausta.

erra Samia ex aqua hausta.

Ad leporem marinum ebibitum.

edria contrita cum Vino hausta.

ancri fluminales cum suo iure elixi, & co-
mesti.

ac asininum continuè datum.

assum continuè datum.

salua radicum decoctum haustum.

yclamini radix cum Vino bibita.

eratrurn nigrum drachma pondere data
cum malsa, & mali punici acinis.

cammonij succus drachma pondere data
cum malsa, & mali punici acinis.

Inserinus sanguis tepidus haustus,

lismatis drachma vna, vel altera bibita.

Ad rubetam ranam ebibitam.

estudinis marina sanguis cum leporis coa-
gulo,

gulo, & cymino bibitus.

Alismatis radix vnius, vel duarum drachmarum pondere in vino pota.

Merum largius potum, & euomitum.

Harundinis radices binæ drachma pota.

Cyperii radices binæ drachma pota.

Ad buprestes & pinorum erucas ebibitas.

Oleum Irinum potum.

Oleum Melinum potum.

Caricæ comese, & earum decoctum ex vino.

Palmula thebaica in cibo sumpta, vel trita ex mulso, aut lacte pota.

Pyra omne genus in cibum sumpta.

Humanum lac bibitum copiose.

Simplicia omnia, quæ epotis cantharidibus profunt.

Ad epotas hiruðines.

Muria in sorbitionibus data.

Cyrenaicus succus potus.

Laserpitij folia ex aceto hausta. Quin

succus ex aceto gargarizatus.

Beta folia cum aceto bibita.

Nuus glebula cum posca sumpta.

Cinices vino acetoque poti.

Acetum cum sale potum.

Nitrum ex aqua gargarizatum.

Atramentum sutorium aceto dilutum gargarizatum,

Ad epotas cantharidas.

alica decoctum clismate infusum.
 ryza decoctum clismate infusum.
 agij decoctum clismate infusum.
 alua decoctum clismate infusum.
 men lini decoctum clismate infusum.
 men fani graci decoctum clismate in-
 fusum.
 thaa decoctum clismate infusum.
 trum ex hydromelite potum.
 uclei pinei ex vino sumpti.
 cumeris semen contritum, ex mulso aut
 lacte haustum.
 aserinus adeps ex passo potus.
 ic potum.
 num dulce liberalius bibitum.
 uris cortex ex passo sumptus.
 mia terra, qua Aster appellatur ex de-
 fruto hausta.
 legium tritum ex aqua potui datum.
 faccum cum Irino ex ruta decocto sum-
 ptum.
 is recentes ramuli detriti, & ex passo
 hausti.
 esculentum omnium adipum.
 Ad haustam salamandram.
 sina pinea in delinctu.
 lbanum ex melle deglutitum.
 clei pinei contriti, ex ainga decocto poti.
 Prtica

Urtica cum lilijs ex oleo decocta, & pota.

*Testudinis marinae, & terrestres oua cocta
deuorata.*

*Ranarum ius, in quo eryngij radix fuerit
cocta, potum.*

*Ad sanguinem & lac in ven-
triculo concretum.*

Coagulum leporinum epotum.

Acetum tepidum potum, & vomitu redditum.

*Grossi lacteo succo turgentes ex posca sum-
pti.*

Nitrum per sese potum.

*Coagulum omne ex aceto, & laserpitij ra-
dice, an lasere haustum.*

*Brassica semen ex lixiuio ficulnei cineris po-
tum.*

Conyze semen cum pipere ex aceto haustum.

Rubi succus ex aceto potui datus.

*Hordeacea farina ventriculo, & aluo e-
aqua mulsâ inuncta.*

Thymum ex vino haustum.

Calamintha folia arida pota.

Ad colchicum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

*Bubulum lac haustum, quin & asininum
largius potum.*

*Quercus foliorum, aut glandium decoctum
potum.*

Malicorium haustum.

Serpyllu

Serpyllum ex lacte decoctum bibitum.
Sanguinalis herba succus potui datus.
Vitis recentium viticularum succus bibitus.
Rubi succus in potu sumptus.
Ferula recentis medulla ex vino sumpta.
Syrti bacca trita, & aqua macerata, & in
liquorem soluta, pota.
Castanearum media tunica trita, & cum
sanguinaria succo epota.
Triganum cum lixiuo bibitum.
Implicia omnia, qua fungis aduersantur.

Ad folanum somniferum.

Aqua mulsa copiose sumpta.
Lac caprillum potum.
Lac asininum potum.
Vinum dulce tepidum cum aniso bibitum.
Amygdale amara deuorata,
Conchyliia omnia tam cruda quam tosta deuorata.
Locusta marina, quin & Gammari in cibum
sumpti, & eorum iuscula pota.

Ad hyoscyamum.

Cori cortex potus.
Aqua mulsa largius ebibita.
Lac omne praesertim asininum potum.
Picuum aridarum decoctum bibitum.
Nuclei pinei deuorati.

Cucur

Cucumis semen ex passo potui datum.
 Vinum salsum cum suillo recenti adipe. &
 passo potum.
 Vrtica semen ex aqua sumptum.
 Nitrum ex aqua haustum.
 Cichorium deuoratum.
 Sinapis quoquo modo sumpta.
 Nasturium ex Vino sumptum.
 Raphanus ex Vino sumptus.
 Cepa ex Vino sumpta.
 Allium ex Vino sumptum.

Ad aconitum.

Leporinum coagulum ex Vino potum.
 Hædinum coagulum ex Vino potum.
 Vitulinum coagulum ex Vino potum.
 Chamæpitios decoctum haustum.
 Scoria ferri ex aceto mulso sumpta.
 Origani decoctum cum Vino absinthite po-
 tum.
 Ruta decoctum cum Vino absinthite potum.
 Marrubij decoctum cum Vino absinthite po-
 tum.
 Absinthij decoctum cum Vino absinthite po-
 tum,
 Sedum maius ex Vino absinthite potum.
 Abrotanum ex Vino absinthite potum.
 Chamelæa ex Vino absinthite pota.
 Anzæ ex Vino absinthite pota.

Opo

Opobalsamum drachma pondere ex melle, vel
lacte cum castoreo, pipere, & ruta aquis
ponderibus ex vino potum.

Vinum in quo aurum, argentum, ferrum &c
candens restinctum fuerit, potum.

Gallina ius ex lixivio & vino paratū potum.

Bubularum carnum propingua iura cum
vino sumpta.

Ad taxum.

Acetum calidum potū, & vomitu redditum.
Simplicia omnia, quæ cicut & resistunt.

Ad toxicum.

Sanguis Hircinus frixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Caprillus frixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Leporinus frixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Ceruinus frixus, & in cibis sum-
ptus.

Sanguis Caninus frixus, & in cibis sum-
ptus.

Galbanum cum myrrha ex vino haustum.

Quinquefolij radix pota.

Roboris cortex tritus ex lacte haustus.

Fagi cortex tritus ex lacte haustus.

Illicis cortex tritus ex lacte haustus.

n n

Coto

Coronea mala deuorata, aut cum pulegio, &
aqua bibita.

Amomum ex vino haustum.

Carpobalsamum ex vino haustum.

Ad opium & corniculatum papauer.

Mel ex rosaceo calido bibitum.

Origanum cum passo aut oxymelite haustum.

Alismatis radix duarum drachmarum pon-
dere ex vino pota.

Acetum bibitum, & vomitu redditum.

Sal cum oxymelite sumptum.

Meracum Vinum cum absinthio, & cinnamo
mo haustum.

Nitrum ex aqua potui datum.

Origanum cum lixiuio, aut passo potum.

Ruta syluestris semen cum pipere, & panace
ex vino sumptum.

Piper cum castoreo ex aceto mulso, vel cum
satureia, aut origani decocto ex vino bi-
bitum.

Pinguia iura in potum sumpta cum vino aut
passo.

Ostium medulla ex oleo pota.

Ad cicutam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origanum cum passo, aut oxymelite potum.

Acetum bibitum, & vomitu redditum.

Meracum

Meracum Vinum largius epotum, & per interualla repetitum.

Lactum bubulum, tum asininum potum.

Castorium cum ruta, & menta ex vino sumptum.

Anommi Uncia epota.

Cardamomi Uncia epota.

Styracis Uncia epota.

Piper cum Ortica semine ex vino haustum.

Lauri folia potui data.

Laser ex oleo vel passo potum.

Passum per se largius ebibitum.

Ad ixiam.

Absinthium ex vino bibitum.

Origani ex vino sumptum.

Acetum potum, vomituque reiectum.

Ruta sylvestris semen potum.

Laserpitij radix pota.

Tragorigani decoctum haustum.

Resina terebinthina deuorata.

Nardus Indica potui data.

Castorium oboli pondere sumptum.

Laserpitium oboli pondere sumptum.

Nuces iuglandes cum resina castorio, & ruta trita. ita ut singula drachma pondus aequet ex vino hausta.

Chamelae succus scillici pondere ex aqua mulsa haustus.

nn

2

Tha

*Thapsia succus scillici pondere ex aqua mulsa
haustus.*

*Absinthij succus scillici pondere ex aqua mulsa
haustus.*

Ad coriandrum.

Merum per sese, & ex absinthio potum.

Oleum potum.

Oua in oleo exinanita, & ex muria liquefacta deuorata.

Muria epota.

*Gallarum, & anserum ius copiose salsum
haustum.*

Passum ex lixiuio assumptum.

Ad psyllium.

Simplicia omnia quae coriandro aduersantur.

Ad herbam sardoniam.

Aqua mulsa liberalius pota.

Lac affatim bibitum.

*Aqua calida fotu adhibita. Quin etiam &
oleum.*

Ad mandragoram.

Aqua mulsa copiose pota, & vomitu reiecta.

Nitrum cum absinthio ex dulci vino, aut passum sumptum.

Rosaceum cum aceto capiti perfusum.

Eupatorium ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Piper

Piper ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Sinapi ex aceto tritum, & ad olfaciendum datum.

Castorium ex aceto tritū, & ad olfaciendum datum.

Ruta ex aceto trita, & ad olfaciendum data.

Lucernarum extinctarum fumus olfactus.

Ad fungos malos.

Fimus gallinae cum aceto bibitus.

Mel ex rosaceo calido potum.

Raphanus deuoratus, vel potui datus.

Absinthium cum aceto sumptum.

Melissophylli folia cum nitro bibita.

Lixiuum sarmentitij cineris ex acida muria potum.

Satureia feruifaceta, hausta que.

Origani insculum potui datum.

Acetum calidum potū, & vomitu reiectum.

Atramentum sutorium ex aqua potum.

Sal cum oxymelice bibitum.

Pyrastri folia pota, deuorata que.

Oua gallinacea cum aristolochia drachma ex posca deuorata.

Panacis radix, & semen ex vino pota.

Fex vini cremata ex aqua pota.

Sinapis bibita.

Nasturtium comestum.

Ad gypsum.

Origanum cum passo aut oxymelite potum.

*Malua decoctum potum. Quin & toto corpore
inpersum.*

Oleum ebibitum.

Aqua mulsa bibita.

Caricarum decoctum potum.

*Lixivium è ficulneo, aut sarmentitio cinere
paratum, cum vino copiosiore haustum.*

*Origanum cum lixivio, aut aceto, aut passo
sumptum.*

Quin etiam & thymum.

Simplicia omnia quæ fungis resistunt.

Ad cerussam.

Amaracinum oleum potum.

Irinum oleum potum.

Vini liquor potus.

Persicorum nuclei ex ptisana poti.

Caricarum decoctum haustum.

Maluarum decoctum haustum.

Lac calidum bibitum.

Sesamum tritum ex vino sumptum.

Lixivium ex sarmentitio cinere haustum.

Columbina ova cum thure pota.

Ad argenti spumam.

Hormini Sylvestris semen potum.

Myrrha bibita ex vino pota.

Absinthium ex vino potum.

Hyssop

Hyssopum ex vino potum.

Apij semen ex vino potum.

Piper ex vino potum.

Ligustri flores ex vino poti.

*Palumborum aridum finum cum Nardo ex
vino potum.*

Ad argentum viuum.

Lac copiose potum, & vomitu reiectum.

*Simplicia omnia, qua faciunt ad argenti Spu
mam.*

*Ad calcem, sandaracham, & auri-
pigmentum.*

Lac ex aqua malsa potum, & vomitum.

Carnium iura pingua hausta.

*Althaa decoctum ad spissitudinem redactum
potum.*

*Malua decoctum ad spissitudinem redactum
potum.*

Tragi herba semen bibitum.

Seminis lini decoctum potui datum.

Oryza decoctum potum.

nn 4

SIM

SIMPLICIUM MEDICAMENTO-

RVM FACULTATES,

que corpori decorem
prestant, ex
Dioscoride.

DECORIS.

Ad alopeciam.



MYRRHA cum ladano, & vino
myrteo illita firmat.

Harundinum corticum cinis ex
aceto inunctus.

Ladanium cum vino, myrrha, & myrteo oleo
admotum.

Myrti baccarum succus illitus.

Nucum iuglandium putamen combustum, tri-
tumque, & impositum.

Nucum auellandarum crematarum cinis ex
Ursino adipe perunctus.

Erinacei terrestris corij cinis ex liquida pice
illitus.

Leporinum caput crematum ex Ursino adipe.

Ranarum crematarum cinis ex liquida pice.

Murium stercus combustum ex aceto.

Ursinus

Vrsinus adeps illitus.

Caprarum finus ex aceto.

Raphanus tritus ex loliacea farina admotus.

Brassica cum sale confricata.

Beta recentia folia cruda illita.

Asphodeli radicum cinis impositus.

Capa confricata.

Allij cinis ex melle.

Sinapi illitum.

Nasturtium confricatum.

Cyclamini succus inunctus.

Ranunculi folia, & radices illita paruo temporis spatio.

Aloë ex vino.

Abrotoni cinis ex raphani succo, aut cicino oleo.

Laserpitij liquor cum pipere ex aceto.

Nymphae radix ex pice.

Cynoglossae folia ex vetere suillo adipe.

Adiantum illitum cum susino, aut myrtino oleo, aut hyssopo, aut vino.

Thapsiae succus inunctus.

Rubigo ferri illita.

Sandaracha ex resina.

Alcyonium tertium exustum inunctum.

Cortex naxia illita.

Hippocampi cremati cinis ex liquida pice, aut axungia, aut amaracino Unguento.

Caprillarū & ngularū cinis ex aceto inunctas.

n n s

Ad pi

Ad pilos auellendos.

Oleum in quo decocta fuerit scolopendra
inunctum.

Lepus marinus per se. & cum marina urtica
tritum, & appositum.

Salamandra cinis ex oleo.

Hederae lachryma illita.

Dryopteris radix trita, et post sudorem inu-
cta.

Aqua è viridibus vitium sarmentis igne in-
censis emanans admota.

Aurispigmentum illitum.

Cyperus Babylonicus illitus.

Ad capitis furfures.

Salicis foliorum, & corticis decoctum in lo-
tionibus.

Myrti baccarum succus illitus.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia inu-
ctum.

Humana Urina inueterata admota.

Adiantum in lixivio decoctum.

Fœnum gracum in lotionibus.

Malua ex Urina humana.

Beta decoctum admotum.

Allij cinis ex melle.

Bulbi cum cremato nitro illiti.

Lilij cremati radix ex melle.

Alumen cum eruo ex pice.

Ad ruffandum capillum.

Ligustri folia trita, & in radicle succo macerata illita.

Lycium illitum.

Loti ligni decoctum in lotionibus admotum.

Vini fax cremata ex lentiscino oleo tota nocte illita.

Ad denigrandos capillos.

Cupressi folia trita ex aceto.

Rhous decoctum admotum.

Mori folia trita ex aceto.

Galle aceto, aut aqua macerata illita.

Palma corticis decoctum admotum, & subinde detersum.

Myrti foliorum decoctum in lotionibus.

Acacia succus illitus.

Iigna radice cortex ex aqua coctus, donec mollitus intabescat, tota nocte illitus.

Hedera corymbi illiti.

Salvia decoctum sepius inspersum.

Rubi folia admoti.

Sory illitum.

Ad pediculos & lendes necandos.

Cedria illita.

Myrica decoctum persusum.

Melinunctum capiti.

Beta decoctum persusum.

Allium cum origani decocto potum.

Hedera

Hedera lachryma illita.

Staphis agria admota.

Sandaracha ex oleo,

Alumen ex aqua.

Ad prohibendum solis adu-
stionem.

Albumen oui inunctum.

Cyclamini succus inunctus.

Ad faciei nitorem.

Umi liquor in folliculis contentus illitus.

Mastiche illita.

Lupinorum farina illita.

Raparum sylvestrium semen admotum.

*Peponis succus cum eius semine, & farina in
sole siccatus, & inunctus.*

Polygonatum illitum.

Glans Unguentaria ex Urina.

Ricini semen impositum.

Vitis sylvestris acini illiti.

Argenti spuma elota inuncta.

Alcyonium primum, & secundum admotum.

Chia terra imposita.

Crocodili terrestris fimum illitum.

Ad colorem conciliandum.

Cicer in cibis sumptum.

Agaricum drachma pondere potum.

Hyssopum manducatum, bibitumve.

Chia terra illita.

Cerasi gummi illitum.

Car

Carica in cibis sumpta.

Ad faciem derugandam.

Cacalia grana post excussum florem prodeuntia trita, & cum cerato illita.

Bryonia radix cum eruo, creta chia, & feno graco illita.

Chia terra admota.

Ad cutis vitia in facie.

Sabina decoctum perfusum.

Conchula Indica cinis admotus.

Glans Unguentaria trita ex Urina.

Cancrorum fluuiatiliu cinis illitus.

Narcissi radix cum semine Vrtica ex aceto.

Ricini semen admotum.

Vitis sylvestris acini illiti.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua & melle illita.

Bryonia radix per se, & cum eruo, creta chia, & feno graco admota.

Alcyonium primum, et secundum impositum.

Ad ionthos & varos.

Myrrha illita cum melle, & casia.

Porri folia cum Rhoë obsoniorum loco admota.

Capæ succus cum sale appositus.

Bulbi per se, & ex oui Vitello.

Pulegium ex cera.

Sori ex aqua.

Alcyonium primum, & secundum admotū.

Ad

Ad cutis faciei vitia à sole contracta.

Iridis Illyrica radix cum helleboro admota.

Cinnamomum ex melle.

Costi radix cum aqua vel melle illita.

Amygdala amara radicum tritarum decoctum admotum.

Fici lac inunctum.

Cochlearum tum caro, tum testa simul cremata ex melle.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepie cremata cinis admotus.

Lini semen illitum.

Orobi farina imposita.

Sisymbrium inunctum.

Bulbi cremati cum Alcyonio impositi.

Hedere decocta folia ex vino.

Chamaeonis nigri radix.

Alyssum concisum ex melle.

Melia terra inuncta.

Cyclamini succus illitus.

Ad lentigines delendas.

Iridis Illyrica radix cum albo Seratro admota.

Cassia ex melle illita.

Costus ex aqua, & melle.

Sanguis leporinus calens inunctus.

Tritici farina ex aceto mulso.

Raphanus cum loliacea farina admotus.

Brassica semen inspersum.

Sisymbrium

Sesymbrium tritum, & impositum.

Allij cinis ex melle.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Bulbi ex melle, & aceto.

Nigella conficata.

Galbanum cum nitro ex aceto.

Alyssum concisum ex melle.

Narcissi radix cum Vrtica semine ex aceto.

Ricini semen illitum.

itis sylvestris acini liniti.

Bryonia radix cum eruo, fano graco, & cre-
tachia.

Adarces imposita.

Ad naeuos.

Alcyonium illitum.

Ad totius corporis nitorem.

Sastiche inspersa.

lmi liquor in folliculis conclusus illitus.

utyrum inunctum.

rocodili terrestris finum illitum.

eponis succus cum eius semine, & farina in

sole siccatus ex aqua.

ryonia radix inuncta.

clamini succus inunctus.

Ad cicatrices delendas.

fininus adeps inunctus.

barum farina cataplasmatibus indita.

ununculi folia, & radices illita.

lamintha ex vino decocta admota.

Cucume

Cucumeris Sylvestris radix trita, & in-
spersa.

Glans Unguentaria cocta in aceto cum nitro
adhibita.

Bryonia radix cum Eruo, creta chia, & fæno
græco admota.

Chrysocolla illita.

Alcyonium primum, & secundum inunctum.

Ad vitilignes.

Cochlearum terrestrium testa cremata, &
illita.

Leporinus sanguis inunctus.

Sepia cremata cinis admotus.

Fabrum farina inspersa.

Lupinorum farina imposita.

Beta cruda folia illita.

Chondrilla radix, & folia ex melle, & nitro
trita ex aqua.

Dracunculi maioris radix ex melle.

Asphodeli radice succus inunctus, confricata
prius sub sole cute.

Cape succus in sole inunctus.

Allij cinis ex melle.

Piper cum nitro impositum.

Capparis radix trita ex aceto.

Argemone siccata, tusaque cum nitro, & vi-
no sulphure admota.

Telephij folia cum hordeacea farina ex hy-
dre lao sex horis admota.

Gen

Gentiane radice succus inunctus.
Chamaeleonis nigri radix cum sulphure illita.
Ruta cum vino pipere, nitroque confricata.
Libanotis semen ex acerrimo aceto.
Lilij cremata radix ex melle.
Nymphaeae radix ex aqua.
Rubiae radix ex aceto.
Althaeae semen tum recens, tum siccum tritum
ex aceto, in sole inunctum.
Anchusae radix ex aceto.
Narcissi radix cum Urtica semine ex aceto.
Bryonia cum Eruo, creta chia, & feno gra-
eco illita.
Glans Unguentaria in aceto decocta cum ni-
tro imposta.
Cucumeris Sylvestris radix trita, & insper-
sa.
Ricini semen illitum.
Veratrum nigrum ex aceto.
Sulphur quoquo modo admotum.
Alcyonium primum, & secundum inun-
ctum.
Ad lychenas, & impetigines.
Pini, & piceae cortex illitus.
Centischi foliorum decoctum fotu adhibitum.
Supressi folia cum polenta illita.
Rhamni folia admota.
Ignorum marcor inspersus.
 Nasturtij semen admotum.

Rhaponticum ex aceto illitum.

Veratrum nigrum ex aceto illitum.

Glans Unguentaria cum lotio imposita.

*Vitis Vinifera gummi cum nitro illitum, loco
tamen prius perfricato.*

Sulphur ex terebinthina resina.

Sal ex oleo, & aceto perfrictum.

Alcyonium primum, & secundum impositum.

Adarces illita.

Pix liquida inuncta.

Thus inspersum.

Aethiopica olea lachryma inuncta.

Pruni arboris gummi illitum.

Ficulneum lac cum polenta illitum.

Mel cum alumine decoctum illitum.

Propolis inuncta.

Triticeus recens panis ex muria.

Loliacea farina cum sulphure ex vino.

Cicer cum hordeo ex melle.

Lapathi cuiusque radices in aceto decoctae, loco prius scarificato, & nitro confricato apposite.

Nasturtium ex melle appositum.

Allij cinis ex melle illitus.

Sinapi ex aceto linitum.

Chamaeleonis nigra radix ex aceto cocta, & inuncta.

Ruta cum alumine ex melle.

Lasfer

Laferpitij liquor ex aceto.

Glutinum in aceto solutum inunctum.

Cucumeris Sylvestris radix trita, & in-
spersa.

Tithymali characia lac illitum.

Bryonia radix cum Eruo, creta chia, & fæno
greco illita.

Aqua maris fotu adhibita.

Ad papulas.

Lac omne potum cum crudo melle, admixta
aqua, & exiguo sale.

Serum lactis potum.

Acetum applicatum.

Butyrum illitum.

Urina humana inueterata.

Lupinorum farina admota.

Cyclamini succus adhibitus.

Pulegij decoctum corpori perfusum.

Ruta cum cera, & myrteo oleo cataplasma-
ti indita.

Staphis agria illita.

Glans Unguentaria cum lotio linita.

Rubigo ferri illita.

Alumen cum melle.

innabaris, Id est sanguis draconis adhibi-
tus.

ornacea testa tosta admota.

Ad alphos, & cutis maculas.

happia succus cum melle illitus.

• • 2.

Glans

Glans Unguentaria cum lotio linita.

Narcissi radix cum semine Vrticæ ex aceto.

Lotus sylvestris cum melle perunctus.

Cucumeris sylvestris pulverizata radix imposita.

Ricini semen illitum,

Vitis sylvestris acini liniti.

Bryonia cum eruo, creta chia, & fæno graco illita.

Ad psoram.

Staphis agria trita ex oleo illita.

Bryoniæ semen inunctum.

Aqua marina fotu adhibita.

Glans Unguentaria in aceto cocta.

Sal illitum.

Ad scabiem.

Cardamomum ex aceto illitum.

Olea Virentis, & accensa sudor manans illitus.

Ficulneum lac inunctum.

Erinacei marini testa cruda, tostâve cum alijs mista, & illita.

Hippocampi marini cremati cinis liquida pice, axungiave, aut amaracino Unguento coactus, & capiti inunctus.

Urina humana inueterata.

Serum lactis potum.

Cicer cum hordeo, & melle.

Lupinorum farina.

Argemo

Argemone siccata, tusaque cum nitro in balneo confricata.

Hirundinaria minor confricata.

Chamaleonis nigri radix addito exiguo atramento sutorio, cedrinoque liquore, & axungia pauco linita. Quin etiam sulphure, & alumine mistis.

Glans Unguentaria cum lotio linita.

Origani decoctum corpori persusum.

Quinquefolij radix decocta, linitaque.

Potamogeton Valet pruritui imposita.

Lotus sylvestris cum melle peruncta.

Veratrum nigrum linitum cum cera, pice, & cedrino oleo.

Stimmi cum cera, & exigua cerussa.

Alumen cum aqua aspersum aduersus pruritum.

Ad lepram graecorum.

Fel taurinum cum nitro, & cimolia.

Vrina humana addito nitro fota.

Iuniperi cortex crematus ex aqua.

Fraxini cortex crematus ex aqua.

Vlmi filia concisa ex aceto.

Aethiopica olea lachryma illita.

Resina Terebinthina cum erugine, chalcantio, & nitro illita.

Resina Larigna cum erugine, chalcantio, & nitro illita.

Resina Abiegna cum erugine, chalcantio, & nitro illita.

Ficulneum lac cum polenta.

Triticei surfures ex acerrimo aceto elixi.

*Hordei farina ex aceto acerrimo, & hydre-
leo.*

Lolij farina cum sulphure ex vino, & aceto.

*Lapathi cuiusque radices, loco prius scarifica-
to, & nitro conficato admota.*

Brassica concisa cum polenta adhibita.

Veratrum nitrum ex aceto.

Allij cinis ex melle.

Sinapi ex aceto.

Bryonia semen illitum.

Nasturtium ex melle.

Anchuse radix ex aceto.

Ranunculi folia, & radices apposita.

Melanthij semen admotum.

Cucumeris agrestis radix in puluerē aspersa.

Glans & nguentaria cocta in aceto cum nitro.

Thapsie succus inunctus.

Scammonta in aceto decocta illita.

*Vitis vinifera gummi admotum, loco tamen
prius nitro perfricto.*

Aerugo cum nitro ex terebinthina resina.

Alumen cum brassica, & melle coctum.

Sulphur ex resina terebinthina, & aceto.

Sal ex oleo, & aceto feruefactum.

Alcyonium primum & secundum illitum.

Adarces imposita.

Melia terra illita.

Ad

Ad pruritus.

*Ficuli*neum lac admotum cum polenta.

Su'phur ex nitro.

Sal ex oleo, & aceto perfrictum.

Alumen cum aqua aspersum.

Ad elephantiasim.

Erinacei terrestris exiccatum corpus in cibis sumptum.

Cedria inuncta.

Coehlearum terrestrium cinis illitus.

Salamandra alijs conferentibus medicamentis admixta.

Serum lactis potum.

Fel caprae sylvestris inunctum.

Fel hircinum inunctum.

Calamintha in cibis sero lactis superposito.

Ad clauos, callos & verrucas.

Salicis corticis cinis admisto aceto maceratus illitus.

Smariatis piscis saliti crematum caput.

Lacerta concisum caput.

Ouillum finium ex aceto.

Mel cum alumine decoctum.

Cicerum grana tot accipe, quot sunt porri, & singulis granis singulas tange verrucas, deinde liga grana cicerum in linteolo, & post tergum projice, & hoc non fiat nisi nona luna.

Heliotropij semen linitum.

oo 4 Scilla

Scylla cremata peruncta.

Ranunculi folia, & radices.

Dipsaci radix in vino decocta, tusa, & im-
posita.

Nigella ex Vetere Urina imposita, loco prius
scarificato.

Laserpitij liquor cera premollitus impositus,
scarificatione prius facta.

Clinopodium diebus aliquot potum,

Chamaesyces rami triti, & impositi.

Vitis sarmentorum Viridiū incensorum ema-
nans aqua.

Aerugo imposita.

Ad acrochordonas, & thymos &
myrmecias.

Mali punici Vinum adhibitum.

Lac ficulneum cum adipe circa adiacentem
carnem illitum.

Thus ex aceto, & pice illitum.

Ruta cum pipere, vino, & nitro affricata.

Cicer cum hordeo, & melle.

Ranunculi folia, & radices.

Dipsaci radix trita in vino decocta.

Tithymali characie succus, & lac illitum.

Chamaesyces rami triti, & impositi.

Heliotropij semen linitum. Quin & heliotro-
pium minus.

Vitium Viniferarum sarmentorum Viridium
incensorum emanans aqua illita.

Sal

Sal cum seuo Vitulino illitum.

Ad alarum tædia.

Myrrha cum liquido alumine illita.

Myrti foliorum arentium farina inspersa.

Cardui radix cataplasmatibus more adhibita.

Alumen linitum.

Ad labiorum rimas.

Adeps Anserinus illitus.

Adeps Gallinaceus illitus.

Lycium admo:um.

Ad sudorem ciendum.

Ferula semen ex oleo inunctum.

Onobrychis ex oleo inuncta.

Mel Heraclium quodam anni tempore deuoratum.

Fici matura comesta.

Sinapi in cibum sumptum.

Ad sudorem compescendum.

Bulbi comesti.

Sulphur confricatum.

Gypsum admotum.

Morochthus lapis admotus.

Samia terra admotæ.

Ad exterendam cutim.

Cyclamini radix inuncta.

Ad extrahendum ex alto.

Mel appositum.

Sinapi appositum.

oo s SIM



SIMPLICIVM

MEDICAMENTO-

RVM VIREs, QVIBVS

exuberantes in corpore humores vomitus
& alui deiectione excernuntur, ex Dio-
scoride.

EXPELLENTIVM MEDI- CAMENTORVM.

Ad bilem educendam.

RIS Illyrica drachmarum se-
pte pondere ex hydromelite pota.
Thlassi semen potum.
Aloe hausta.

Absinthium potui datum.

Tragorigani decoctum bibitum.

Lychnidis Sylvestris semen drachmarum dua-
rum pondere potum.

Androsami semen duarum drachmarum pon-
dere haustum.

Veratrum nigrum per se datum, aut ex Scama-
monia cum salis drachma.

Pycnocomi radix duarum drachmarum pon-
dere ex aqua mulsa.

Centaurium minus decoctum deuoratum.

Part

Partheniū siccātū cum aceto mulsō, aut sale.

Thapsia lacteā succus in aqua mulsā potus.

Clematidis alterius semen tritum potum.

Sesamoides tritum datum.

Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex
sesquioboli pondere bibitus.

Hippopha succus oboli pondere potus.

Ricini triginta grana purgata trita hausta.

Tithymalorum omnium succus binis obolis in
posca potus.

Mercurialis ius potum.

Lathyris grana sex aut septem cum ficis aut
palmulis in catapotio deuorata.

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

Scammonij succus drachma vnius, aut qua-
ternum obolorū pondere haustus ex aqua
mulsā, vel pura.

Chamelae folia in catapotijs deuorata cum
duabus absinthij partibus adiecta chame-
lea vna cum hydromelite.

Thymelae viginti granorum pars interna
bibita.

Folia sambuci olerum more cocta.

Folia ebuli olerum more cocta.

Apios scilicet inferior pars deuorata.

Empetrū in iure aliquo aut hydromelice potiū

Filicula arida farina aqua mulsā inpersa bi

Cynocrambe decoctum haustum. (bita.)

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

Agarici

Agarici drachma Una vel altera cum mulsâ
bibita.

Pityusæ radix drachmarum duarum ponde-
re cum mulsâ hausta, seminis vero drach-
ma, & succi cum farina subacti cochleariū
in catapotio.

Ad pituitam eiiciendam.

Iris Illyrica drachmarum septem pondere ex
hydromelite.

Mandragora succus duorum obolorum pon-
dere potus.

Veratrum nigrum per se datum, vel cum
scammonia cum salis drachma.

Lycij Indici semē cyathi dimidiū mēsurā potū.
Ulmī crassior cortex in vino, aut aqua frigida
Vnciatim potus.

Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis
modo paratum, haustum.

Cyclamini radix ex hydromelite pota.

Scilla cum melle cocta pota.

Hyssopi decoctū ex aqua, melle, & ruta potū.

Thymum cum sale, & aceto haustum.

Sphondilij semen potum.

Ammoniacum drachma pondere bibitum.

Daphnoides folium recens, vel aridum potū.

Hippophæsti succus trium obolorum pondere
ebibitus.

Epithymum potum cum melle.

Bryonia succus cum aqua mulsâ.

Cnici

*Enicifemini succus cum mulso, vel iure gal-
linaceo.*

Magnes trium obolorum pondere cum mulsa.

Centaurij minoris decoctum deuoratum.

*Parthenium siccatum cum aceto mulso, aut
sale potum.*

Clematidis alterius semen tritum, potum.

Sesamoides tritum datum.

*Cucumeris sylvestris radicis succus, & cortex
sesquioboli pondere bibitus.*

Hippophaïs succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta trita epota.

*Tithymalorum omnium succus binis obolis in
posca potus.*

*Lathyrus grana sex, aut septem in catapotio
cum ficis, aut palmulis deuorata.*

Peplus in hydromelitis cyatho potus.

*Scammonij succu drachma vnius, aut qua-
ternum obolorum pondere haustus ex aqua
pura vel mulsa.*

*Chamelæ folia in catapotijs deuorata cum
duabus absinthij partibus, adiecta chame-
læ vna cum hydromelite.*

*Thymelæa viginti granorum pars interior
bibita.*

Folia sambuci olerum more cocta.

Folia ebuli olerum more cocta.

Apij inferior pars deuorata.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite.

Fi.

*Filicula arida farina aqua mulsa inspersa
hausta.*

Cynocramba decoctum bibitum.

Heliotropij decoctum ex aqua potum.

*Agarici drachma vna, aut altera cū mulsa
bibita.*

*Pityusæ radix drachmarum duarum pondere
cum mulsa, & seminis drachma, succi Ve
ro cum farina subacti cochlearium in cata
potio exhibita.*

Ad atram bilem pellendam.

*Mandragora succus potius duorum obolorum
pondere ex mulso.*

*Gallinaceorum senescentium ius Dioscoridis
modo paratum haustum.*

Epithymum ex melle haustum.

Serum lactis potum.

*Origanum siccum acetabuli mensura potum
ex mulsa.*

Pulegium bibitum.

Helleborum nigrum haustum.

Spartium epotum.

*Alypum mensura epithymo pari cum sale, &
aceto sumptum.*

Ad vomitum ciendum.

Th'aspi potum bilem rubeam educit.

Mandragora pota atram bilem.

Thapsia lacteus succus in mulsa bibitus.

Tithyma

Tithymalorum succus cum aqua mulsa binis obolis potus.

Apij superior pars deuorata.

Spartij flores, & semina in mulsa pota.

Anagryis semen commanducatum.

Betonica radices ex hydromelite pota, pituitam eijciunt.

Papaueris spumei semen in mulsa acetabuli mensura potum.

Staphidis agrie grana quindecim in mulsa data.

Silybi radices drachma pota.

Glans Unguentaria cum hydromelite.

Narcissi radix cocta, est, seu bibita.

Ricini grana triginta hausta.

Raphani cortex ex aceto m'iso potus.

Tithymalorum omnium succus potus.

Aes & stum cum hydromelite bibitum.

Ad aquam intercutem pellendam.

Cyclamini radix ex hydromelite hausta.

Polij decoctum bibitum.

Hippophastris succus trium obolorum pondere potus.

Hippophastris succus oboli pondere potus.

Ricini grana triginta pota.

Lathyrus cuiusq; grana sex, aut septem in catapotio cum ficis, aut palmulis deuorata.

Samē

Sambuci folia olerum more cocta.

Ebuli folia olerum more cocta.

Empetrum in iure aliquo, aut hydromelite haustum.

Cynocrambe decoctum potum.

Asarum bibitum.

Lactuce sylvestris succus in aceto mulso potus.

Trifolij radix drachmarum duarum pondere in vino bibita.

Tithymalorum succus bibitus.

Thymelae viginti granorum pondere pars interna bibita.

Vitis sylvestris radix feruesfacta in aqua in cyathis duobus vini aqua marina diluti, pota.

Squamma aris ex aqua mulsa hausta,

Mercurialis decoctus ius potum.

Ad aluum emolliendam.

Cerasia recentia manducata.

Pruna in cibis sumpta.

Silique deuorata.

Fici matura deglutita.

Lac ficulneum potum.

Chamarum piscium ius potum.

Vnguis odoratus ebibitus.

Raphanus comestus.

Beta alba deuorata.

Blitum comestum.

Rumi

Rumicis cuiusque decoctum potum. Quin & ipsa herba decocta deuorata.

Malua in cibo sumpta.

Atriplex manducatum.

Brassica leniter feruesfacta comesta.

Lentis decorticata decoctum primum haustum.

Asparagorum cauliculi in cibum accepti.

Cucurbita integra feruesfacta expressus succus potus.

Gingiber quoquo modo sumptum.

Peucedanum potum.

Scilla sicca cochlear vnum, aut alterum ianis datum.

Androseni semen tritum potum.

Helxines foliorum succus haustus.

Papaueris erratici semina acetabuli pondere ex malsa aqua pota.

Cynoglossi decoctum haustum.

Chamaesices rami decocti, & in cibum sumpti.

Bryonia cauliculi recentes cocti, & in cibum deuorati.

pp

FINIS.



MENSVRARVM ET PONDERVM

TYPI, AD DIOSCO-
ridis mentem, Ex
Galeno.

De Ponderum ratione.

Siliqua pendet Chalcum Vnum.
Aegyptia faba Chalcum Vnum & semis.
Orobis Chalcos duos.
Obolus Chalcos tres.
Scrupulus Obolos duos.
Drachma Scrupulos tres.
Vncia Drachmas octo.
Acetabulum Drachmas quindecim.
Nux Regia Vncias septem.
Nux Pontica Vnciam Vnam.
Libra Vncias duodecim.
Mina Medicorum Vncias sexdecim.
Mina Italica Vncias decem & octo.
Mina Alexandrina Vncias viginti.

Arta

Artaba Aegyptia continet Modios quinque.

Modius Aegyptius & Italicus Chænicas octo.

Medimnus Hemiecta duodecim.

Hemiectum. i. semifextum Congios duos.

Congius Chænicas quatuor, id est drachmas

720

Chænix Heminas 3. Atticas. i. drach. 180

Sextarius Heminas duas. i. drachmas. 120

Hemina Cyathos sex, id est drachm. 60

Cheme Cyathi quartam partem, id est drachmas 2. & 1

Cochlear Scrupulos tres.

pp 2 PON

PONDERVM ET MEN-
SVRARVM LIQVIDO-
rum ratio.

De Mensuris Vini, Aceti, & Aquæ.

Ceranium lib. 80
Amphora lib. 80.
Vrna lib. 40
Congius lib. 10
Sextarius lib. 1. & Œ uncias 8
Hemina Œ uncias 10
Cotyla Œ unc. 10
Oxybaphus drach. 18
Acetabulum drach. 18
Cyathus drach. 12. & scrupulos 4
Cheme drach. 3. & scrup. 1

De Mensuris Olei.

Ceranium lib. 72
Amphora lib. 72
Vrna lib. 36
Congius lib. 9
Sextarius lib. 1
Hemina Œ uncias. 9
Cotyla Œ uncias 9
Acetabulum drachmas 18
Oxybaphus drach. 18

Cya

Cyathus drach. 18

Cheme drach. 3

De Mensuris Mellis.

Ceramium lib. 120

Amphora lib. 120

Vrna lib. 60

Congius lib. 15

Sextarius lib. 2

Hemina lib. 1

Cotyla lib. 1


Acetabulum drach. 27

Oxybaphus drach. 27

Cyathus drach. 20

Cheme drach 5

pp 3



INDEX SIM- PLICIVM QVÆ

IN HAC PLANTA-
rum historia conti-
nentur.

A

A Bies.	37	Aconitum quartum.	
Abiga.	431	518	
Abrotonum fœmina.		Acorum.	8
288		Acorum falsum.	9
Abrotonum mas.	287	Acus muscata.	383
Absynthium.	285	Acuta spina.	64
Absynthium marinū.		Acutella.	278
286		Adianton.	580
Acacia.	77	Aegilops.	583
Acantha.	277	Aethiopsis.	557
Acanthus.	277	Agaricum.	264
Acetabulum.	535	Ageratum.	426
Achillea fideritis.	471	Agnus castus.	78
Aconitum Cynocto-		Agria, siue aria.	63
num.	516	Agria Palma.	540
Aconitum Pardalian		Agrifolium.	63
ches.	515	Agrimonia.	475
Aconitum Pardalian		Agrimonia sylvestris.	
ches falsum.	519	477	
Aconitum tertium.	517	Aiuga.	431

PP 4 Al

INDEX.

<i>Alba spina.</i>	279	<i>Anagyris.</i>	423
<i>Alcea.</i>	421	<i>Anagyris minor.</i>	424
<i>Alchimilla.</i>	571	<i>Anarrhinon.</i>	579
<i>Alcibiadion.</i>	462	<i>Anchusa.</i>	461
<i>Alcibium.</i>	464	<i>Anchusa altera.</i>	462
<i>Alisma.</i>	426	<i>Anchusa tertia seu</i>	
<i>Alkakengi.</i>	507	<i>parua.</i>	463
<i>Alleluja.</i>	371	<i>Androsaces.</i>	405
<i>Alliaria.</i>	377	<i>Androsamon.</i>	429
<i>Alliaria.</i>	377	<i>Anemone.</i>	249
<i>Allium.</i>	216	<i>Anemone altera.</i>	250
<i>Aloë.</i>	283	<i>Anethum.</i>	326
<i>Alfina.</i>	530	<i>Anethū tortuosum.</i>	10
<i>Altercum.</i>	504	<i>Angelica.</i>	568
<i>Althaa.</i>	420	<i>Anguria.</i>	193
<i>Alypia.</i>	622	<i>Anisum.</i>	324
<i>Alypum.</i>	622	<i>Anonis.</i>	278
<i>Amaracus.</i>	312	<i>Anthemis.</i>	409
<i>Amaranthū croceum.</i>		<i>Anthirrinon.</i>	579
493		<i>Antimelus.</i>	512
<i>Amaranthum purpu-</i>		<i>Aparine.</i>	353
<i>reum.</i>	494	<i>Aphaca Aphace.</i>	211
<i>Ambrosia.</i>	380	<i>Apiastrum.</i>	245. 63
<i>Ambubeia.</i>	185	364	
<i>Ammi.</i>	329	<i>Apios.</i>	618
<i>Amygdala.</i>	113	<i>Apium hortense.</i>	333
<i>Anagallis femina.</i>		<i>Apium palustre.</i>	334
253		<i>Apium risus.</i>	245
<i>Anagallis mas.</i>	252	<i>Apocynum.</i>	524
		<i>Apollis</i>	

INDEX.

<i>Apollinaris.</i>	504	<i>Atriplex.</i>	157
<i>Aquilegia.</i>	259	<i>Atriplex marinus.</i>	
<i>Aquilina.</i>	259	62. 63 160	
<i>Arabis.</i>	224	<i>Atriplex sylvestris.</i>	
<i>Arbutus.</i>	112	158	
<i>Arisarū primū.</i>	237	<i>Avena.</i>	127
<i>Arisarum secundum.</i>	238	<i>Aurantia mala.</i>	103
<i>Aristolochia lōga.</i>	268	<i>Auricula muris.</i>	260
<i>Aristolochia rotunda.</i>	267		
<i>Artemisia.</i>	379	<i>Baccharis.</i>	313
<i>Arthetica.</i>	554	<i>Ballotte.</i>	363
<i>Arthritica.</i>	554	<i>Balsamina.</i>	384. 626
<i>Arum.</i>	236	<i>Baptifecula.</i>	186
<i>Arundo.</i>	54	<i>Bardana.</i>	558
<i>Asarum.</i>	17	<i>Behen rubrum.</i>	455
<i>Ascyrydes, Hyperici</i>		<i>Bellis.</i>	413
<i>species.</i>	428	<i>Belluis.</i>	413
<i>Ascyrum.</i>	428	<i>Berberis vulgaris.</i>	65
<i>Asparagus.</i>	168	<i>Beta sylvestris.</i>	455
<i>Aspergula.</i>	353	<i>Beta candida.</i>	166
<i>Asperula.</i>	353	<i>Beta nigra.</i>	165
<i>Asphodelus.</i>	239	<i>Betonica.</i>	433
<i>Aster Atticus.</i>	570	<i>Betula.</i>	52
<i>Astragalus.</i>	498	<i>Bipennula.</i>	487
<i>Astrentia.</i>	337	<i>Bislingua.</i>	578
<i>Athanasia.</i>	411	<i>Bismalua.</i>	421
<i>Atragera.</i>	623	<i>Bistorta.</i>	434
		<i>Blattaria.</i>	556

pp 5 Bli

INDEX.

Blitum.	154	nis & fus.	306
Bombasum.	385	Calamintha monta-	
Bombax.	385	na.	305
Bonifacia.	578	Calamintha altera.	
Borrage.	574	306.307	
Botrys.	381	Calamus odoratus.	23
Braccha Cuculi.	554	Calendula.	638
Branca Vrsina.	277	Calix.	461
Brassica Canina.		Callitrychon.	581
524. & 635		Caltha.	495. & 638
Brassicacapitata.	163	Calthula.	638
Brassica crispa.	162	Cammoron.	515
Brassica marina.	164	Camomilla.	409
Brassica sylvestris.		Campanella.	587
153		Candela Regis.	552
Britannica.	434	Candelaria.	552
Bryonia.	624	Cannabis.	422
Bubonium.	570	Cantabrica.	226
Buglossum.	569	Cantabrica altera.	227
Buglossum sylvestre.		Capillus Veneris.	580
464		Capparis.	241
Buglossum verū.	574	Capsella.	222
Buglossū vulgare.	575	Caprifolium.	441
Bulbus agrestis.	527	Caput Monachi.	185
Buphthalmum.	412.	Cardamina.	173
& 495		Cardiaca.	540
Bursa pastoris.	223	Cardo Fullonū.	274
C		Cardopatium.	272
Calamentum communis		Carduus benedictus.	
	354	Car	

INDEX.

<i>Carduus niger</i> , aut	<i>Chamaleon albus</i> . 272
<i>Sernilagium</i> . 273	<i>Chamaleō niger</i> . 273
<i>Carduus Suarius</i> , aut	<i>Chamamelum</i> . 409
<i>Viarius</i> . 272	<i>Chamapytis</i> . 431
<i>Carduus Veneris</i> . 274	<i>Chamapytis altera</i> .
<i>Carex</i> . 459	432
<i>Cariophyllata</i> . 457	<i>Charefolium</i> . 198
<i>Carota</i> , 320	<i>Chamelea</i> . 614
<i>Carthamus</i> . 632	<i>Chelidonium maius</i> .
<i>Carum</i> . 325	257. 259
<i>Cassia solutina</i> . 20	<i>Chelidoniū minus</i> . 258
<i>Cassutha</i> , <i>Cassyta</i> . 621	<i>Chōdrilla prima</i> . 188
<i>Castanea</i> . 86	<i>Chōdrilla altera</i> . 189
<i>Cataputia maior</i> . 604	<i>Chrysanthemū</i> . 495
<i>Cataputia minor</i> . 612	<i>Cicer</i> . 136
<i>Caucalis</i> . 209	<i>Cicerbita</i> . 179
<i>Cauda equina</i> . 484	<i>Cichorium</i> . 183
<i>Cedrus Phœnicia</i> . 43	<i>Cichoriū sativū</i> . 184
<i>Celtis</i> . 107	<i>Cicuta</i> . 522
<i>Centauriū maius</i> . 270	<i>Cicutaria</i> . 567
<i>Centauriū minus</i> . 271	<i>Circea</i> . 512
<i>Centinodia</i> . 438	<i>Cirsium</i> . 569
<i>Centum capita</i> . 281	<i>Cistus mas</i> . 71
<i>Centum morbia</i> . 474	<i>Cistus fœmina</i> . 72
<i>Cepa</i> . 215	<i>Citrage</i> . 364
<i>Cepœa</i> . 425	<i>Citromala</i> . 101
<i>Cerasia</i> . 95	<i>Clematis</i> . 441
<i>Cervi ocellus</i> . 338	<i>Clematis altera</i> Dio-
<i>Chamadaphne</i> . 593	<i>scorid</i> . 442
	<i>Elin</i>

INDEX.

Clinopodium.	355	Coronopus.	177
Clinopodium alterū.	356	Coronopus sylvestris.	178
Cnecus.	632	Corrigiola.	438
Cnicum sylvestre.	354	Costus adulterinus.	21
Cnicus.	632	Cotonea malus.	98
Coccum infectorium.	485	Cotum.	385
Coccus Baphica.	485	Cottonaria.	385
Colchicum ephemerū.	527	Cotyledum alterum.	
	527	Crassula minor.	263
Colocasia.	138	Cresspinus.	65
Colocynthis.	619	Crista marina.	176
Colutea.	342	Crithamum.	175
Coniza maior.	388	Crithmum.	175.176
Coniza minor.	389	Crocodilium.	282
Coniza media.	390	Crocū sine Crocus.	25
Coniza mascula.	388	Crocus hortensis.	632
Coniza femina.	389	Crocus Sarracenicus.	
Consiligo Matthioli.	632		
	596	Croton.	604
Consolida minor.	446	Cruciata.	266
Consolida media.	447	Cucumer sativus.	192
Convolvulus minor.	445	Cucumer sylvestris,	
	445	anguinus, erraticus,	
Corallina.	545	sen Asininus.	598
Coriandrum.	330	Cucurbita.	190
Coris.	430	Cucurbita sylvestris.	
Cornus.	108		619

Cucur

INDEX.

<i>Cucurbita Indiana</i> 327	<i>Dens Caninus.</i> 185
<i>peregrina.</i> 191	<i>Dens Leonis.</i> 185
<i>Cuminum sativum.</i> 327	<i>Diapensia.</i> 479
<i>Cuminum sylvestre.</i> 328	<i>Dictamnus albus.</i> 48
<i>Cunila.</i> 292.310	<i>Dictamnus.</i> 297
<i>Cupressus.</i> 40	<i>Digitus Citrini.</i> 399
<i>Cuscuta.</i> 621	<i>Dionysius.</i> 429
<i>Cyanus maior.</i> 186	<i>Dipsacus.</i> 274
<i>Cyanus minor.</i> 187	<i>Dorcas.</i> 464
<i>Cyclamen.</i> 231	<i>Draba.</i> 224
<i>Cyclaminus.</i> 231	<i>Dracunculus aceta-</i>
<i>Cymbalum.</i> 536	<i>riarum.</i> 234
<i>Cynocrambe.</i> 524. 32	<i>Dracunculus horten-</i>
	<i>sis.</i> 234
	<i>Dracunculus maior.</i>
<i>Cynoglossum verum.</i> 576	232
<i>Cynoglossum vulgare.</i> 577	<i>Dracunculus minor.</i>
<i>Cynomorum.</i> 524	233
<i>Cyperus.</i> 11	<i>Dryopteris.</i> 631
	<i>Dulcis radix.</i> 269
	<i>Dyrila.</i> 455

D

<i>Damaconium.</i> 426	<i>Ebiscus.</i> 420
<i>Daphnoides.</i> 592	<i>Ebulus.</i> 617
<i>Daucum.</i> 340	<i>Echinos.</i> 466
<i>Daucus sylvestris.</i> 200	<i>Echium.</i> 464
	<i>Elaphoboscum.</i> 338
	<i>Eleo</i>

E

INDEX.

<i>Eleoselinum.</i>	334	<i>Euphrasia.</i>	481
<i>Elleborine.</i>	560	<i>Euphrasia.</i>	481
<i>Elleborus albus.</i>	594		
<i>Elleborus niger.</i>	596		
<i>Endivia.</i>	181		
<i>Enula campana.</i>	26	<i>Faba.</i>	137
<i>Ephemerum.</i>	528	<i>Faba Aegyptia.</i>	138
<i>Epipactis.</i>	560	<i>Fabacraffa.</i>	263
<i>Epithymum.</i>	620	<i>Faba inuersa.</i>	263
<i>Equisetum.</i>	484	<i>Faba Suilla.</i>	504
<i>Erica.</i>	56	<i>Fabaria.</i>	263
<i>Erica altera.</i>	57	<i>Fagus.</i>	83
<i>Eruca.</i>	201	<i>Farfaria.</i>	378
<i>Eruca syluestris.</i>	202	<i>Febrifuga.</i>	271
<i>Erui angina.</i>	205	<i>Fel terra.</i>	271
<i>Eruum.</i>	141	<i>Ferula.</i>	347
<i>Eryngium , Erynge.</i>		<i>Ferraria.</i>	542
	281	<i>Festuca.</i>	583
<i>Eryngium marinum.</i>		<i>Ficaria.</i>	542
	282	<i>Ficus arbor.</i>	121
<i>Erysimum.</i>	225	<i>Ficus Aegyptia.</i>	120
<i>Esula maior.</i>	611	<i>Ficus Indica.</i>	284
<i>Esula rotunda.</i>	613	<i>Filicula.</i>	629
<i>Eupatorium Auicen-</i>		<i>Filipendula.</i>	387
<i>na.</i>	476	<i>Felix mas.</i>	627
<i>Eupaterium Graco-</i>		<i>Felix faemina.</i>	628
<i>rum.</i>	475	<i>Felix Quercus.</i>	631
<i>Eupatorium officina-</i>		<i>Flammula.</i>	443
<i>rum.</i>	476	<i>Flos frumenti.</i>	186
		<i>Flus</i>	

INDEX.

<i>Haflula Regia.</i>	239	<i>Herba pulicaris.</i>	505
<i>Hedera arborea.</i>	256	<i>Herba Roberti.</i>	383
<i>Hedera ciliffa.</i>	586	<i>Herba sancti Ioannis.</i>	
<i>Hedera Helix.</i>	255		401
<i>Hedera spinofa.</i>	586	<i>Herba Sardonia, aut</i>	
<i>Hedysarum.</i>	402	<i>Sardoa</i>	245
<i>Helenium.</i>	26	<i>Herba Trinitatis.</i>	573
<i>Helichryfum.</i>	493	<i>Herba Viduifica.</i>	614
<i>Heliotropium maius.</i>		<i>Hermodaetylus Ani-</i>	
	636	<i>cenna.</i>	399
<i>Heliotropium minus.</i>		<i>Hermodaetylus falso.</i>	
	637		527
<i>Helxine.</i>	529	<i>Hieraciũ maius.</i>	331
<i>Helxine ciffampelos.</i>		<i>Hieracium paruum.</i>	
	473		332
<i>Hemerocallis.</i>	391.392	<i>Hinnulus.</i>	588
<i>Hemionitis.</i>	407	<i>Hippogloffum.</i>	578
<i>Hemionium.</i>	406	<i>Hippolapathum.</i>	150
<i>Hepatica.</i>	490	<i>Hippofelinum.</i>	335
<i>Hepatorium.</i>	475	<i>Hirci barbula.</i>	206
<i>Herba benedicta.</i>	457	<i>Hiffopum, ſeu Hiffo-</i>	
<i>Herba Cattorum.</i>	308	<i>pus.</i>	289
<i>Herba diuæ Mariæ.</i>		<i>Hordeum.</i>	125
	304	<i>Hordeum murinum.</i>	
<i>Herba Iudaica.</i>	141		482
<i>Herba paralyſis.</i>	554	<i>Horminum falſum.</i>	
<i>Herba Paris.</i>	519		401
<i>Herba pedicularis.</i>		<i>Horminum ſatiuum.</i>	
	529		400

Hya

INDEX.

<i>Hyacinthus.</i>	499	<i>Ischas.</i>	618
<i>Hydropiper.</i>	228	<i>Iua muschata.</i>	374
<i>Hydropiperis secunda</i>		<i>Iuncus.</i>	489
<i>species.</i>	476	<i>Iuncus odoratus.</i>	22
<i>Hysciamus.</i>	504	<i>Iuniperus.</i>	41
<i>Hypecoium.</i>	410.	<i>Ixia.</i>	272
<i>Hypericum.</i>	427		
<i>Hypocistis.</i>	73		

K

I

Kali.

161

L

<i>Iacea.</i>	573		
<i>Iberis.</i>	123		
<i>Ibiza.</i>	431	<i>Labrum Veneris.</i>	274
<i>Ibiscus.</i>	420	<i>Lactaria.</i>	279
<i>Ilex.</i>	84	<i>Lactaria herba.</i>	605
<i>Illecebra.</i>	263.534	<i>Lactuca Caprina.</i>	607
<i>Imperatoria.</i>	337	<i>Lactuca crissa.</i>	195
<i>Inguinalis.</i>	570	<i>Lactuca florida.</i>	196
<i>Intubus sativus.</i>	181.	<i>Lactuca marina.</i>	607
	182.	<i>Lactuca Sylvestris.</i>	
<i>Intybus sylvestris.</i>	183		197
<i>Irio.</i>	225	<i>Lactucella.</i>	179
<i>Iris.</i>	5	<i>Lampsana.</i>	153
<i>Iris sylvestris.</i>	6.528	<i>Lanaria.</i>	552
<i>Iris sylvestris alte-</i>		<i>Lapathum.</i>	149
<i>ra.</i>	7	<i>Lappa inuersa.</i>	582
<i>Isatis sativa.</i>	261	<i>Lappa maior.</i>	558
<i>Isatis sylvestris.</i>	262	<i>Lappa minor.</i>	582
	99	<i>La</i>	

INDEX.

Larix.	36	Lilium.	361
Lassulata.	304	Lilium conuallium.	
Lathyrus.	612	393	
Lauendula.	15	Lilium inter spinas.	
Lauer.	171	441	
Laureola.	592	Lilium Punicum.	362
Laureolamas.	593	Lilium Sylvestre.	
Laurus.	45	391	
Laurus Alexandri-		Limonium.	455
na.	590-591	Limonium alterum.	
Laurus Idæa.	590	456	
Ledum.	74	Linaria.	585
Lens.	139	Lingua Bovis.	574
Lens palustris.	531	Lingua Canis.	577
Lenticularia.	531	Lingua Cervina.	367
Lentiscus.	38	Lingua Equina.	578
Leo terra.	614. 615	Lingua Pagana.	578
Leontopetalum.	357	Lingua serpentina.	235
Lepidium.	123	Linum.	135
Lepidium Dioscori.		Liquiritia.	269
dis.	242	Lithospermum maius.	
Lepidium Pauli Aegi	415		
neta, & Plinij.	243	Lithospermum minus.	
Leuconium.	394	416	
Leuisticum.	335	Lolium.	133
Libysticum.	317	Lolium murinū.	482
Lichen.	490	Lonchitis altera.	419
Ligusticum.	317	Lotus.	107
Ligustrum.	68	Lotus Sylvestris.	564
		Lotus	

INDEX.

<i>Lotus Urbana.</i>	563	<i>Malua arborea.</i>	156
<i>Lunaria minor.</i>	408	<i>Malum Punicum.</i>	91
<i>Lunaria minoris spec-</i>		<i>Malus.</i>	97
<i>cies.</i>	474	<i>Mandragoras femi-</i>	
<i>Luparia.</i>	516. 517.	<i>na.</i>	513
	518	<i>Mandragoras mas. fe-</i>	
<i>Lupinus sativus.</i>	142	<i>ue candidus.</i>	512
<i>Lupulus.</i>	588	<i>Mandragoras niger.</i>	
<i>Lupus reptitius.</i>	588		513
<i>Lup^o salictarius.</i>	588	<i>Marmoraria.</i>	277
<i>Lycium.</i>	76	<i>Marrubiastrum.</i>	363
<i>Lychnis coronaria.</i>		<i>Marrubium album.</i>	
	360		365
<i>Lychnis sylvestris.</i>		<i>Marrubium nigrum;</i>	
	579	<i>aut fetidum.</i>	363
<i>Lycoteron.</i>	516	<i>Martagon.</i>	362
<i>Lysimachia.</i>	436	<i>Marum.</i>	312
<i>Lysimachia secunda.</i>		<i>Matricaria.</i>	410
	437	<i>Matrisalvia.</i>	402
		<i>Matrissylva.</i>	441
		<i>Medica mala.</i>	101
		<i>Melanthium sativum.</i>	
			349
<i>Macheronion.</i>	458	<i>Melanthium sylve-</i>	
<i>Maiorana.</i>	312	<i>stre.</i>	350
<i>Mala Armeniaca.</i>	100	<i>Melanthium falsum.</i>	351
<i>Mala Citria.</i>	101	<i>Melilotus.</i>	563
<i>Mala insana.</i>	514	<i>Melissa.</i>	364
<i>Mala Limonia.</i>	102	<i>Melones.</i>	124
<i>Malua.</i>	155		
		99 2	Me

INDEX.

<i>Memecylus.</i>	112	<i>Morsus Diaboli.</i>	254
<i>Mentha.</i>	301.302	<i>Morsus Gallinae.</i>	252
<i>Mentha Græca.</i>	304	<i>Morus arbor.</i>	119
<i>Mentha matronalis.</i>	304	<i>Murina spina.</i>	589
		<i>Muscus.</i>	24
<i>Mētha sylvestris.</i>	303	<i>Muscus marinus.</i>	545
<i>Menthastrum.</i>	303	<i>Myoetnon.</i>	515
<i>Mercurialis mas.</i>	633	<i>Myrica.</i>	55
<i>Mercurialis fœmina.</i>	634	<i>Myrrha.</i>	567
		<i>Myrrhis.</i>	567
<i>Mercurialis sylvestris.</i>	635	<i>Myrtus.</i>	92
		<i>Myrtus sylvestris.</i>	589
<i>Mespilum.</i>	105		
<i>Mespilus communis.</i>	106	<i>Myrtus Tarentina.</i>	93
<i>Meum.</i>	10.	<i>Myrtus exotica.</i>	94
<i>Milium.</i>	129		
<i>Milium Solis.</i>	415		
<i>Millefolium maius.</i>	547		
		<i>Napellus.</i>	520.521
<i>Millefolium minus.</i>	548	<i>Napus.</i>	144
		<i>Narcissus.</i>	603
<i>Millefolium palustre.</i>	565	<i>Nardum sylvestre.</i>	17.
			18
<i>Millefolium palustre</i>		<i>Nardus mas.</i>	14
<i>alterum.</i>	566	<i>Nardus fœmina.</i>	15
<i>Millemorbia.</i>	542	<i>Nardus Italica.</i>	14
<i>Momordica.</i>	626.384	<i>Nardus Celtica.</i>	16
<i>Merella.</i>	506	<i>Nardus Indica.</i>	13
			<i>Nastur</i>

INDEX.

<i>Nasturtium hortense.</i>	<i>Ocimum gariophylla-</i>
221	tum. 204
<i>Nasturtium aquati-</i>	<i>Ocimum paruum.</i>
cum. 173	204
<i>Nasturtium Babylo-</i>	<i>Ocularia.</i>
nicum. 224	481
<i>Nasturtium Orien-</i>	<i>Oculus Bonis.</i>
tale. 224	412
<i>Nasturtium tectorū.</i>	<i>Olea sativa.</i>
222	81
<i>Nenuphar.</i>	<i>Olea sylvestris.</i>
404	80
<i>Nepeta.</i>	<i>Oleander.</i>
306	525
<i>Nerium.</i>	<i>Oleastellum.</i>
525	614
<i>Nigella.</i>	<i>Oleaster.</i>
349	80
<i>Nummularia.</i>	<i>Olas Hispanicum.</i>
474	159
<i>Nuces Auellana.</i>	<i>Olus satrum.</i>
118	335
<i>Nuces Prænestina.</i>	<i>Onochelos.</i>
118	462
<i>Nuces Pontica.</i>	<i>Onoclea.</i>
118	461
<i>Nux Ingls.</i>	<i>Ononis.</i>
116	278.403
<i>Nux Myristica.</i>	<i>Onofma.</i>
117	403
<i>Nymphaea.</i>	<i>Ophris.</i>
404	597
	<i>Opuntia.</i>
	284
	<i>Orchis Serapias ma-</i>
	ior. 398
	<i>Orchis Serapias mi-</i>
	nor. 397
	<i>Origanum Heracleo-</i>
	ticum. 292
<i>Ocimastrum.</i>	<i>Origanum Onitis.</i>
465	293
<i>Ocimoides.</i>	293
465	<i>Origanum Sylvestre.</i>
<i>Ocimum.</i>	294
203	
<i>Ocimum aquaticum.</i>	
466	

993 Ori

INDEX.

<i>Oriza.</i>	128	<i>Panicum.</i>	130
<i>Ornithogalum.</i>	207	<i>Panis Cuculi.</i>	371
<i>Orobanche.</i>	205	<i>Panis porcinus.</i>	231
<i>Os mundi.</i>	211	<i>Papauer nigrū.</i>	349
<i>Osma.</i>	403	<i>Papauer hortense, seu</i>	
<i>Osterition.</i>	337	<i>satium.</i>	501
<i>Ostrution.</i>	337	<i>Papauer erraticum.</i>	
<i>Osyris.</i>	585		500
<i>Oxalis.</i>	151	<i>Papauer corniculatū,</i>	
<i>Oxalis altera.</i>	152	<i>seu cornutum.</i>	502
<i>Oxyacantha.</i>	64	<i>Papauer Rhoëas.</i>	500
<i>Oxytriphillon.</i>	370	<i>Parietaria.</i>	529
		<i>Paronychia.</i>	492
		<i>Parthenium.</i>	503
		<i>Pastinaca sativa.</i>	318
		<i>Pastinaca syvestris.</i>	
<i>Paderota.</i>	277		319.346
<i>Paonia femina.</i>	414	<i>Patta Leonis.</i>	571
<i>Palatū Leporis.</i>	179	<i>Pecten Veneris.</i>	199
<i>Paliurus Africana.</i>		<i>Pentadactylon.</i>	604
	63	<i>Peplus.</i>	613
<i>Palma.</i>	90	<i>Pepones.</i>	194
<i>Palma Christi.</i>	399.	<i>Perdicium.</i>	529
	604	<i>Perforata.</i>	427
<i>Paludapium.</i>	334	<i>Periclymenum.</i>	451
<i>Pampinula.</i>	487	<i>Persea.</i>	122
<i>Panaces Asclepium</i>		<i>Persica malus.</i>	99
	316	<i>Persicaria.</i>	228.229
<i>Panaces Herculeum,</i>			<i>Persi</i>
<i>seu Heracleū.</i>	315		

INDEX.

<i>Persicaria agrestis.</i>	bro & Cirmolo. 33
115	<i>Pinus sylvestris Mu-</i>
<i>Persolara.</i>	ghi. 32
552	<i>Piper Indicum.</i> 12
<i>Personata.</i>	558
<i>Personata altera.</i>	<i>Piper montanū.</i> 615
552	<i>Piperitis maior.</i> 243
<i>Pes Asini.</i>	377
<i>Pes Colūbinus.</i>	383
<i>Petasites falso.</i>	552
<i>Petroselinum errati-</i>	<i>Pistacia, seu Pista-</i>
<i>cum.</i>	200
<i>Peucedanum.</i>	348
<i>Phasioli.</i>	140
<i>Phlonitis.</i>	403
<i>Phu magnum.</i>	18
<i>Phu minus.</i>	19
<i>Phyllirea.</i>	62
<i>Picea.</i>	30
<i>Pilosella maior.</i>	442
<i>Pimpinella.</i>	487
<i>Pimpinella saxifra-</i>	432
<i>gia.</i>	486
<i>Pinastellum.</i>	348
<i>Pinus maritima pri-</i>	<i>Pituitaria.</i> 529
<i>mi generis.</i>	34
<i>Pinus maritima alte</i>	<i>Plantago maior.</i> 162
<i>ra.</i>	35
<i>Pinus sylvestris.</i>	31
<i>Pinus sylvestris Cem</i>	<i>Plantago minor.</i> 170
	<i>Platanus.</i> 46
	<i>Poliū minus.</i> 375
	<i>Poliū montanū.</i> 374
	<i>Polygonatum.</i> 448
	<i>Polygonū mas.</i> 438
	<i>Polygonum fœmina.</i>
	432
	<i>Polypodium.</i> 622
	<i>Polypodiū alterū.</i> 630
	<i>Polytrichū.</i> 580. 581
	<i>Pomum.</i> 27
	<i>Populus alba.</i> 42
	<i>Populus nigra.</i> 50
	<i>Populus Alpina, sine</i>
	<i>Lybica.</i> 51
	99 4 <i>Porrum</i>

INDEX.

<i>Porrum capitatū.</i>	213	<i>Pyrethrum sylvestre.</i>	
<i>Porrum agreste.</i>	214		230
<i>Portulaca.</i>	167	<i>Pytiusa.</i>	611
<i>Potamogeton.</i>	546		
<i>Potentilla Protentilla.</i>	477		Q
<i>Præcocia.</i>	100	<i>Quercus.</i>	82
<i>Primula Veris.</i>	554	<i>Quinquefolium.</i>	478
<i>Primula Veris altera</i>	555		
<i>Proserpinaca.</i>	438.		R
<i>Prosopion.</i>	558		
<i>Prosopis.</i>	558	<i>Radix.</i>	145
<i>Prunus arbor.</i>	110	<i>Ranunculus primus.</i>	
<i>Pseudocostus.</i>	21		244
<i>Pseudo Dictamnus.</i>	298	<i>Ranunculus secundus.</i>	
			245
<i>Pseudolinum.</i>	131	<i>Ranunculus tertius.</i>	
<i>Pseudo-melanthium.</i>	351		246.
		<i>Ranunculus quartus.</i>	
<i>Psyllium.</i>	505		247
<i>Psylotrum.</i>	624	<i>Ranunculus quintus.</i>	
<i>Ptarmica.</i>	230		248
<i>Pulegium.</i>	296	<i>Rapa, seu Rapum.</i>	
<i>Pulicaria.</i>	388		143. 231
<i>Pulmonaria.</i>	491	<i>Raphanus.</i>	145
<i>Pulsatilla.</i>	251	<i>Raphanus agrestis.</i>	
<i>Pyra.</i>	104		146.
<i>Pyrethrum.</i>	343	<i>Rapistrum.</i>	225
			Regiuno

INDEX.

<i>Regium granū.</i>	604	<i>Rubia Sylvestris.</i>	
<i>Remera aratri.</i>	278		418
<i>Reſta Bouis.</i>	278	<i>Rubus.</i>	472
<i>Reubarbarum mona-</i>		<i>Rubus Cernuus.</i>	586
<i>chorum.</i>	150	<i>Rumex.</i>	149
<i>Reuponticum.</i>	270	<i>Ruscus.</i>	589
<i>Rhamnus.</i>	158	<i>Ruta.</i>	314
<i>Rhamnus ſecundus.</i>		<i>Ruta Capraria.</i>	584
	59	<i>Ruta parietum.</i>	492
<i>Rhamnus tertius.</i>	60		
<i>Rhodia radix.</i>	483.		S
<i>Rhododaphne.</i>	525		
<i>Rhododendrum.</i>	525	<i>Sabina.</i>	42
<i>Rhus.</i>	88	<i>Salicaria.</i>	436
<i>Ribes Vulgaris.</i>	67	<i>Salinaris herba.</i>	343
<i>Ricinus.</i>	604	<i>Salix.</i>	79
<i>Rosa.</i>	75	<i>Salix Amerina.</i>	78
<i>Rosmarinum.</i>	344	<i>Salvia agreſtis.</i>	300
<i>Rosmarinum corona-</i>		<i>Salvia maſcula</i>	3
<i>rium.</i>	345	<i>hortenſis</i>	299
<i>Roſtrum Ciconia.</i>		<i>Salvia ſcmina.</i>	300
	382	<i>Salvia maior.</i>	299
<i>Roſtrum Gruis.</i>	382	<i>Salvia minor.</i>	300
<i>Roſtrum Porcinum.</i>		<i>Salvia Romana.</i>	304
	185	<i>Sambucus.</i>	616
<i>Rubea tinctorum.</i>		<i>Samſuchum.</i>	312
	417	<i>Sanamunda.</i>	457
<i>Ruberta.</i>	383	<i>Sandix.</i>	199
<i>Rubia ſatua.</i>	417	<i>Sanguinalis.</i>	438
			99 S San

INDEX.

<i>Banguinaria.</i>	177	532	
438			<i>Semperuiuum minus.</i>
<i>Sanguisorba.</i>	486	533	
<i>Sanicula.</i>	448. 479		<i>Semperuiuum tertiu.</i>
<i>Satureia.</i>	310	534	
<i>Saxifraga.</i>	454		<i>Sena seu Sene.</i> 341
<i>Saxifragia.</i>	492		<i>Senecio.</i> 544
<i>Saxifragia Hircina.</i>			<i>Sentis.</i> 472
486			<i>Septifolia.</i> 435
<i>Scabiosa.</i>	450		<i>Serica.</i> 111
<i>Scandulaceum.</i>	222		<i>Seriphium.</i> 286
<i>Scilla.</i>	240		<i>Seris.</i> 181
<i>Scolopendrium.</i>	406		<i>Serpentaria maior.</i>
<i>Scordium.</i>	376	232	
<i>Scorodoprasum.</i>	217		<i>Serpentaria minor.</i>
<i>Scorpio.</i>	488	233	
<i>Scorpio Plin.</i>	515		<i>Serpentina.</i> 177.
<i>Scorpioides.</i>	639	178	
<i>Scrophularia maior.</i>			<i>Serpillum.</i> 311
542			<i>Serpillum Romanum</i>
<i>Scrofularia minor.</i>		309	
258			<i>Sesamum.</i> 131. & 132
<i>Securidaca.</i>	402		<i>Seseli Massiliense.</i>
<i>Sedum maius.</i>	532	321	
<i>Sedum minus faemi-</i>			<i>Seseli Peloponense.</i>
<i>na.</i>	533	323	
<i>Seminalis.</i>	438		<i>Sideritis prima.</i> 468
<i>Semperuiuum maius.</i>			<i>Sideritis altera.</i> 469
			<i>Sid</i>

INDEX.

<i>Sideritis tertia</i> , qui-	<i>Solatrum maius</i> . 510
<i>busdā Heraclea</i> . 470	<i>Solanum Halicaca-</i>
<i>Sideritis Heraclea</i> .	<i>bum</i> . 507
468	<i>Solanum somniferū</i> .
<i>Sideritis Herculea</i> .	508. 509
468	<i>Solatrum</i> . 506
<i>Sigillum Salomonis</i> .	<i>Solatrum soporiferū</i> .
440	508
<i>Siliqua Aegyptia</i> . 20	<i>Solidago minor</i> . 446
<i>Siliqua</i> . 96	<i>Sonchitis</i> . 331
<i>Siliquastrum</i> . 12	<i>Sonchus</i> . 179
<i>Sinapi primum</i> . 218	<i>Sonchus planus</i> . 180
<i>Sinapi secundum</i> , seu	<i>Sorba</i> . 109
<i>erraticum</i> . 219	<i>Sparganium</i> . 459
<i>Sinapi tertium</i> . 220	<i>Spartium</i> . 601
<i>Sinapis sylvestris</i> . 225	<i>Spartum</i> . 601
<i>Sifer</i> . 147	<i>Spatula foetida</i> . 460
<i>Sifer alterum</i> . 148.	<i>Sphacelus</i> . 299
<i>Sium</i> . 171	<i>Sphatuda foetida</i> . 460
<i>Sisymbrium hortense</i> .	<i>Sphodrylium</i> . 346
172	<i>Spica Nardi</i> . 13
<i>Sisymbriū aquaticū</i> .	<i>Spin Cernuo</i> . 61
173.	174 <i>Spin Guerzo</i> . 61
<i>Smilax hortēsis</i> . 210	<i>Spina alba</i> . 276
<i>Smilax lenis</i> . 587	<i>Spinacia</i> . 159
<i>Smilax aspera</i> . 586	<i>Spino merlo</i> . 61
<i>Smyrnum</i> . 336	<i>Splenium</i> . 406. 407
<i>Solanum hortēse</i> . 506	<i>Spondilyum</i> . 346
	<i>Squilla</i>

INDEX.

<i>Squilla.</i>	240	<i>Tanacetum aquaticū</i>	
<i>Stachys.</i>	366	<i>acutum.</i>	230
<i>Stachytes.</i>	546	<i>Tapsius barbatus.</i>	549
<i>Staphis agria.</i>	599		552
<i>Staphylodendron.</i>	115	<i>Taxus.</i>	523
<i>Stellaria.</i>	571	<i>Telephium.</i>	263
<i>Sternutametaria.</i>	230	<i>Terebynthus.</i>	39
<i>Stoecas.</i>	291	<i>Testiculus mas mi-</i>	
<i>Storax calamita.</i>	28	<i>nor.</i>	397
<i>Stramonium.</i>	511	<i>Testiculus fœmina</i>	
<i>Stratiotes Millefoliū.</i>		<i>minor.</i>	396
	547	<i>Testiculus canis fœmi-</i>	
<i>Styrax.</i>	28	<i>na.</i>	395
<i>Succisa.</i>	254	<i>Teucrium, siue Teu-</i>	
<i>Suber.</i>	85	<i>cris.</i>	358
<i>Sycomorū.</i>	120	<i>Thapsia.</i>	600
<i>Sylue mater.</i>	451	<i>Thelyphonon.</i>	515
<i>Syluestre Nasturtiū.</i>		<i>Th'aspi.</i>	222
	222	<i>Thymbra.</i>	310
<i>Symphitum petraeum.</i>		<i>Thymelæa.</i>	615
	444	<i>Thymum, Thymus.</i>	
<i>Symphitum alterum.</i>			309
	445	<i>Tilia.</i>	70
	T	<i>Tintinabulum terra.</i>	
			455
<i>Tamarix.</i>	55	<i>Tithymalis.</i>	607
<i>Tanacetum.</i>	411	<i>Tithymalus mascu-</i>	
<i>Tanacetum Syluestre.</i>		<i>los Characian, A-</i>	
	477	<i>myg</i>	

INDEX.

mygdaloides. 605	373	
Tithymalus fœmina. si	Trifolium odoratum.	
ue Myrsinites, Myr	372.	
tites, Carytes, siue	Trifolium acetosum.	
cădidalactaria. 606	371	
Tithymalus Dendroi	Trifolium Asphalti-	
des. 610	tes. 368	
Tithymalus Cyparissias.	Trifolium bitumino-	
609	sum. 368	
Tithymalus Helioscopius.	Trifolium Equinum.	
608	372	
Tithymalus Paralius	Trifolium acutum.	
607	370	
Tormentilla. 435	Trinitas. 373	
Tragacantha. 280	Trissago, seu Trixago.	
Traganos. 488	359.	
Tragoriganum. 295	Trissago palustris.	
Tragum. 488	376	
Trasi. 208	Triticum. 124	
Tribulus terrestris.	Triticum sylvestre.	
452	258	
Tribulus aquaticus.	Tryallis. 552	
453.	Tuber. 231	
Trichomanes. 581	Tubera. 209	
Trifolium pratense.	Tussilago. 378	
369	Typha. 386	
Trifolium pratense		
alterum. 370	V	
Trifolium magnum.	Valeriana maior. 18	
	Vale	

INDEX.

<i>Valeriana minor.</i>	19	<i>Virga pastoris maior.</i>	
<i>Veratrum albū.</i>	524		274
<i>Veratrum nigrū.</i>	525	<i>Virga pastoris minor.</i>	
<i>Verbasculum.</i>	554		275
<i>Verbascum albū mas.</i>		<i>Viscum.</i>	352
	550	<i>Vitealis.</i>	473
<i>Verbascum album fœ</i>		<i>Vitex.</i>	78.
<i>mina.</i>	549		79
<i>Verbascum nigrum.</i>		<i>Viticella.</i>	626
	551.	<i>Vitis alba.</i>	624
<i>Verbascum sylvestre.</i>		<i>Vitis nigra.</i>	625
	553	<i>Vitis sylvestris.</i>	623
<i>Verbascum aureos flo</i>		<i>Vitis vinifera.</i>	640
<i>res emittens.</i>	556	<i>Vitriola.</i>	529
<i>Verbascum Lychni</i>		<i>Vlmus.</i>	53
<i>tis.</i>	552	<i>Vmbilicus terra.</i>	231
<i>Verbasceum odoratū.</i>		<i>Vmbilicus Veneris.</i>	
	554		535
<i>Verbenas.</i>		<i>Vmbilicus Veneris al</i>	
<i>Verbenas.</i>		<i>ter.</i>	536
<i>Vesicaria.</i>	507	<i>Vnedo.</i>	112
<i>Vetonica.</i>	433	<i>Vngula Caballina.</i>	
<i>Vettonica altera.</i>	226		378
	227	<i>Volubilis maior</i>	587
<i>Viburnum.</i>	89	<i>Volubilis media.</i>	473
<i>Vicia.</i>	212	<i>Volucrum maius.</i>	451
<i>Vicia sylvestris.</i>	211	<i>Vrsi auricula.</i>	448
<i>Vinca peruinca.</i>	441	<i>Vrtica prima.</i>	537
<i>Viola alba.</i>	394	<i>Vrtica secunda.</i>	538
<i>Viola purpurea.</i>	572	<i>Vrtica Græca.</i>	539
		<i>Vrtica</i>	

INDEX.

<i>Vrtica mortua.</i>	541	<i>Vua Taminia.</i>	623
<i>Vrtica fetida.</i>	541	<i>Vulparia altera.</i>	518
<i>Vrtica Labeo.</i>	541		X
<i>Vrtica Sylvestris.</i>	539	<i>Xanthium.</i>	582
<i>Vua crispia.</i>	66	<i>Xylon.</i>	385
<i>Vua Versa.</i>	519		Z
<i>Vua Vulpina.</i>	519	<i>Zaa.</i>	126
<i>Vua Sylvestris.</i>	529	<i>Zizypha.</i>	111

FINIS.

